




R6. 22

R.C.P. EDINBURGH LIBRARY



023057A0236

TRACTATUS

DE

GLANDULA THYREOIDEA

TAM SANA QUAM MORBOSA

INPRIMIS

DE STRUMA EIUSQUE CAUSIS.
ATQUE MEDELA

AUCTORE

AUGUSTO GULIELMO HEDENO

SAXONE

ACCEDUNT TABB. V AENEAE AB I. F. SCHROETERO SCULPTAE

LIPSIAE

IN LIBRARIA WEIDMANNIA

MDCCCXXII

IMPRESSIT BENEDICT GOTTHILF TEUBNER

CHIRURGIA, eximio Medicinae, ingenuarum artium ac disciplinarum comitatu ornata atque arctissimo vinculo cum iis conjuncta, continuo tramite ad altiora et meliora contendit, plantae instar, quae in floris tenetur desiderio.

HEDENUS.

VIRO ILLUSTR

EXCELLENTISSIMO EXPERIENTISSIMO

DOCTISSIMO

CAROLO FERDIN. GRAEFIO

MED. ET CHIRURG. DOCTORI, PROFESS. CHIRURG.
IN UNIVERSITATE LITTERARIA BEROL. P. O., REGI
BORUSS. A CONSIL. INTIMIS, NEC NON A CONSIL.
RER. MEDIC. ET SANITAT. PUBL. TUENDAE SUPREMIS,
ORDINIS AQUILAE RUBRAE CLASS. TERT. ET CRUCIS
FERREAE CLASS. SECUND. EQU., LEGIONIS HON. REGIS
FRANCO - GALLIAE DECUR., ORDINIS RUSSIC. ST. ANNAE
ET SUECICI WASAN. IN CLASSE SECUND., RUSSICI ST.
WLADIM. IN CLASSE QUARTA EQUITI, INSTITUTI REG.
CHIRURG. - OPHTHALM. CLINICI DIRECTORI, PROFESS.
O. IN REG. INSTIT. MILIT. MEDICO-CHIRURG. FRIDERICI
GULIELMI, REG. SOC. FACULTATIS MEDICAE PARISINAE
SODALI PER EPISTOLAS ORDINARIO, SOCIETATIS
AEMUL. PARISINAE SOCIO PER EPISTOLAS EXTRANEO,
SOCIET. CAESAR. NATUR. CURIOS. MOSCOV., SOCIET.
REG. SCIENT. GOTTING., SOCIET. PHYSICO-MEDICAE
ERLANG., SOCIETAT. NATUR. SCRUTAT.
HALENSIS, ALIARUMQUE SODALI

FAUTORI ET PATRONO

OMNI PIETATIS ET OBSERVANTIAE CULTU
AETERNUM COLENDO.

GRAEFIO IMMORTALI
SALUTEM ET OFFICIA
AUCTOR

Cum neque haberem, quod tua magnopere interesset a me scribi, et te scirem summis occupationibus assidue esse districtum: tamen facendum mihi putavi, ut aliquid omnino ad te litterarum darem, atque libellum tuo nomini inscriptum ad te mitterem: jam enim aliquot abhinc annis ita sum incensus laudibus tuis, ut statuerem, tibi quidem primum, deinde etiam aliis, aut meum in te celebrando ingenium, aut certe voluntatem aliquando ostendere. Quare cum haec jam longum per tempus increbuerit consuetudo, ut, de quibus optime sentimus, iis dicata esse et eorum nomine insigniri nostra scripta

cupiamus : mittendum putavi ad TE, dum aliquid interim fortasse praestantius adornatur, volumen hocce disquisitionum mearum, quas ego nequaquam edere animum induxissem, nisi me suadentis atque etiam petentis Parentis mei movisset auctoritas. Ad meum enim officium valde pertinet, TE de nobis optime meritum intelligere, et quo TE studio colam, et qua TUORUM in me meritorum memoriam religionem conservem, quod, ut spero, consequar litterarum bono; nam, ut remunerare unquam possim, sperare vix audeo: ita multa sunt, quae ad me juvandum officia sunt a TE profecta; ut enim omittam, quam honorifice de Parente meo et loqui et sentire solitus sis, cum ita dicas, TIBI nullius olim jucundioris consuetudinem fuisse, nullius carioris nunc esse memoriam: ut igitur hoc omittam, quod in summi beneficii loco soleo ponere: quanti illud apud me debet esse ponderis, quod me adolescentem Vir Clarissimus, non TU quidem sopitum, sed tardioris fortasse, quam oporteret, ad studium Chirurgiae excitasti: cujus temporis

recordatio mirifice me delectat; sic enim argumentor: TE, cujus iudicium est acerrimum, nunquam me ad Chirurgiam fuisse cohortaturum, si TE frustra id facere existimasses: tantum autem Virum, quantus ipse omnium consensu gentium et es, et haberis, de nobis non pessime sperare, mihi perjucundum est cogitanti: apud alios, si qui audient, etiam honorificum. Quare nunc quidem id, quod mihi pro TUA summa humanitate facillimum est, ago, ut, quem pro tot ac tantis officiis animum debeo, eum me praestare TIBI persuadeam; quod si per eam viam, qua ad artem chirurgicam iter est, tantum procedam, quantum profecto, nisi me aliqua res impedierit, procedam: nunc illud etiam aliquando efficiam, ut TE de nobis esse bene meritum magnopere laeteris? TE interim si rogem, ut, quemadmodum instituisti, me diligas, faciam imprudenter: neque enim dubitandum est, quin TU velis in eadem erga me voluntate cum humanitatis, tum constantiae causa permanere; magis illud mihi est elaborandum, ut omnes res, quae ad TE

colendum pertinent, studiose faciam; quarum si
ullam sciens praetermisero, nefarie me peccasse
confitebor. Vale ordinis nostri decus, diuque
vive ad Academiae Berolinensis gloriam

Laus Asclepia, duplicisque Phoebi,
Qui plectrum ferit, et potens medendi
Fatorum dominas ministrat herbas.

LIPSIÆ Cal. Jan. MDCCCXXII.

LECTURIS SALUTEM

AUCTOR

Duo sunt praecipue momenta, quorum rationem habere solent, qui primos ingenii fructus, si bene maturi sunt, in publicum efferre et communicare cum omnibus volunt: alterum scilicet, ut materiam proponant utilem; alterum, ne tractent argumentum adeo excussum. Ejusdem quoque conditionis esse puto argumentum, cujus nunc pertractationem suscepi, dum mihi jam animus est, Volumen hocce disquisitionum mearum, quas ego nequaquam edere animum induxissem, nisi me suadentis atque etiam petentis PARENTIS MEI movisset auctoritas, evulgare.

Etenim cum pro juvenili nostra aetate atque experientia destituti nova principia, quae practicae argumenti rite evoluti adplicationem magis

respiciant, in medium proferre non possimus, consultius existimavimus, e clarissimis scriptoribus omnia, quaecunque altiora spirant, et in tractatione nostra de glandula thyreoidea tam sana, quam morbosa eademque imprimis strumosa ad physiologiam, pathologiam et ad therapiam spectant, congerere, quam in excogitandis novis opinionum commentis, quibus nec auctoris ingenium veritatem conciliare possit, nec aetas auctoritatem, tempus terere.

Jam vero Lectores doctissimos oro atque rogo, ne opusculum hocce nostrum, cui non exiguum per biennium navavimus laborem, prorsus dedignentur, sed pro indulgentia sua ipsorumque in praestantissimos scriptores, e quibus haec omnia sunt desumta, studio, aequi bonique consulere velint. Quod si qua ex parte fuero consecutus, summum me operae meae fructum cepisse putabo; sin minus, mihi tamen gratum erit, si me saltem voluisse homines intellexerint. Praeterea omnem refutationem argumentis nitentem semper accipiemus benevolo animo, imitantes *Socratis* exemplum, qui *Platone* auctore in disputationibus ita versari solebat, ut cuperet inferior potius, quam superior discedere, quod ratione victus, falsis opinionibus, si quas animo comprehendisset, liberaretur.

INTRODUCTIO

Antequam de multis variisque morbis, quibus glandulae thyreoideae textura atque structura afficitur, disseramus, de glandula thyreoidea in statu sano nonnulla nobis sunt dicenda, quo tutius ad disquisitionem morborum ejus progredi possimus. Haec quidem in priore, pathologiam vero et therapiam in posterioribus hujusce opusculi partibus exponemus. — Quae vero de glandula thyreoidea in statu sano dicenda sunt, ea natura sua fere communia esse oportet; communia vero dicere quam sit difficile, monuit *Horatius Flaccus*^{a)}. Augetur tamen inprimis haec difficultas, cum multa in iis, praesertim quae pertinent ad officium glandulae thyreoideae ejusque ductus

a) De art. poët. v. 128. Difficile est proprie communia dicere. —

excretorios, de quibus Anatomici adhuc dissentiunt, jam inde ab antiquissimis temporibus diversis Medentium judiciis et disceptationibus excitata fuerint inque utramque partem disputata. —

Quam quidem opinionum et monitorum varietatem ac dissensionem (etsi breviter tantum) exponere atque praeponderare et nonnullas qualescunque de ista physiologiae parte cogitationes afferre a munere nostro haud alienum videtur; ideoque primum de glandula thyreoidea in statu sano disseremus, ut veluti viam certam rectamque nobis muniamus de mutationibus glandulae thyreoideae in statu morbozo dicendi. —

Aget igitur:

PARS PRIOR

de glandula thyreoidea in statu sano.

Scripta ad anatomiam et physiologiam glandulae thyreoideae facientia. §. 1

CAPUT I.

Anatomia glandulae thyreoideae.

Situs et nexus glandulae thyreoideae. — 2.

Figura gl. thyre. — 5.

Divisio gl. thyre.	§. 4
Isthmus gl. thyre.	— 5
Magnitudo gl. thyre.	— 6
Pondus gl. thyre.	— 7
Color gl. thyre.	— 8
An sit glandula thyreoidea propria tunica instructa?	— 9
Substantia gl. thyre.	— 10
Musculi, qui glandulae thyreoideae incumbunt.	— 11
De vasis sanguiferis, quibus ipsa scatet.	— 12
De nervis gl. thyre.	— 13
An sit glandula thyreoidea ductibus excretoriis in-	
structa?	— 14
Differentia gl. thyre. ratione sexus et aetatis.	— 15
Anatomia comparata gl. thyre.	— 16

CAPUT II.

Physiologia glandulae thyreoideae.

De quaestionis propositae momento rite aestimando.	— 17
Opiniones eorum, qui ductus excretorios non vide-	
runt, eosque negant.	§. 18 — 25

PARS ALTERA

de glandula thyreoidea in statu morbos.

Auctores et delineatores.	— 26
-----------------------------------	------

CAPUT I.

Vitia organica glandulae thyreoideae.

A) In genere.

Laesiones mechanicae glandulae thyreoideae.	§. 2
Inflammatio gl. thyre.	— 2
Suppuratio gl. thyre.	— 2
Induratio gl. thyre.	— 3
Gangraena aut sphacelus gl. thyre.	— 3
Intumescencia gl. thyre., a) quae struma audit, quam vero infra nobis ulterius examinandam reservamus.	
b) ex qua puellae ad pubertatis annos accedentes, et virgines recens gravidatae laborant.	— 3
Tumores diversissimae naturae in glandula thyre. formati. —	5
Aggregatio materiae peregrinae. §. 34	— 5
Tela cellulosa, quae glandulam thyreoideam circumfundit, sedes est variorum tumorum.	— 5
Mutatio musculorum morbosa, qui super anteriorem glandulae thyreoideae faciem se disjiciunt.	— 5
Vitia vasorum gl. thyre.	— 3
Mutationes nervorum, qui ad glandulam thyreoideam eunt, vel hic proximae vicinae jacent.	— 3

B) De struma.

I. Onomatologia et homonymia.	— 4
II. Natura et forma strumae.	— 4
1) Differentia strumae a tumoribus cysticis.	— 4

2)	Differentia strumae a scrophulis.	§.	43
3)	— — ab aneurysmate carotidis.	—	44
4)	— — a scirrho gl. thyre.	—	45
5)	— — a pharyngocele.	—	46
6)	— — a bronchocele.	—	47

CAPUT II.

A e t i o l o g i a .

A)	De morborum glandulae thyreoideae causis.	—	48
B)	De strumae causis.	—	49

CAPUT III.

Prognosis.

A)	De morborum glandulae thyreoideae decursu et exitu.	—	50
B)	De strumae decursu et exitu.	—	51

PARS POSTERIOR

de strumae cura.

Cap. I.	De strumae cura, quae cum superstitione quadam conjuncta est.	—	52
Cap. II.	De strumae cura prophylactica.	—	53
Cap. III.	De strumae cura medica.	—	54
Cap. IV.	De strumae cura chirurgica.	—	55
1)	Venae sectio.	—	56
2)	Frictio et compressio.	—	57

3) Vesicatoria et ulcera artificialia.	§. 53
4) Caustica.	— 59
5) Ustio.	— 60
6) Incisio vel scarificatio.	— 61
7) Setaceum.	— 62
8) Paracentesis.	— 63
9) Bronchotomia, si suffocatio immineat.	— 64
10) Ligatura arteriae thyreoideae super.	— 65
11) Ligatura in radice strumae applicata.	— 66
12) Extirpatio glandulae thyreoideae strumosae.	— 67

P A R S P R I O R

de glandula thyreoidea in statu sano.

§. 1.

Scripta ad anatomiam et physiologiam glandulae thyreoideae facientia.

a) Opera, quae in universum tantummodo ad hanc materiam respiciunt.

Columbus (Matthae. Reald.), incis. Patav., de re anatomica libr. XV. edit. Venetiis 1559. fol. vid. lib. IX. de glandulis. p. 214.

Casseri (Julius), de vocis auditusque organis historia anatomica, Ferrariae 1600. de larynge, lib. III. c. 1.

Warthonius (Thom.), incis. Londin., adenographia, sive glandularum totius corporis descriptio, Londin. 1656. p. 119. 120. rec. in *Mangetti* thesauro anatomico II. 734.

Cowper (Guil.), chir. et anat. Londin., the anatomy of humane bodies, Oxon. 1697. fol. *Bidloi* sunt tabulae, quas Anglicus bibliopola a Belgis redemerat, quibus vero *Cowperus* aliquas literas adjecit, atque expositionem auxit, cum anatomicis adnotationibus tum chirurgicis. vid. T. 21. T. 24. f. 7. Conquestus est de tabularum suarum abusu, neque immerito *Bidlous*. *Cowperus* respondet in Eucharistia, quam adjecit Glandularum quarundam nuper detectarum, ductuumque earum excretoriorum descriptioni, Londin. 1702. 4.

- Desnoues* (Guillaume), lettres à M. *Cuillielini*, Rome 1706. 8. lettr. 4. p. 154.
- Bellinger* (Fr.), tract. de foetu nutrito, or a discourse concerning the nutrition of the fetus in the womb by ways hitherto unknown. Londin. 1717. 8.
- Ruyschius* (Frid.), Prof. Amstelod., de fabrica glandularum in corpore humano, epistola responsoria ad H. *Boerhaave*, Leidae 1722. 4.
- Morgagni* (J. Bapt.), Prof. Batav., adversaria anatomica omnia, L. B. 1723. 4. Adv. I. T. I. O. Adv. I. p. 33. 35. 36. 48 et 49. Adv. V. p. 66. Advers. VI. p. 119. c. fig. et ejusdem epistolae anatomicae novas observationes et animadversiones complectentes, Leid. 1728. 4. curante *Boerhavio*. Epist. IX. n. 30. 33. 34. 35. 36. 38. pag. 273. n. 39. pag. 274. n. 40.
- Santorinus* (J. Dominic.), Venet. illustr. anatomic. observationes anatomicae, Venet., 1724. 4. Leidae 1739. 4. pag. 114. 115.
- Winslow* (Jac. Benign.), magnum opus anatomicum, Paris. 1732. 4 et 12, Vol. 4. Tom. quart. pag. 589. 590.
- Heister* (Laurent.), Prof. Altdorf. et Helmst., Compendium anatomicum, Norimb. edit. 4ta 1732. 8. T. II. p. 24.
- de Bordeu* (Theophil.), Clinic. Paris. chylicationis historia, Montpell. 1742. recusa Paris. 1752. 12. cum tr. recherches sur les glandes, pag. 156. 159. 160.
- de Haller* (Albert.), Prof. Gotting., elementa physiologiae corporis humani Vol. I — VIII. Lausannae 1757 — 1766. 4. Tom. III. Lausannae 1760. 4. pag. 394. 395. 396. 398. 400. 403.
- Astruc* (Joh.), des tumeurs et des ulcères, Paris 1759. 8. 2 Theile, 1ster, p. 166.
- Bourgelat* Equil. Reg. in Gall. praefectus; éléments d'Hippiatrique, ou nouveaux principes sur la con-

- naissance et sur la Médecine des Chevaux. Lyon 1770.
II. Tom. P. 2. pag. 504.
- Mieg* (Achill.), specimen observationum anatomica-
rum. Basileae 1772. 4.
- Mayer* (J. C. A.), Prof. Berol., Beschreibung des gan-
zen menschlichen Körpers, mit den wichtigsten neu-
ern anatomischen Entdeckungen bereichert, nebst
physiologischen Erläuterungen, Berlin u. Leipz. 1783
— 1794. 1r — 8r Bd. 4ter Bd. p. 160.
- Soemmering* (S. Th.), vom Baue des menschlichen Kör-
pers, Frankfurt am M., 1791 — 1796. 1 — 5 Th.
5ter Theil, 2te Abth. p. 41 — 43.
- Gautieri* (Joseph.), Tyrolensium, Carinthiorum, Sty-
riorumque struma, observata et descripta. Vindob.
1794. pag. 97.
- Foderé* (Fr. Eman.), Essai sur le goître et le crétinage,
Turin 1792. 8. A. d. Französ. von Dr. H. W. *Linde-*
mann, Berlin 1796. §. 11.
- Cuiver* (G.), Leçons d'anatomie comparée receuillies
et publiées par C. *Dumeril*. V Vol. Paris 1799 —
1805. I — XIV. Vergl. Anat. IV. p. 382. n. *Me-*
ckelii.
- Autenrieth* (Joh. Heinr. Ferd.), Prof. Tubing., Hand-
buch der empirischen menschlichen Physiologie, 3
Theile, Tübingen 1801 — 2. 1ster Theil, p. 270.
§. 459. p. 272. §. 463.
- Hildebrandt* (Friedr.), Prof. Erlang., Lehrbuch der
Anatomie des Menschen, 1 — 4. Bd. 2te Ausg. Wien
1802. 3ter Bd. pag. 343 — 347.
- Franck* (Joan. Petr.), de curandis hominum morbis,
Epitome juxta ejus praelectiones etc. Editionem cu-
ravit Jos. *Eyerel* M. Dr. lib. 6. Viennae 1805. pag.
246.
- Tiedemann* (Fr.), Zoologie, Heidelberg. 8. 1r Band,
1808. 2ter, 1810. 3ter, 1814. 2r Bd. p. 688.

Treviranus (G. R.), vermischte Schriften anatomischen und physiologischen Inhalts, Göttingen 1816. 1 Bd. 8. p. 96.

Iphofen (Aug. Ernst), der Cretinismus, philosophisch und medicinisch untersucht, 2 Theile, mit 7 Kupfer- tafeln; Dresden 1817. Th. I. p. 27.

Carus (Carl Gustav), Lehrbuch der Zootomie, Leipzig 1818. p. 571. 572. 573. 574.

b) Scripta, quae separatim quaestionem propositam via ac ratione explanant, et rem litterariam sententiarum diversitate, et locorum, quos laudant, multitudine locupletant.

Hager (Joann.), Prof. postea Viteb., Rp. Godofr. *Richter* (Jaenischwald - Neomarch.), de glandula thyreoidea in statu naturali ab ovulis verminosis libera contra Jacobum *Vercellonium* disputat. Viteb. 1721. 4.

Vater (Abrah.), Prof. Viteb., de ductu salivali in lingua noviter antehac detecto, nunc elucidato, confirmato, novisque experimentis adstructo, cum variis observatis et experimentis, una ductus excretorius tonsillarum ac glandulae thyreoideae. Viteb. 1723. 4. p. 16.

Coschwitz (Georg. Daniel.), Prof. Halens., de ductu salivali novo. Halae 1723. 4.

Boecler (Phil. Henr.), Prof. Argent., Rp. Frid. *Reebmann* (Argentoratensi), de thyreoideae, thymi atque suprarenalium glandularum in homine nascendo et nato functionibus. Argent. 1753. 4. p. 11. 13.

Mayer (Joan. Christ. Andr.), Prof. postea Berol., Rp. Joanne Gaup (Hirschberga - Silesio), hypothesin novam de secundaria quadam utilitate glandulae thyreoideae defendit. Traject. ad Viadr. 1785. 4.

Hecker (Aug. Frieder.), Prof. olim Erford. postea vero Berol., über die Verrichtung der kleinsten Schlagadern und einiger aus dem Gewebe der feinsten Gefäße bestehender Eingeweide: der Schild- und Brust-

drüse, der Milz, der Nebennieren und der Nachgeburt. Erfurt 1790. 8.

Schreger (Bernh. Nath. Gottl.), Prof. Erlang., fragmenta anatomica et physiologica. Fascic. I. Lipsiae 1791. 4. c. tab. aen. p. 16—19—26. IV. de glandulae thyreoideae officio hypothesis.

Loder (Just. Christ.), Prof. olim Jenensis, nunc vero Archiatri Russici, examen hypotheseos de glandulae thyreoideae usu. Jenae 1797. 8.

Schmidtmueller (Joh. Ant.), Prof. Landshut., über die Ausführungsgänge der Schilddrüse. Ein Schreiben an S. Th. *Soëmmering*. Landshut 1804. 8. cum icone.

c) Disputationes:

Roesslinus (Euchar.), qui latino nomine se Rhodionem dixit, diss. inaug. physiol. med. de differentia inter foetum et adultum, Argent. 1513. Sect. I. p. 33.

Vercelloni (Jacob.), Pedemontani, de glandulis oesophagi conglomeratis, humore vero digestivo et vermibus. Diss. inaug. anatomico-medica I. Astae 1711. 4.

de Westhofen (Herm. Werner. Engelb.), Diss. inaug. medica de angina ex obstructis glandularum thyroidearum lymphaticis vasis deducta, Lemgov. 1718. 8. p. 42. Auctor *Ruischii* sententiam diductius exponit.

Lauth (Joan. Georg.), Argentoratensis, Diss. inaug. med. de glandula thyroidea. Argent. 1742. 4.

Ackermanni (J. F.), sententiam de officio glandulae thyreoideae notavit *Leonhardi* (Henr. Ferd. Fridr.) in diss. anatomico-physiol., historiae systematis glandulosi specim. prim. etc. Dresdae et Viteb. 1813. pag. 27.

d) Commentationes tum a societatibus litterariis evulgatae, tum in aliis operibus recusae.

Evertzen (Petri), Mediob-Zelandi, Diss. inaug. anat.

chirurg. de glandula thyreoidea. L. B. 1708. 4. cum iconibus. Recusa in A. *Halleri* disput. anatomic. select. Vol. IV. p. 701. et sequ. c. icon.

Heister (Laurentius), nova et accurata glandulae thyreoideae, glandularum bronchialium et asperae arteriae cum praecipuis ramis in magnitudine naturali delineatio, Ephem. N. C. Cent. VII. VIII. Norimb. ann. 1719. observ. LXIII. p. 365 — 68. vid. p. 366. 368.

Duvernoy (J. Georgius), Diss. de ductu salivali *Coschwitziano*, *Hallero* respondente, Tübing. 1725. 4. et in ejusdem collectione rec. videas etiam *Comm. Acad. Imper. Petropol.* Tom. VII. qui respondet annis 1734. 1735. pag. 216. 217.

Steller (Georg. Guiliel.), Diss. curiosissima de bestiis marinis, urso marino et leone marino, utroque de phocae genere, deque manati et lutra marina vellere nigerrimo reperitur in *Nov. Act. Acad. Petrop.* T. II. 1742. Germanice prodiit Halae 1753. 8. Beschreibung sonderbarer Meerthiere.

L'Alouette (Petr.), recherches anatomiques sur la glande thyroïde, dans les *Mémoires* de Mathématique et de Physique présentées à l'*Académie Royale* de sciences. T. I. Paris 1750. p. 159 — 9. T. 2. f. 4.

Güntz (Juste Godefroy), observation anatomique sur la glande thyroïde. Dans les mêmes *Mémoires*. T. I. p. 283. 284.

de Haller (Albert.), Tubingae sub praesidio Auctoris J. Georg. *Duvernoy* a. 1725. 4. defendit disp. de ductu salivali *Coschwitziano*. De eodem ductu, visis apud ipsum inventorem venis, quas pro ductu salivali habuerat, Leidae repetita sua manu incisione linguae, partium vicinarum, et potissimum arteriarum, edidit Leidae 1727. 4. disputationem, qua experimenta et dubia circa ductum salivalem novum *Coschwitzianum* producuntur. Recusa est in *Operum minorum*. T. I. Lausannae 1762. 4. paulum emendata.

Wolf (Car. Frieder.), Prof. Petropol., in *novis actis academiae scientiarum imperialis Petropolitanae*. 4. 1779. P. II.

Ballantii et *Uttini* sententiae de usu glandulae thyreoideae reperiuntur in *Comment. Bonon.* Tom. VI. 1783: ac Tom. VII. 1784.

Schelver (Fr. J.), Prof. Heidelberg., in *Wiedemann's Archiv für Zoologie und Zootomie*. Braunschweig 1802. 3ten Bandes 1stes Stück. pag. 180 sequ.

Rush (Benj.), de functione et morbis lienis, hepatis, pancreatis et glandulae thyreoideae; in *medical and physical Journal* Vol. XVI. Sept. 1806. p. 193. Cfr. *Sammlung auserlesener Abhandlungen* für practische Aerzte. XXIII. Bd. S. 547 — 549. Leipzig 1806.

Meckel (Frider.), Prof. Halens., über die Schilddrüse, Nebennieren und einige ihnen verwandte Organe. In Ejusdem *Abhandlungen* aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie und Physiologie. Halle 1806. 8. p. 94. et sequ.

Hofrichter (Bened.), über den Nutzen der Schilddrüse; vid. J. Fr. *Meckel deutsches Archiv* für die Physiologie, 6ter Band. 2tes Heft, Halle und Berlin 1820. pag. 161 — 186.

C A P U T I.

Anatomia glandulae thyreoideae.

*Non uno contenta valet natura tenore,
Sed permutatas gaudet habere vices.*

(Petronii Arbitri Fragm. p. 171. ed. Di. S. S. Lugd. Batav.
MDCXLV.)

§. 2.

Situs et nexus. Glandula haecce, Warthonio sic dicta thyreoidea, quae a cartilagine cognomine nomen accepit, una ex maximis corporis humani glandulis est, in parte colli anteriore infra mediam cartilaginis thyreoideae partem sita. Ad arcum cartilaginis cricoideae anteriorem praecipue ¹⁾ et ad primos tracheae annulos cartilagineos laxius cellulosi fibris adhaeret, etiam ad oesophagum. ²⁾ Ab utraque parte ad cartilaginem thyreoideam adscendit, levique tela cellulosa ad utrasque illius partes laterales alligata est.

§. 3.

Figuram quodammodo semilunarem aut speciem crescentis lunae haec glandula propter marginis superioris curvaturam sistit, cujus cornua sursum, corpus vero deorsum ita spectat, ut tota forma quodammodo soleae ferreae similis sit.

¹⁾ *L'Alouette* l. c. p. 160. — *Güntz* l. c. p. 284. ²⁾ *L'Alouette* l. c. p. 161.

§. 4.

Divisionem ejus quod attinet, constat ex tribus artibus. Duos laterales lobos ad cartilaginem scutiformem adscendentes cornua lateralia salutare amant anatomici; plerumque pares sunt, vidit tamen *Hallerus* ³⁾ dextrum longiorem fuisse. Conicus uterque et obtusus est. ⁴⁾ Media vero ex conjunctione horum majorum cornuum epiphysis parva aut appendix oritur. Quae appendix cornu medium glandulae thyreoideae dicitur. Haec columna ⁵⁾ a *Bidloo* picta ⁶⁾ alias cylindrica, alias alterne contracta et dilatata. Sursum saepe gracilescit ⁷⁾, alias sursum crassior fit. ⁸⁾ Plerumque ante membranaceum summam cartilaginis thyreoideae, et ossis hyoidis intervallum gracili fine terminatur ⁹⁾, aliquando adeo longa, ut etiam pone os icorne producat. ¹⁰⁾ Alias brevior est, et ad huiusmodi cartilaginis thyreoideae sui finem facit. Rarum est, quater tamen vidit *Hallerus*, ¹¹⁾ nullam ejusmodi appendicem fuisse. Frequenter sinisteriora ¹²⁾ tenet, aliquando tamen dexteriora. ¹³⁾ *Hallerus* ¹⁴⁾ vidit, propriam eam etiam glandulam fuisse, quae ante mediam cartilaginem thyreoideam ponebatur, neque ad

3) *Elem. physiol.* l. c. p. 395. 4) *Heister* *Ephem.* N. C. cent. c. tab. 6. f. 2. 5) *Morgagni* *Adv.* I. T. I. o. — *L'Alouette* l. m. p. 167. n. 581. Non habet *Evertzen*. 6) Pingitur reclinata in *anat. corporis hum.* 105. tab. illustr. T. 24. f. 8. 7) *Morgagn.* *ibid.* — Pyramidem vocat *L'Alouette* l. c. p. 163. addit in viro planiorem esse. 8) Varietates vidit *Morgagnius* *Epist.* IX. n. 34. n. 36. 9) Finiri ante basin ossis hyoidis *Winslow.* l. l. n. 589. Etiam hic varietates recenset *Winslow.* l. c. — *Morgagn.* *Epist.* IX. n. 36. — 10) *Morgagn.* *Epist.* IX. n. 36. — *L'Alouette* p. 163. — *Guntz* p. 284. Ea parte cellulosa tela adhaeret. 11) *Elem. physiol.* T. c. p. 395. Nullam *Morgagnius* fuisse vidit *Adv.* VIII. n. 34. *Adv.* VI. p. 119. 12) *Santorin.* l. c. p. 114. 13) *Morgagn.* varietates habet. *Epist.* IX. p. 267. 14) *Elem. physiol.* Tom. cit. p. 396.

thyreoideam pertinuisse. Vidit *Guntzius* ¹⁵⁾ duplicem appendicem, et bifurcatam *Morgagnius*. ¹⁶⁾

§. 5.

Pars ejus anterior convexa, ad medium vero modo major, modo minor, interdum animadvertitur impressio, quae *isthmus* vocatur, quoad nempe pars media (cornu medium) major vel minor est. Posterior vero secundum formam tracheae, cartilaginumque quibus inhaeret, concava reperitur. Isthmum ¹⁷⁾ isthmum, quo duo lobi conjunguntur, inventum ab *Eustachio* ¹⁷⁾, *Casseri* ¹⁷⁾ restituit et J. v. *Horne*. ¹⁷⁾

§. 6.

Magnitudo variat. Tegit interdum cartilaginis thyreoideae arcum anteriorem, superiorem anulum cartilaginum asperae arteriae, interdum etiam duos annulos. *Hallerus* ¹⁸⁾ vidit glandulam in vetula inferiori loco positam, ut sola summa cornua ad imam cartilagineam thyreoideam venirent, imus isthmus ad sextum anulum descenderet. Interdum in utraque parte magis extenditur, interdum media crassior fit. In sexu femino ¹⁹⁾ major, quam in potiori, et ratione proportionis in foetu et infantibus major, quam in adultis.

§. 7.

Pondus inventum est in adultis ²⁰⁾ unciae unius

15) c. l. p. 283. 16) Epist. IX. n. 36. 17) Explicatio tabularum anatom. *Barthol. Eustachii* ab *Albino* edit. Leid. 1744. T. 41. f. 8. — *Julii Casserii* tabul. anat. a *Spigelio* edit. Venet. 1627. fol. T. I. f. I. inde cum eodem, Amst. 1644. fol. lib. IV. T. II. f. I. — *Joh. v. Horne*, Microcosmus s. manuductio ad hist. corporis humani, Leidae 1666 et postea c. amplis notis *J. Pauli*, Lips. 1707. 8. 18) Element. physiol. tom. c. p. 395. 19) *Columbus* l. c. p. 214. In collum aequabile *Warthon*. l. c. et *Cowper* ad *Bidloo* l. T. 21. 20) *Soemmering* l. c. p. 41.

nonnulli autem scriptores, illam in recens nato ²¹⁾ un-
ae unius, in juvene XXVIII. annorum drachmarum
ptem ponderis invenisse affirmant. ²²⁾

§. 8.

Color exterior in foetu ex sanguinis copia fere
bet, in adultis ²³⁾ hominibus aut ruber est pariter,
et expallescit, in feminis etiam magis. ²⁴⁾

§. 9.

Glandula thyreoidea propria quidem *tunica* in-
ducta non est, sed magis tela ²⁵⁾ cellulosa saepius
tississima, quae plus minusve in illam descendit, cir-
cumsdata et hoc modo vicinis partibus annexa.

§. 10.

Substantia ejus interna spongiosae, valde laxae
texturae, magna vasorum quantitate praedita. In
inflata et exsiccata aut strumosa glandula cavernosam
et cellulosa ejus structuram optime perspicui posse
firmat *Mayerus*. ²⁶⁾ Rotundos sic dictos acinos glandu-
losos non vidit. ²⁷⁾ Vesicularum aliquid simile a
Morgagnio ²⁸⁾ visum, deinde a *L'Alouette* repetitum.
Posterius in sano corpore inspectam et examinatam ex
altis constare frustulis seu acinis glandulosis repere-
nt alii, illamque vocant glandulam conglomerata-
m. ²⁹⁾ Glandula dissecta succus praecipue in foetu
recens nato flavus provenit. In ejus cellulis flaves-

21) *Boecler* l. c. p. 11. 22) *Warthon*. l. l. p. 119. 120. et
Soemmer. l. c. p. 41. 23) *Güntz* l. m. p. 284. — *L'Alou-*
ette l. l. p. 190. 24) *L'Alouette* l. c. p. 160. 25) *Güntz* l. c.
26) *L'Alouette* l. c. p. 165. — *Beschr. des m. K. Bd. IV.*
S. 157. 27) *Morgagnius* tamen *Epist. IX. n. 38.* invenit
eos in morbo corpore, sic *Lauth* in *diss. cit.* et *L'Alouette*
l. c. p. 162. 165. 166. 28) *Epist. IX. n. 38. p. 273. n. 39.*
p. 274. 29) *Ruyschius* et *Schmidtmuellerus* l. c.

centem ³⁰⁾ humorem offendit idem Parisinus medicus quem ut alii mollem, olei amygdalarum ³¹⁾ similem insipide dulcem ³²⁾ in tota undique glandula reperiunt, et qualem in appendice gelatinam memorat *Duvernoy*. ³³⁾

§. 11.

Musculi, qui glandulae thyreoideae incumbunt, illarumque plus minusve degunt premuntque, sternohyoideus ac sternothyreoideus, coracohyoideus et sternocleidomastoideus sunt, et latissimus colli, cui incumbunt integumenta communia ipsa; *Hallerus* ³⁴⁾ de proprio musculo levatore illius, mentionem fecit, quem non in omnibus quidem, in plerisque tamen mortalibus, ³⁵⁾ plerumque sodali destitutum et imparem, plerumque sinistrum rarius quidem et in dextro latere ³⁷⁾ et utrinque vidit. ³⁸⁾ A parte cava, non penitus media, baseos ossis hyoidis ³⁹⁾ suam originem tendineam ducit, finitimus hyothyreoideo, non tamen idem. ⁴⁰⁾ Descendit cum columna glandulae media, et disjectis fibris super anteri-

30) Sic *Morgagnius* Adv. I. n. 35. — *Heister* Ephem. N. cent. VII. VIII. obs. LXIII. 31) Oleosum et viscidum *Fo*
lopius instit. anat. — Quasi olei globuli innatant, *Heist*
Comp. anat. T. II. p. 24. In manati alter succus pene p
taceus est, nam duos continet *Com. Nov. Acad. Petrop.*
VII. p. 315. 32) *Morgagnius* Epist. IX. n. 37. p. 27
33) *Comm. Acad. Petrop. T. VII. p. 216.* 34) *Elem. ph*
siol. Tom. cit. p. 400 - 401. 35) Perpetuum facit *Schre*
berus in edit. *Douglassianae* myographiae p. 58. — *Hab*
Albinus apud *Bohlium* de morsu, et *Heymannum* *Coma*
Boerhaav. p. 457. T. I. 36) *Eustach. l. c. Schreiber l.*
37) *Schreiber l. m.* 37) *Schreiber l. c.* Semel vidit *Ha*
lerus, sinistrum a cornu ossis hyoidis provenisse. 39) *E*
stach. T. 41. f. 5. 8. 40) Eundem esse *Duvernoy l.*
Aberrantem ab eo musculo portionem habet *Cowper T. 3*
f. n. nostri similem; sed qui in cartilagine thyreoidea n
neit.

in faciem glandulae ⁴¹⁾ se disjicit, et involuëro ejus membranaceo eodemque celluloso adhaerescit. Sustinet glandulam, ne a pondere suo detrahatur.

§. 12.

Ratione *vasorum*, quae in glandulam thyreoideam propiuse influunt, haec notanda sunt:

1) *Arteriae*. In quovis latere accipit duas magnas arterias nempe arteriam thyreoideam superiorem et arteriam thyreoideam inferiorem.

a) Arteria thyreoidea *superior* plerumque primus ramus est externae carotidis, idemque ex maximis ⁴²⁾, neque raro omnino cerebrali arteriae aequalis, quam vulgo internam carotidem vocant. In vicinia divisionis carotidis provenit, ut aut tres ⁴³⁾ omnino ejus aunci rami sint, aut paucis super secessionem cerebralis arteriae lineis thyreoidea nascatur. Trunco suo flexuoso introrsum descendit, et quidem cum superiori una cujusque lobi lateralis glandulae cognominis, deinde eo tecta et posterior in sedem isthmi ejus glandulae venit, circumque saepe cum compare perficit. Numerosas propagines, perinde flexuosas in eandem glandulam demittit, quarum surculi lobulorum majorum deinde acinorum intervalla perreptant, ut in glandulis conglomeratis solent. Appendix ejusdem glandulae surculos ab iisdem accipit, qui cum hyoideo ramo arteriae lingualis communicant. Alii surculi asperam arteriam adeunt et vicinos musculos, spatium membranaceum inter os hyoidis et cartilaginem thyreoideam, filamenta utriusque, pharyngem, denique thymum.

b) *Inferior* thyreoidea etiam ex praecipuis arteriis

41) Eustach. l. c. 42) L'Alouette l. l. p. 161. 43) Güntz de arter. maxill. p. 12. — Halleri Fasciculus III. iconum anatom. partium c. h. praecipuarum, Götting. 1747. fol. — Haymann Comm. in I. R. M. Tom. IV. p. 18.

et vertebrali aut aequalis aut demum major ⁴⁴⁾, et tot nonnunquam reliqua subclavia amplior. ⁴⁵⁾ Origo est a subclavia, anterieus quam vertebralis, sed eodem fere loco paulum etiam exterius ad anteriorem scaleni prioris oram. Visa est ex arcu aortae ⁴⁶⁾ prodiisse. Seme rarissimo exemplo ex carotide nasci vidit *Hallerus*. ⁴⁷⁾ Idem vidit ad glandulam cognominem adeo exiguum ramum ivisse, ut negligi possit. ⁴⁸⁾

2) *Venae*, quae sanguinem revehant, magnae sunt. Frequenter sunt binae, quae ex subclavia sinistra sibi vicinae perpetuae ascendunt, et in universum locum tenent inferioris arteriae thyreoideae, ejusque rami minores concomitantur. Alias altera ex ipsa vena cavae divisione ⁴⁹⁾ et demum ex jugulari dextra aut a jugulari ejus lateris venit, aut tres omnino sunt quarum duae in jugularibus, tertia a subclavia sinistra prodit. Rarius unica est, pariter ex sinistra subclavia nata. ⁵⁰⁾ Medio ex thymo ad suam glandulam ascendunt, et in arcum egregium coalescunt, cumque superioribus et mediis thyreoideis etiam coeunt. Mediae venae thyreoideae fere duae ⁵¹⁾ utrinque ad venam jugularem internam pertinent, inter ejusdem venae originem et superiorem sui nominis natae. Cuti, spa

44) *Halleri* Fasc. II. tabul. arter. inf. not. e. 45) Vidit *Hallerius* in recens nato puero diametrum subclaviae fuisse oo. oo. 09., diametrum thyreoideae inferioris oo. oo. 08. superioris oo. oo. 07. 46) *Vink* (Guil.) korte en klare beschryving der beenderen, spieren, en bloodvaten, Rotterdam 1745. 8. p. 50. 47) l. c. 48) Cfr. *Joan. Ern. Neubauer* Rp. A. Chr. *Erdmann* (Gothano), descr. anat. arteriae innominatae et thyreoideae primae. Jenae 1772. 4. c. tab. aen. recus. in *Halleri* opusc. anat. coll., et Fr. *Meckel* Abhandl. l. c. p. 98. et sequ. 49) Veine gutturale *Winslow* T. III Tr. des veines n. 64. 50) *Eustach.* T. 25. 51) Duas habet *Eustachius* T. 25. — Tres aut quatuor ex vena jugulari *L'Aloizette* l. c.

is subcutaneis, et laryngi etiam prospiciunt. Cum superiori et inferiori trunco magnis anastomosibus solum convenire. — Vena thyreoidea superior unica, at ex duabus radicibus in unam conjuncta, sed sodali et vicina suae arteriae, ad supremam sedem cartilaginis thyreoideae et ipsa nascitur; editoque non pro ramo canino, aliquando etiam faciali ad cornu cartilaginis modo dictae, superius se applicat ante osculum sternothyreoideum, atque ad mediam fere sedem glandulae thyreoideae tendit introrsum, truncusque suis per cornu sui lateris descendit, et inter cornu atque appendicem egregiam cum sodali coramum perficit, et maximis per faciem anteriorem hujus glandulae ramis distribuitur.

3) *Vasa lymphatica* a facie et capite in glandulam emergentia, ejusque ex folliculis cellulosis affluentia eunt in truncos majores, qui venas jugulares conconstantur, et se glandulis lymphaticis ibi quam maxime propius insinuant.

§. 13.

Nervos accipit musculus glandulae thyreoideae a nervo hypoglosso, nervique arteriarum thyreoidearum conveniunt e nervo sympathico; an vero praeter hos substantia glandulae thyreoideae proprios adhuc habeat nervos, non sine summo labore cultro potuit demonstrari anatomico.

§. 14.

Hactenus cuncta faciem praeferente anatomia occupant subjici; ad obscuriora nunc delabimur ab aspectus judicio paululum remota, ad quaestionem nempe: *an sit glandula thyreoidea ductibus excretoriis instructa?*

Non deerant quidem varii scriptores, qui ductus glandulae excretorios, quibus succus inhaerens ad cer-

tum quendam locum veheretur, viderint, alii autem qui eos in dubium vocaverint, quin omnino negarint. Ejus generis ovale ostium in anteriore parte glottidis proxime orificium ventriculi, sub angulo ligamentorum inferiorum *Morgagnius* ⁵²⁾ vidit et *Santorinus*. ⁵³⁾ Si *Vaterus* ⁵⁴⁾ credebat, se glandulam replevisse per canalem prope laryngem pervium. *Desnoues* ⁵⁵⁾ paucis verbis, sed tamen certis, ductum ejusdem glandulae sibi inventum tribuit. *Coschwitzius* ⁵⁶⁾ per foramen linguae coecum exonerari eundem adfirmat. *De Bordenau* ⁵⁷⁾ super primum bronchi anulum ostiola, aut in ipso primo anulo ductus vidit, per quas vias glandulam thyreoideam inflavit, setasque immisit. Addidit, dissolutum per medicamenta thyreoideae glandulae tumorem in aquam discessisse, quam aeger per alvum egresserit. *Winslowius* ⁵⁸⁾ aliud vidit ostiolum, cujus ipsa verba produco, cum non in omnium manibus sit magnum opus anatomicum: „occurrit, inquit, interdum fasciculus quasi chorda glandulosa, qui in parte anteriori cartilaginis decurrens disparet ant basin ossis hyoidis. Prodit haec chorda ex medio basos communis portionum lateralium glandulae thyreoideae, et evanescit inter musculos sternohyoideos retro basin ossis hyoidis, quasi inter basin hujus ossis et epiglottidis, cujus ope lingua basi adnectitur. Unum ex his aperturis mihi visa est ut parva papilla perforata, sed ulterius proseguere hanc chordam non potui.” *Duvernoius* ⁵⁹⁾ ab appendice hujus glandulae canalem versus os hyoides deduxisse sibi visus est. *L'Alouette* ⁶⁰⁾ in glandulam impulso flatu, lymphaticum vasa versus thyreoideam et cricoideam cartilagineam

52) Epist. IX. n. 35.

53) l. c. p. 115.

54) l. c. p. 115.

55) Epist. cit. p. 154.

56) in diss. cit.

57) l. c. p. 159.

160.

58) l. c. n. 590.

59) l. m. p. 217.

60) l.

p. 162. 163. 166.

euntia, et in appendice illius vesiculam liquore glandulae impletam animadvertit, impulit aërem in illam, et glandula tota intumuit. *Uttini* et *Schmidtmuellerus* ⁶¹⁾ opinionis sunt, glandulam thyreoideam variis brevissimisque canaliculis cum viis respirationis correspondere.

Tantus numerus illorum auctorum, qui ductus glandulae thyreoideae excretorios viderunt, quantus quoque illorum, qui de existentia eorum dubitarunt, quin imo eam innecessariam declararunt. Jam *veteres* negarunt, quosdam adesse, nec de necessitate illorum fore, quoniam instar spongiae demittat humorem, superne deorsum fluentem. Sic *Galenus* ⁶²⁾, aut quisquis est auctor ille, qui librum *de Voce* et *Anhelitu* scripsit, negat, eam glandulam quemquam ejusmodi canalem obtinuisse, idemque docet *Cassorius* ⁶³⁾. Nec vero ex iis anatomicis, qui post *Placentinum* claruere, quemquam memini me legisse, qui in thyreoidea peculiarem ductum demonstraverit, etsi aliquot legi, qui de ejusdem usibus ita scribunt, quasi eam intra laryngem ductum promittere constaret. *Heisterus* ⁶⁴⁾ multum desudavit in elicienda glandulae hujus structura, ut suam de ductibus illis sententiam explanare possit; et licet hae glandulae ita sint locatae, ut tam oesophago, quam asperae arteriae adhaereant, tamen illam conne-

61) l. c. 62) Tract. 2. „Lingua autem habet duas glandulas, in quibus sunt duae venae, in quibus currit saliva ad linguam, et ad totum os. Collum autem habet duas glandulas, in quibus generatur humiditas. Sed ex duabus glandulis, quae sunt in collo, non proveniunt venae, in quibus currit humor, sicut proveniunt ex duabus glandulis linguae.“ 63) l. c. de larynge l. 3. c. 1. ubi transmissionem humoris thyreoidearum, ait, non fieri glandularum more, quae linguae adjacent, a quibus duae venae ad linguam vergunt humiditatem salivalem sensim percolantes, sed omnibus omnino venis destitutas. 64) *Ephem. N. C. Cent. VIII. observ. LXIII. p. 366.*

xionem haud aliter quam per tenues fibrillas fieri deprehendere, et nunquam cavum aliquod in iis reperire potuit. Noluit tamen hanc ob causam inficiari, transitum, alicujus liquidi hinc ad oesophagum fieri posse, dum satis notum sit anatomicis, fibras musculosas aliasque quam plurimas ad sensum tenuissimas revera cavas esse, et liquidum transmittere, etiamsi nulla seta immitti possit, nec cavitas manifesto appareat. *Vaterus* ⁶⁵⁾ totis triginta annis post illos primos fere suos in re anatomica conatus nihil addidit ad illas suae juventutis voces, et nihil adeo videtur interim reperisse, quo suas spes confirmaret. Ductum ejusdem glandulae a *Coschwitzio* inventum *Hallerus* ⁶⁶⁾ postea pro vena agnovit. *Santorinus* ⁶⁷⁾ nullam de ductu excretorio, quem invenerat, mentionem fecit in posterum. *Morgagnius* ⁶⁸⁾ ostiolum, quod *Santorinus* et ipse viderat, et quod *Winslowius* animadverterat, in iteratis inquisitionibus reperire nequit, et probabile etiam fit *Hallero* ⁶⁹⁾ auctore, arterias a *Cl. de Bordeu* visas esse, quae per ea cartilagineorum annulorum foramina eunt; venas enim ea via ducit ipse, neque venas absque arteriis fuisse credibile est. Sic porro *Cuvier*, *Gautieri* ⁷⁰⁾, *Frank* ⁷¹⁾, *Iphofen* ⁷²⁾, *Koberwein* ⁷³⁾ et *Parrens noster* alique viri *Cl.* harum rerum subtilium inquisitionem atque explorationem saepius instituerunt, ut, quid circa haec observarint, ipsi describere possint; sed quod dolendum, in ductibus illis investigandis ad lucem aliquam facilioris rationis per difficillimam hanc doctrinam non pervenerunt. Sic denique plurimi nostrae aetatis anatomici nullum aut nullos hu-

65) Museum anat. proprium, Helmst. 1750. 4. cum *Heisteri* praefatione. 66) diss. cit. 67) l. c. p. 115. 68) Adv. I. p. 35. 36. Adv. V. p. 66. 69) Elem. physiol. Tom. cit. p. 399. 70) l. l. p. 97. 71) l. m. pag. 246. 72) l. c. p. 27. 73) vid. *Iphofen* pagina cit.

jus glandulae ductus excretorios ad id usque temporis invenerunt; nihilo minus autem neutiquam diffidendum, sed multo potius sperandum esse ex hisce etiam omnibus apparet; puto enim, fore, ut anatomici recentiores studio suo indefesso arteque partes corporis humani subtiliores praeparandi magis perfecta adauctaque lucem de hac re nobis reddant majorem, et forsitan forte fortuna illos inveniant.

§. 15.

Differt haec glandula thyreoidea ratione sexus et aetatis, sicuti in §. §. 6. 7. et 8. enarratum fuit, magnitudine, pondere et colore. Restat tamen adhuc adnotare, illam in foetu ratione majorem ⁷⁴⁾ glandulam senio minui. Nam non raro accidit, ut in senibus hanc glandulam inter et cartilaginem thyreoideam majora intervalla, vasa compressa et ossificata, et saepius in substantia glandulae concrementa ossea reperiantur. ⁷⁵⁾

§. 16.

Tandem nec omittenda sunt quaedam, quae ad comparatam anatomiam spectant. Animalia quidem bruta, reliqui corporis ratione habita, minorem fere glandulam thyreoideam sicuti hucusque observatum est, habere videntur, quam homines; certe id de bove *Warthonii* ⁷⁶⁾ mensurae testantur, qui hominis thyreoideam glandulam 15 drachm. bovis $8\frac{2}{3}$ aequare invenit. Deinde in iisdem per vitam quam plurimum et citius quam in homine decrescere hanc glandulam no-

⁷⁴⁾ *Danz* (F. G.) Grundriss der Zergliederungskunde des neugeborenen Kindes, Gießen 1793. T. II. p. 49. ⁷⁵⁾ *Seiler* (B. Gu.) anatomiae c. h. senilis specimen. Erlang. 1799. 3. p. 78. — *Evertzen* in diss. cit. delineat tab. III. annosi, imo aetate confecti corporis anilis eandem glandulam, quam inter et cartilaginem thyreoideam idem in senibus insignem adesse distantiam adnotat. ⁷⁶⁾ l. c. cap. 18.

tavit *Cheseldenus*. ⁷⁷⁾ Attamen glandula quadrumenorum thyreoidea humanae figura et incremento non interrupto proxime accedit. In pluribus simiarum ordinibus *Meckelius* ⁷⁸⁾ illam observavit, cujus autem praesentiam *Schelverus* ⁷⁹⁾ temere in dubium vocare studuit. — Unica ⁸⁰⁾ longe plerumque est in homine ex intima majorum cornuum conjunctione, ad basin imprimis et in ejus crassiori petiolo, rarissime in duas divisa, ut semel viderit in homine *Hallerus* ⁸¹⁾, semel *Morgagnius* ⁸²⁾, viderit etiam *Schulzius* ⁸³⁾, et pene duas pinxerit *Eustachius* ⁸⁴⁾, isthmumque parvum ac pene nullum viderit *Arent. Cant* ⁸⁵⁾; nam in animalibus frequens est, et fraudi fuit *Cl. viris*, qui eandem in hominis descriptione fabricam receperunt; sic in ove et fele *L'Alouette* ⁸⁶⁾, in equo *Bourgelat* ⁸⁷⁾, in cane *Evertzen* ⁸⁸⁾, in mure *Morgagnius* ⁸⁹⁾, in lepore idem, in delphino delphide et phoca vitulina, in elephanto, in solidungulis, in catibus et vespertilionibus *cel. Carus* ⁹⁰⁾ duos lobulos maxime conspicuos inque medio penitus a se invicem disjunctos observarunt. Isthmum vero, quo duo laterales lobi junguntur, in bove nonnunquam, et in pluribus simiarum atque ursorum ordinibus inveniri *Morgagnius* ⁹¹⁾, *L'Alouette* ⁹²⁾ et *Carus* ⁹³⁾ paucis quidem verbis, sed animi sensus exprimentibus, affirmant. — Cetaceis glandulam thyreoi-

77) the Anatomy of human body, London 1763. p. 213. 78) l. m. p. 94. et sequ. 79) Diar. cit. 5ter Bd. 1. St. 1802. p. 180. et sequ. 80) *Cowper* ad *Bidloo*, T. 24. f. 8., tum in diss. *Cl. Evertzen*, et imprimis *Morgagnius* Epist. IX, n. 33. 81) Elem. physiol. Tom. cit. p. 394. 82) Epist. IX. n. 40. 83) apud *Buchner*. miscell. 1727. p. 252. et de oss. conservent. 84) l. c. 25. 85) Impetus primi anat. ex illustratis cadaveribus nati, Leidae 1721. fol. p. 16. 86) l. l. p. 164. 165. 87) l. c. p. 504. 88) Mém. des savans étrangers T. I. 89) Epist. IX. n. 30. 90) l. c. p. 574. 91) Epist. IX. n. 30. 92) l. c. T. 2. f. 4. 93) l. m. 574.

deam deesse contendit *Hunterus* ⁹⁴⁾, e contra autem *Stellerus* ⁹⁵⁾ et *Cuvierus* ⁹⁶⁾ hanc in manatibus, quae nuperrime cetaceis adnumerabantur, deprehenderunt. Major in carnivoris, quam in herbivoris esse videtur, major in animalibus sonoris, quam mutis observatur. In avibus autem *Meckelius*, ⁹⁷⁾ qui multum hac in re sudavit, nihil, quod ad similitudinem glandulae illius accessit, potuit invenire; nam corpuscula illa rubra eademque glandulosa, quae, ut in turbis avium novellis, in grallis atque anseribus adultis manifestum est, lateribus asperae arteriae non longe ab ore pectoris adsident, pro thymo habuit vir clarissimus. Jam vero *Tiedemannus* ⁹⁸⁾ de veritate sententiae illius non convictus in hanc quoque arenam prodiit, rem aliquam natura sua difficilem, scitu utilem, nullique percognitam curiose diligenterque excussurus, qua tandem via ad lucem aliquam facilioris rationis per difficillimam hanc doctrinam possit pervenire atque ita ad viscera causae penetrare. Facile enim ex multis experimentis, quae ad demonstrandam hanc sententiam a viro elegantissimi ingenii haud vulgari ratione sunt facta, intelligitur, carunculas illas coacervatas signum glandulae thyreoideae habitu prae se ferre, cum non solum in iis avium ordinibus, quos enarravimus, occurrant, sed etiam in aliis sint obviae, ut in falcone, ardea, otide, columba, corvo marino, sturno vulgari, atque ita in iisdem, quod ad rem nostram potissimum spectat, sint locatae, ut in vicinia organorum vocis insideant. Quibus causis ducti *Ballantius* ⁹⁹⁾ alique hanc quoque sententiam praeferendam duxerunt, praesertim cum per experimenta *Tiedemanni*, viri consilio ac ratione

94) Phil. Trans. VI. LXIV. P. I. anatomia Cetaceorum, deutsch in *Schneider's* Beiträgen zur Naturgeschichte der Wallfischarten, T. I. 95) diss. cit. 96) l. c. 97) l. m. 98) l. l. B. 2, S. 688. 99) diar. cit.

agentis, res ita videatur vestigiis certissimis confirmari, ut omnino contraria opinio stare nequeat. Agreste tamen proverbium: „Suo quisque modulo res metitur:“ ad quaestionem nostram non temere et vi illata detorqueri posse, quisque videt, qui ad verba ab *Exp. Caro* consideratissime lecta attenderit; suspicatur enim idem *cl. vir*¹⁰⁰⁾, thymum et glandulam thyreoideam tam in plerisque avium generibus quam in compluribus aliis animalibus non diversa natura indutas esse, neque in loco diverso localas, sed summa potius concordia et occulta quadam naturae conspiratione in unum atque idem stratum glandulosum, quod denso involucro firmatum sit, confluere. — Quaestionis igitur momentum, undelibet illud spectaveris, summum et gravissimum cernitur, meque intelligentiores de hisce viro-
rum doct. sententiis iudicium faciant, praesertim cum secreta illa anatomiae comparatae libare, non penetrare, intelligere, non profiteri, cumque in hac explicatione non tanquam anatomicus et philosophus versari, sed diversa tantummodo iudicia et disceptationes paulo fusius enumerare voluerim. — Jam si ab avibus ad amphibia descendis, eandem glandulae thyreoideae texturam atque structuram denuo comprobata videbis. In reptilibus ut in rana esculenta *Exp. Carus*¹⁰¹⁾ grana duo glandulosa, quae in utroque latere ossis hyoidei, et in superficie ventriculi laryngis interna sunt locata, reperiri affirmat, nec possum me continere, quin et ego in hanc *cl. viri* sententiam animum inclinem, cum id utique cum omnibus meis incisionibus consentiat. *Treviranus*¹⁰²⁾ autem solidam harum glandularum praesentiam in dubium vocare studuit, atque thymum et glandulam thyreoideam ranæ esculentae hyemali tantummodo tempore in ejusdem collo animadverti et tunc etiam cultro facilius dissolvi

100) 573. 101) l. c. p. 571 — 572. 102) l. m. 1r Bd. S. 96.

posse, e contra autem primo vere occulta quadam naturae lege removeri discrete declaravit. At clarissimo tamen *Dresdensi Medico* ¹⁰³⁾ certum est, quid respondeat, et quibus argumentis sententiam suam tueatur; faciamus eum ipsum loquentem: „corpuscula illa a *Trevirano* pro thymo et glandula thyreoidea habita nullo modo signum glandulosae structurae prae se ferunt, sed ad grana adiposa coacervata sunt referenda, quae certis temporibus in collo ranae esculentae formantur et tunc denuo dissolvuntur.“ Non igitur praevallet illius viri sententia contra receptam opinionem.— Sed redeamus, unde aberravit oratio. Serpentes, quae propter tenuitatem medullae spinalis, brevitatem tubi intestinalis, pulmonem fere imparem, vocem minus excultam et extremitatum defectum ranis inferiores existimandae sunt, *Caro* ¹⁰⁴⁾ tamen *auctore* carunculis glandulosis coacervatis in cordis vicinia affixis omnino non carent, atque ita profecto glandula thyreoidea praeditae sunt; in tenerioribus denique crocodilis grana duo tam glandulosa quam adiposa, quae ad utrumque colli latus laxius cellulosi fibris adhaerent, ab eodem *illustri viro* pro glandula thyreoidea habentur ¹⁰⁵⁾.— In piscibus nullum plane vestigium glandulae thyreoideae, maxima opera atque intentione a *Cl. viris* adhibita, inveniri potest. Sed haec ex hujusce materiae ubertate delibasse sufficiat; a pluribus enim proferendis mihi temperandum esse censi, ne libellus in libri molem excrescat.

¹⁰³⁾ l. l. p. 572.

¹⁰⁴⁾ l. c. p. 572.

¹⁰⁵⁾ l. l. p. 572.

C A P U T II.

Physiologia glandulae thyreoideae.

De glandula thyreoidea vix quicquam, nisi per conjecturam, licebit hariolari.

H E D E N U S.

§. 17.

Pauca sunt organa, de quorum usu jam inde ab antiquissimis temporibus tantopere sit inter physiologos disceptatum, quam de glandula thyreoidea. Si quis attento animo tam veterum, quam recentiorum circa hanc partem, et in statu sano et morbo, disquisitiones perscrutetur, tunc animadvertet, ob solam hujus visceris formam externam, glandulae scilicet conglomeratae, haud parvum eorum numerum maxima diligentia hujus partis ut glandulae functiones examinasse, ejusque affectiones pathologicas glandularum morbis adnumerasse. Nostris vero temporibus ubi anatomia magis provecta jam fusius docuit, glandulae natura viscus istuc vel minime gaudere, quippe quod omni ductu excretorio, quo omnes glandulae instructae sunt, destitutum sit, permulti, ut ad veritatem pervenirent, aliam sibi viam ingrediendam esse censuerunt. Et numerosas sunt hypotheses de hujus partis usu ab auctoribus propositae, quarum unam vel alteram pro nostro proposito paucis hic attingere liceat.

§. 18.

Quatuor fere sunt de glandulae thyreoideae usu sententiae. Vetus est et saepenumero laudata illa *Ruyhii* ¹⁰⁶⁾, peculiarem quendam in ea liquorem parari, si postea venis sanguiferis inferatur. Optime vero permulti physiologi repugnant; naturam enim, quod *Schregerus* ¹⁰⁷⁾ jam recte monuit, liquorem in proprio scire magno vasorum apparatu sollicitè confectum, nequam usui alicui impensum fuerit, in sanguinem statim amandare, sine dubio naturae contraria est hypothesis, cum haud probari possit, succum illum usum emendam ad peragendum circulum sanguinis exserere, vel ut perparva sanguinis quantitas mutetur, necessarium esse. Sed secretionis omni apparatu glandulam parere, argumentum est, vel maxime hypothesei contrarium. Est tamen, aliquis objiciet, liquor in glandula obvius, serosus, flavescens, leniter viscidus ¹⁰⁸⁾ junioribus praesertim. At humor iste neque peculiari est indole, neque a lymphâ differt, quae in cellularum cavernulis ubique, maxime in junioribus, quibus corporis textura minori est soliditate, reperitur. Inest enim foetus sanguini lymphae major quantitas, omne re corpus lymphâ scatet, et liquor in glandula thyreoidea fetali dominans, nimirum advehentium vasorum multitudini ita respondet, ut vix singulare naturae institutum inde conjici possit. Ceterum talis formae liquor in adultorum glandula thyreoidea vix animadvertendus est. Et glandulam neque emendandae lymphae, neque sanguinis fetus naturae magis attemperandi causa adesse, jam dudum validis argumentis physiologis refutatum est ¹⁰⁹⁾.

¹⁰⁶⁾ de *Westhofen* diss. cit. p. 42. et *Schregeri* frag. cit. p. 16. 17. ¹⁰⁷⁾ *Fragm.* cit. p. 17. ¹⁰⁸⁾ *Alb. v. Haller* primae lin. physiol., Goett. 1765. 3. Edit. p. §. 299. p. 129. ¹⁰⁹⁾ *Schreger* l. c.

§. 19.

Altera quaedam est, sed inanis partim, si primus non datur, de glandula thyreoidea hypothesis, succurrit scilicet quendam secernere glandulam, qui in laryngis sinus ad eundem fere, quem glandulae sic dictae muciparae ibi degentes usum exserant, deportetur ¹¹⁰⁾ has enim isti haud sufficere officio, viscereque istius proprio hunc in finem opus esse, nonnullis visum est. Abest vero omnis glandulae cum larynge per meatus communio, qua succus iste in eam deveniat, et experimenta, quae huc spectant, quibus demonstrare tale meatus conatus est *Fodereius* ¹¹¹⁾, sicuti nimis impetuose instituta sunt, nihil probant, nisi omnibus corporis partibus per cellulosam compagem quandam communionem esse. Anatomiam enim ad tantum perfectionis gradum pervenisse, quo eam minimi etiam meatus haud latuissent, jam nemo hodie in dubium vocabit. Argumentum istud, esse in corpore vias, quae examen anatomicum haud detegere valeat, me quidem iudice tam irritum est in physiologicis, quam supervacaneum in pathologicis, ubi leges associationis, antagonismi, sympathiae, consensus vel melius phaenomena explicant, quam ipsae viae latentes hypotheticae.

§. 20.

Tertia est, et sane speciosa hypothesis a *Schregero* ¹¹²⁾, *Soemmeringio* ¹¹³⁾, *Ackermannno* ¹¹⁴⁾, *Ruschio* ¹¹⁵⁾ et ab *Hofrichtero* l. c. — proposita, glandularum scilicet adesse, ut sanguinis inmodicos appulsus versus caput abarceat et moderetur, ideoque cerebrum

¹¹⁰⁾ *Uttini* l. l. — *Fodéré* l. m. §. 11. — *Schmidtmueller* l. c.
¹¹¹⁾ *ibid.* p. 13. 14. 15. — Cfr. *Wichmann's Ideen zur Diagnostik* Bd. 1. p. 122. — Cfr. *Halleri Elem. physiol.* Tom. ci. p. 398. aërem ex trachea glandulam ingredi posse. — *Gautier* l. c. p. 148. ¹¹²⁾ l. c. p. 21. ¹¹³⁾ l. l. ¹¹⁴⁾ *diss. cit.* p. 27. ¹¹⁵⁾ *diario cit.* p. 195.

anguinis injuria, illo nimis veloci appulsu, sicuti rete mirabile in animalibus brutis cerebrum tneatur ¹¹⁶). Magni hodie permulti physiologi hancce faciunt hypothesin; sunt tamen argumenta quaedam, ut mihi videtur, haud aspernanda, quae contra istam militent, eorum unum vel alterum hic recensere liceat. Simulando partium quoad formam, structuram, situm, nomen, vel in diversis animantibus, nimirum jure nos functionum similitudinem supponendam inducit. Si vero omnino absunt istaece conditiones, si partis cujusdam in animantibus functio hypothetica nonnihil reperitur, tum sane in lubrico est conclusio, qua eundem usum partis cujusdam in corpore humano demonstrare conantur. Et aliena est, ni fallor, ipsa cum illi mirabili, animantibus proprio, thyreoideae glandulae comparatio ob diversitatem structurae, sedis,exusque cum adjacentibus partibus. In animantibus sicut carotidis propagines rete sic dictum mirabile componunt, in homine propria arteria viscus init glandulosum, idque magna ex parte constituit; animadvertuntur nervi, vasa resorbentia, telaque cellulosa, ut proprium partis parenchyma, singula continens. Constat in brutis rete istuc, postquam carotis foramen craniale transgressa est, (abest enim in brutis flexuosus canalis carotidis, quem in homine videmus) craniique basi imponitur, sed a capite remota glandula sedem consecuta est. Et quod ad locum attinet, nemo certe non persuasum habebit, forte quadam, quia nempe des opportunior omnino abfuerit, tam intimo nexu glandulam cum larynge, tam eximio organo conjunctam esse, ac nervis iisdem, quibus larynx instruitur,

¹¹⁶) *Hoffmanniana* ista de thymo hypothesi nisus, auctor noster suam de glandula thyreoidea proposuit, quod ipse fatetur in l. m. l. p. 19. Voluit enim *Hoffmannus* thymum chylo diverticulo inservire, ne ejus vi oneretur cerebrum.

iisdemque vasis, quibus irroratur, gaudere. Sed mi-
 tamus haec, et ulterius paululum progrediamur liceat.
 Quaestio enim exoritur, qui fieri possit, ut frangat
 glandula sanguinis ad caput appulsum. Si vasa arte-
 riosa in statu corporis sani quieto sanguinem ad caput
 vehunt, certam ejus quantitatem cerebro, certam e-
 iam glandulae inferunt, justam scilicet, qua minores
 nec cerebrum, nec glandula bene se habent, quod jun-
 conjicimus. Si versus caput angetur sanguinis affluxus
 majorem utrumque viscus fluidi istius quantitatem ob-
 tinet, eadem vero est distributionis ratio, aequilibrium
 nimirum haud invertitur, unum est idemque, de ma-
 jori nunc solummodo, respectu status quieti, sangui-
 nis quantitate agitur. Unica nunc esset conditio, quae
 glandula thyreoidea sanguinis versus caput affluxum
 abarcere et moderari possit, ea nempe, qua isto ipsius
 tempore, quo sanguinis impetuosior fit impulsus, ae-
 quilibrium ita tollatur, ut nunc ad majorem sanguinis
 quantitatem recipiendam apta evadat glandula. Hanc
 vero in isto statu majorem sanguinis quantitatem im-
 bibere, quo distributionis sanguinis aequilibrium in-
 vertatur, quod sine dubio necesse est, si usum illum
 jure ei adscribere volumus, nemo usque eo, quod scimus,
 demonstravit. De glandulae laxitate, vasorum
 flexuris et contorsionibus praedixerunt physiologi, quae
 quidem aequilibrium haud subvertunt, nisi adhuc ali-
 quid accedat. Glandulae laxitas vix eximia est, et in
 congestionibus sanguinis ad caput memorabilem hujus
 partis tumorem non animadvertimus. Irritantur
 subito in glandula exortum dum necesse est, quod a-
 influendum invitet sanguinem, vita sive functio glandulae
 propria, quae id efficiat, actio azygi musculi
 minimi istius inconstantisque, revera nimis hypothetice
 rem explanant. — Sed haec hactenus. Sententia
 aliorum, qui ductus excretorios in glandula thyreoidea
 non viderunt, illosque negant, brevi tantummodo

comprehendam oratione, cum magnam ab utilitate commendationem non habeant, sicque ex hac enumeratione usum hujus glandulae non minus ac huic similibus organorum, e. g. thymi, suprarenalium, lienis interitum esse, et adhuc latere patebit. Sic nonnulli physiologi ¹¹⁷⁾ eam, ut frigus a larynge et trachea abarceat, et ut collo venustatem quandam, formamque pulchritudinem conciliet, adesse putabant. Etsi negare nolo, glandulam thyreoideam huncce usum simul praestare posse, eam tamen hoc tantum munere, cui adipe somnium opus esset, fungi non arbitror, nec intelligo, cur natura hanc ab causam organon tam diligenter exculcitra- vim extruxisset. *Vercellonius* ¹¹⁸⁾ eam nidum ovorum verminosorum constituit, ex quo per subtilissimos ductulos, quorum meatus tamen non in conspectum venirent, ovula verminosa in hac glandula generata in oesophagum et inde ad ventriculum pro characterem vitali chylo in ventriculo impertiendo atque digestionem promovenda transmitterentur, quae ovula in statu praeter naturam saepe in vermes abirent. De hujus vero opinionis errore *Heisterum* ¹¹⁹⁾ faciamus solum loquentem: „ejus, inquit, sententia de vermium ovulis in glandula thyreoidea naturaliter existentibus, eorumque usus et status praeternaturalis, longe pluribus difficultatibus et dubiis est obnoxia, dum nec tantum ovula, aut ut verum fatear, nec ductus, quales videri debent, perhibet, in ea reperire aut observare unquam potui.“ *Warthonio* ¹²⁰⁾, qui ductus excretorios sibi assignabat, usus glandulae thyreoideae primarius ac praecipuus esse videtur, superfluas quasdam nervi recurrentis humiditates excipere, et in venosum genus deorsum deducere per lymphae ductus suos; deinde carti-

¹¹⁷⁾ *Soemmering*. l. c. 5ter Th. 2te Abth. p. 44. ¹¹⁸⁾ diss. cit. ¹¹⁹⁾ *Ephem. N. C.* cent. VIII. p. 366. ¹²⁰⁾ l. c. p. 119. 120. In *Mangetti thesauro anat.* II. p. 734.

lagines frigidiores, quibus affigitur, calore suo foveri et laryngis lubricationi suis halitibus conducere adeoque vocem leviolem, sonoram, suaviolemque reddere *Heisterus* ¹²¹⁾ hac solum ratione usus in delineatione glandulae illius adhuc addit, quod, quamvis ob incognitos ductus excretorios nondum certo definitus et demonstratus sit, tamen ob situm et connexionem quam habent glandulae illae coacervatae tam cum aspera arteria, quam cum oesophago, tum etiam ob liquidum humectantis et lubricantis necessitatem in utroque hoc canali, sibi perquam verisimile sit, eas tam asperae arteriae, quam oesophago per tenuissimos ductulos sive fibras, quarum cavum in sensus non incidit, liquidum aliquod infundere, quod in oesophago non solum pro lubricatione, sed etiam in ventriculo pro menstruo sive liquido alimenta solvente inservire potest, in trachea vero pro ea lubricanda et ab ariditate et siccitate praecavenda: non tam e thyreoidea, quam bronchialibus, si premuntur, liquidum quoddam lubricum et oleosum exprimi potest; tam insignes enim et notabiles glandulas tracheae et gulae sine singulari utilitate adhaerere haud probabile est. *Astrucius* ¹²²⁾ suspicatur, glandulam eam esse lymphaticam structura sui generis, et quidem nulli alii usui inservire, quam ut receptaculum sit lymphae a capite et facie hic affluentis ad venam subclaviam sinistram aut ad ductum thoracicum legibus naturae revectae. *Cowper* ¹²³⁾ receptaculum superabundantis chyli illam esse affirmat. *Bellinger* ¹²⁴⁾ cum aliis glandulam thyreoidream in foetu secernere peculiarem succum ad ejus nutritionem, qui postea per proprios ductus sursum ad os deferatur, existimat. *Roesslinus* ¹²⁵⁾ contendit, maternum sanguinem in placenta jam multum muta-

121) Ephem. N. C. cent. VIII. obs. LXIII. p. 568. 122) l. m. p. 166. 123) l. c. 124) l. l. 125) l. c.

in minimarum glandulae thyreoideae arteriarum
 vera foetus naturae magis attemperari sicque lauda-
 liorem ad venas reliquumque corpus transferri. *Boek-
 rus* ¹²⁶⁾ glandulam thyreoideam pro pulmonibus san-
 tificationem in foetu promovere declarat. *Heckerus* ¹²⁷⁾
 eo adesse putat, ut infinitis ejus arteriolis calor ex
 sanguine partim excitetur, talique modo summa calo-
 ris in corpore diffusa adaugeatur. *Autenriethius* ¹²⁸⁾
 quaerit, an hoc organo sanguis ad mutationem in pul-
 monibus experiendam praeparetur. *Cuviero* explo-
 ratum est, glandulam hancce non esse organon excer-
 nens, sed secernens tantummodo.

§. 21.

Inter modo recensitas hypotheses nulla est, ut
 detur, idonea, quae glandulae thyreoideae usum sa-
 tis denotet. Quod physiologi animadvertentes rem
 illis commentis aggressi sunt, quae in eo omnes con-
 veniunt, quod usum quendam in laryngem adscribunt
 glandulae. Volunt enim alii ¹²⁹⁾, vocem moderari glan-
 dulam, si actione M. M. sternohyoideorum et sterno-
 thyreoideorum ad laryngem apprimatur, vocem potius
 laugeri, si sursum ad tollitur glandula absque larynge
 movetur, ope musculi azygi. Constat vero vocis
 quantitatem ab aëris cum glottidis angustia efflati quan-
 tate dependere, neque omnino tale quid per glandu-
 lam effici eo verisimile fit, quod laryngis elevatio et
 depressio glottidis coarctationi et amplificationi, ma-
 jori vel minori ligamentorum tensioni respondeant, so-

¹²⁶⁾ disp. cit. — ¹²⁷⁾ l. m. — ¹²⁸⁾ l. l. 1ster Theil. p. 270. 272.
¹²⁹⁾ *Mayer* diss. cit. et Beschreib. des menschl. Körpers, 4ter
 Ed. p. 160. — *Ballantius* in Comm. Bonon. VI. 1783. senten-
 tiam illam anatomia comparata confirmare studet, quippe qui
 glandulam thyreoideam in avium laryngē inferiore, qui earum
 vocis organon sit, collocatam invenit.

lummodo toni qualitatem, haud vero quantitatem producunt, et si quam maxime id fieri potest, larynx descensa est, ubi ex hypothese maximam in eam actionem exsereret, tum vox gravissima nil fere nisi mutuus efflatus est, qui moderatione minime eget ¹³⁰⁾.

Quae igitur omnia quis talia esse non intelligit, ut multae dubitationi locum relinquunt? In tanta autem ipsius quaestionis difficultate etiamsi hoc me assequi posse prorsus desperem, ut glandulae thyreoideae officium explicem, arduum tamen quodammodo id ipsum esse mihi videtur in physiologicis praesertim, vera et falsis, ut grana a palea disjungere et multo etiam difficilius tenebras discutere, et ad veritatis adyta usque penetrare. Quam de officio glandulae thyreoideae physiologico propono hypothesin, ne me pluris eam facere sibi persuasum habeat lector; abest hoc a consuetudine mea, abest a natura plurimum. Sunt tamen et ipsae hypotheses non usque quoque aspernandae, immo probandae potius, si quae rerum faciem quandam ita attingant, ut, dum naturae non contrariae evadant, veritati forsitan paullulum propius accedant.

§. 22.

Sedes glandulae thyreoideae in larynge, intimus ejus cum illo principe vocis organo nexus, ac per vasa nervosque conjunctio, ad quod etiam accedit, quod anatomia comparata ut firmum argumentum suppeditat, in avibus nempe, ubi larynx in duas ab invicem remotas partes divisa jacet, glandulam thyreoideam in inferiori, ea scilicet, quae vocis formationi praeest, parte, collocatam esse, nobis haud obscure physiolo-

¹³⁰⁾ *Alb. v. Haller. prim. lin. physiol. §. 305 — 307. Ejusdem Grundr. d. Physiol. etc. mit Verbesser. v. Wrisberg, Soemmering u. Meckel, umgearbeitet v. Leveling, Th. 1. Erlangen 1800. 8. Cap. VIII. Abschnitt 1. u. 2. — Gautieri l. c. p. 195.*

gicam inter laryngem et glandulam thyreoideam intercedentem communionem indigitare videtur. Hanc si quis accuratius examinare studeat, necesse est, me quidem iudice, ut paullulum a glandula thyreoidea recedens, similes quosdam sibi in corpore apparatus quaerant, eorumque conditiones serius secum perpendat reputetque, quo clarior partis usus fiat, cujus officium non nisi per tenebras intueri licet. Nec desunt glandulae thyreoideae cum aliis corporis partibus comparationes, minus tamen fructuosae, quod semper fere glandulae notioni inhaeserunt, rectiusque functionem huius visceris indagandi viam sibi occluserunt. Mittamus igitur paullulum glandulae notionem, et vasculosam potius visceris structuram respiciamus.

§. 23.

Organismus totum constituit, in quo principalia ista nervorum scilicet ac vasorum systemata, quae sensibilitati et irritabilitati sensu latiori respondent, tam intime conjuncta, et ad unum confusa apparent, ut idea solummodo ab invicem separari eorumque functiones separatim recenseri possint. Irritabilitatem sine nervorum actione haud cogitari posse, contra vero nec sensibilitatem sine irritabilitatis actione esse, ex physiologicis disputationibus satis constat.¹³¹⁾ Ut functiones suas praestet systema nervorum, irritabilis systematis actione opus esse, quod a natura ubique in corpore indicatur, ubi vasorum retia ad nervos collocata minus partium nutritioni inserviunt quam ut potius nervorum actiones adjuvent. In sensuum organis, quae omnino subtiliore organisatione gaudent, hoc clarius apparet, cum hic vasorum et nervorum systemata magis unum ad alterum, ut ita dicam, vivo nexu po-

¹³¹⁾ Grundriss der Physiologie von *Leveling*, 1. l. Th. 2. Abschn. 5. Ursachen der Veränderungen am Muskel.

sita, quam in unum confusa videantur. Et inter sensuum instrumenta ante omnia oculus est, qui amborum systematum in agendo communionem eo clarius designat, quo distinctius ibi partis sensibilis et irritabilis separatio evasit. Pars sensibilis retinae extensione nervo illo calice, irritabilis chorioideae vasculoso reti isto circumducto, representatae sunt. Chorioideam ad visum aliquid facere haud dubitandum est ¹³²⁾, multisque observationibus comprobatur; visum actuositatis mutuae retinae in chorioideam, huiusque in illam productum esse, inter omnes hodie convenit. Sed mutua illa horum systematum actuositas, qua intercedente organi functio procedit, non in solo oculo, quamvis in eo clarissime, aut solis sensuum instrumentis, verum ubique in corpore deprehenditur; in iis autem partibus prolixius in conspectum se prodit, quae, dum eximiae cuidam functioni praesunt, majori necessario vis vitalis consumptione utuntur. Si musculorum v. c. structuram attentius contemplamur, vasorum abundantiam, qua ubivis artificiose fibris intertextis reticulis fere toti scatent, vel primo intuitu animadvertimus. Tantam vasorum compagem haud soli musculorum nutritioni inservire, extra omnem dubitationis aleam positum videtur ¹³³⁾, quod physiologorum unum et alterum ad credendum induxit, fibrae muscularis contractionem vasorum istorum repletionem peragi ¹³⁴⁾. Quid huic contractionis theoriae obstat, non est, quod multis hic commemoremus; id solummodo adjungere liceat, an non contractio muscularis, vis nervorum atque irritabilitatis invicem agentium productum sit, fibra muscularis instrumentum est, et quomodo ejus contractio procedat, tamdiu extra omnes observationis

132) Alii in chorioidea visus organon invenerunt. 133) Lehre-
sätze aus d. Physiologie etc. von Dr. G. Prochaska, Wien 1810.
Ed. 1. §. 358. 134) Prochaska l. m. l.

fines positum est, quamdiu virium istarum natura in occulto latet; contractio enim muscularis unum idemque phaenomenon ac vires istae videtur esse, quae musculari organisatione modificatae et ad novum quoddam phaenomenon provocandum aptae evadunt. ¹³⁵⁾

§. 24.

His exemplis, quibus satis comprobatur, vasorum retia saepius organis imposita esse, ut eorum functionibus, dum in nervos ibi degentes aliquo modo agant, (quamvis leges, secundum quas actio illa procedit, ignotae sint,) prospiciant, multa etiam adnumerari possunt. Verum si corporis organisationem rite examinamus, partiumque singularium functiones attentius recensemus, nimirum ad argumentum perducimur, eo naturam majorem vasorum compagem collocasse, quo partis cujusdam functio, ut instrumenti artificiosi atque compliciti, majoris omnino momenti est, majorisque etiam nervorum apparatus indiget. Quo major, quod jam supra commemoratum est, vis vitalis consumptio evadit, eo major nervorum vasorumque apparatus deprehenditur. Sic omnia fere organa, ad quae a cerebro nervi proveniunt, majori vasorum apparatu praedita esse videntur, quippe quae partim subtilioribus, partim organismo magis necessariis functionibus praesint; soli nutritioni vasa ista haud destinata esse, ratione habita magnitudinis, structurae, functionisque organorum, luculenter apparet, et cum semper nervorum apparatus, cui adjacent, respondeant vasorum reticula, jure actionem, quam in nervos exserant, conjicimus. In oculo v. c. in membranam nerveam, retinam, desinit nervus, ibi quoque ad jacens vascula membranula deprehenditur, et sic fere ubique in corpore. Videas reticularem vasorum

¹³⁵⁾ Prochaska l. m. l. § 356.

in nasi cavo distributionem, ubi olfactorii et quinti ramificationibus intertexta sunt; nervos et vasa in iride in unum organon conjuncta et quasi confusa, ubi ne dici quidem potest, solos nervos, vel vasa sola esse, quibus mediantibus membranae functio peragatur. Ibi mutua systematum actio clare cognoscitur. Nonne etiam ipsius cerebri structurae hic mentio fieri possit, ubi pia mater plexuumque choroideorum varius decursus ac cum cerebro nexus simile quid significet? Substantia corticalis fere tota vasculis composita esse visa est, et pro magnitudinis ratione cerebro majorem sanguinis quantitatem, quam nutritioni par sit, induci, omnes profitentur. Sensorium commune alios in ipso ventriculorum cerebri humore posuisse, si nil aliud, tamen quanti istorum vasorum, plexuum lateralium scilicet, functiones fecerint, satis probat. — His rite perpensis, nihil impedit, ut opinor, quo minus argumento isto ad glandulae thyreoideae officium physiologicum explicandum utamur, paucisque verbis comprehensa, haec esset hypothesis: ¹³⁶⁾ glandulam thyroideam nexu cum larynge dinamico gaudere, ejusque officium in eo consistere, ut laryngis functionibus, vitae ejus propriae, dum vasorum retia in nervos, vocis istud organon ingredientibus, vivam actionem exserant, consulat prospiciatque. Quae cum ista militent hypothesis, breviter in medium proferre liceat.

§. 25.

Quod ubique fere in corpore intertextis vasorum retibus consecuta est, id in exstruenda larynge nonnisi proprio viscere naturam perpetrasse, valdopere cum

¹³⁶⁾ Quae de glandulae thyreoideae usu proferri possunt, tamdiu hypothesis speciem praeseferent, quamdiu vivi nexus mutui inter nervos et vasa intercedentis leges nobis latebunt. Quidnam verisimillimum sit, dum ipsa veritas haud attingenda, disquirendum est.

hypothesi pugnare videtur. Attamen perpendendum est, nos omnino naturae leges haud definire, neque dijudicare posse, quatenus organo necessaria sit et ratio et structura. In oculo, ut ad videndum aptus evadat, nervosum, vasculosumque systema ab invicem separavit. Simili modo in laryngis structura adornanda elaboravit natura. Neque omnino inter se repugnat ista laryngis cum oculo comparatio. Laryngem enim insigne organon esse instituit, cui nervos ex ipso cerebro egredientes dedit, qui solummodo sensuum instrumentis aut aliis organis impertiuntur, quibus maximam dignitatem, ut faciei, inesse voluit, vel quos eximiis necessariisque functionibus praeposuit. Cuivis animantium generi vox propria est, qua optime distinguuntur; sic magni fecit natura organon. Ad quod etiam accedit, ut larynx in homine subtiliori cuidam praesit officio, cum majorem loquela soni modulationem exigat. Hunc in finem majori etiam hominem, quam animalia bruta glandula thyreoidea natura instruxisse videtur, quodque *Schregerus* pro sua hypothesi attulit argumentum, miram aliquam inter hanc glandulam et cerebrum molis similitudinem esse, ut ubi minus cerebrum, ibi glandula quoque minor inveniat, et contra ¹³⁷⁾ valdopere, ut opinor, in nostrae hypothesis partibus militat, ut, ubi major expeditiorque inveniat, ibi etiam major appareat ista glandula. Anatomiae comparatae disquisitiones glandulae thyreoideae in homine officium maxime dilucidare, indeque nos multum sperare posse, persuasum mihi habeo. — Objiciat aliquis, laryngis ab oculo apparatus alienum, structuras, functiones rel. revera diversas. Attamen nihil impedit, quo minus simile hic naturae institutum cernamus, quo simili fere ratione nervis vasisque invicem agentibus organi

¹³⁷⁾ *Schreger* l. c. p. 25. — *Carus* l. m. p. 574.

functio procedat. Neque obstat sententiae, glandulam thyreoideam haud in ipsis laryngis nervis collocatam esse, ut chorioidea in retina, cum hic evidens quidam partium intercedat consensus. Unus idemque, et laryngi et glandulae thyreoideae nervus destinatur, quo forsam aliam evitavit natura structuram ob cartilaginorum laryngis apparatus minus idoneam. Idem vero et institutum, et ratio eadem est.

PARS ALTERA

de glandula thyreoidea in statu morboſo.

§. 26.

Auctores et delineatores.

Cum ad id uſque temporis nondum completus de omnibus glandulae thyreoideae morbis tractatus, ſed multo potius obſervationes illorum modo nonnullae apparuerint, plurimos hujus organi morbos brevi oratione comprehendere et ad artis quandam formam redigere conabor. In hoc elaborando clariffimorum virorum *Ludwigii*¹³⁸⁾, *Baillii*¹³⁹⁾, *Conradi*¹⁴⁰⁾, *Voigtelii*¹⁴¹⁾, et *Meckelii*¹⁴²⁾ opera anatomico-pathologica nec non

138) *Christian. Friedrich L.* primae lineae anatomiae pathologicae, Lipsiae 1785. Auch in ſeinen Anmerkungen zu *William Cruikſhank's* und *Paul Mascagni's* Geſchichte und Beſchreibung der Saugadern des menſchl. Körpers. Leipzig 1789 — 92. III Bde. 139) Cfr. *Matthaei B.* additamenta ad opus ſuum morbid Anatomy etc. London 1798. in vernac. verſa in Sammlung auſerleſener Abhandlungen zum Gebr. für prakt. Aerzte. Bd. XX. 35 et 45. Stück. Leipzig 1803. p. 354. 140) *Georg Chriſtoph C.* Handbuch der pathologiſchen Anatomie, Hannover 1796. p. 464 — 469. 141) *Fr. G. V.* Handbuch der pathologiſchen Anatomie mit Zuſätzen von *P. F. Meckel*, III Bd. Halle 1804 — 5. 1ſter Bd. p. 530 — 535. 142) *Joh. Fr. M.* Handbuch der pathologiſchen Anatomie. 3. Bd. Leipzig 1812 — 1818. 2ter Bd. 2te Abth. C. Drüſen i. Schilddrüse p. 522.

observationes *Portalii* ¹⁴³⁾, *Rushii* ¹⁴⁴⁾, *Meckelii* ¹⁴⁵⁾ et *Iphofenii* ¹⁴⁶⁾ ad usum vocare studui. Ceteroquin perillustrissimus *de Ploucquet* in litteratura medica digesta (Tubingae Tom. I—IV, 1808—1809. cum supplemento) omnes, qui de glandula thyreoidea morbose scripserunt, auctores adnotavit.

Optimas morborum glandulae thyreoideae delineationes ediderunt:

Ed. Sandifort in museo anatomico academiae Lugd.

Bat. Vol. I et II. L. B. 1793. Tab. CVI. fig. 5 et 6.

M. Baillie in a series of engravings etc. which are intended to illustrate the morbid Anatomy. Lond.

1799—1802. Fasc. II. fig. 1. et 3.

G. H. Thilow in Beschreibung anatomisch-pathologischer Gegenstände. Gotha 1804. I. Bds 1te Lieferung Tab. IV. fig. 5. a et b.

143) *Anton. P.* cours d'anatomie médicale etc. à Paris 1804. Cfr.

Sammlung auserl. Abhandl. Bd. XXIII. 1stes Stück, Leipzig 1806. p. 42. p. 86. 87. 144) *Benjamin R.* in medical and

physical Journal Vol. XVI. Sept. 1806. p. 193. et sequu. Cfr. Sammlung auserl. Abh. Bd. XXIII. 45. Stück p. 517 et seq.

145) *Joh. Fr. M.* Abhandlungen aus der menschl. und vergl. Anatomie und Physiologie. Halle 1806. 8. p. 142. et sequ. 146)

August Ernst J. der Cretinismus philosophisch und medizinisch untersucht, 2 Theile, Dresden 1817. 1ster Theil p. 10—17.

§. 15—25.

C A P U T I.

Vitia organica glandulae thyreoideae.

A. I n g e n e r e.

Ars medica tota in observationibus.

FRIED. HOFFMANN.

§. 27.

Glandula thyreoidea multis variisque afficitur morbis, quibus textura illius atque structura omnino deleri potest. Huc sequentes referri debent:

Laesiones mechanicae. Glandula thyreoidea vestimentis circa collum applicatis nimis arctis comprimi, ictibus vulneribusque externis ita laedi potest, ut ex iis haemorrhagia secuta summam debilitatem, quin inmo mortem conciliare queat. Sunt, qui glandulae thyreoideae strumosae laesionem observarunt; singulare est et mirandum, quod *Forestus* obs. 15. l. 8. in scholiis p. 245. refert, *patrem suum* observasse strumam ovi magnitudinem aequantem in collo militis cujusdam, quae ense in duello dissecta periculis viventibus interne repleta fuerit; notum porro exemplum est bronchoceles fortuitae curationis *Zod.* *Call.* Obs. 11.: „quidam enim patria *Municensis* XL. annos natus, cujus jam pridem deturpabat collum strumata insignis magnitudinis, assidens fabro ferrario soaeas ferreas equo affixuro, dum urget fabri ministrum, ut compendium temporis faciat, veru ferro acuto re-

centissime e fornace educto, et clavorum formatione destinato percutitur, ictus ille, quo bronchocele transadacta est, primo horrorem incussit, sed qui postmodum in ingens gaudium cessit, exiliente enim affatim humore multo in grumos concreto calculiformibus corpusculis, lentibus similibus, admixtis, uno paene momento subsedit tumor, qui ante ad pectoris regionem devolvebatur, unde subsecuta suppuratione curatio integra brevissime successit. Confer quoque *Dolae encyclopaediam chirurgicam rationalem* p. 627. *Frankofurti ad Moenum* 1689. Non ausim silentio praetermittere, quod *Mittermayerus, Kuffsteinio-Tyrolensis*, in dissertatione sua de strumis ac scrophulis Bünsingensium p. 16. attulit: „ipse“, inquit, „memini me in Tyrolensi pago *Kundel* audivisse, famulanti cuidam strumoso Bünsingensi ibidem apud praefectum postarum a peregrinante et cum illo jocante de abscissione strumae ingentis flaccidae, cum per errorem pro dorso aciem cultelli adverteret, strumam dissectam fuisse, ubi nil nisi flatus exiit ex cavitate notabili, qui simul animam misero proripuit; sic *Paullini* ¹⁴⁷⁾ dicit, ex struma casu perforata effluxisse cum copiosa materia purulenta vel C. vermiculos plerumque subrufos et pilosos, nec non multipedes: porro cl. *Iphofen* ¹⁴⁸⁾ et *Gautieri* Cretinum hominem monstrosum Ricettæ viderunt, qui ira atque odio in foedum tumorem, cujus sedes erat glandula thyreoidea nec non glandulae colli minores, concitatus cultello percussione illius fecit, eumque ita materia puriformi evacuata funditus delevit: sic denique *Schmidtmuellerus* ¹⁴⁹⁾ uno etiam ictu glandulam thyreoideam strumosam ad sanationem esse

¹⁴⁷⁾ Eph. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. append. p. 8. ¹⁴⁸⁾ l. c. erster Theil p. 12. ¹⁴⁹⁾ *Joh. Ant. S.* über die Ausführungsgänge der Schilddrüse. Ein Schreiben an *S. Th. Soemmering*. Landshüt 1804. 8. cum icone p. 38. 39.

eductam observavit. Nonne mecum exclamabis?
oc omnium chirurgicorum auxiliorum est facillimum tutissimumque!!

§. 28.

Inflammatiö. (Cynanche thyreoidea: aneurisma inflammatoria Waltheri¹⁵⁰⁾) Quam-

150) Ph. Fr. von Walther neue Heilart des Kropfes durch die Unterbindung der obern Schilddrüsen-Schlagadern nebst der Geschichte eines durch die Operation geheilten Aneurisma's der Carotis. Sulzbach 1817. p. 17 — 18 — 19. Der Verfasser beobachtete 3 Mal eine acut verlaufende Entz. der Schilddrüse. In einem von ihm beobachteten Krankheitsfalle lag eine catarrhalische Affection der Entstohung des Uebels zum Grunde; einmal entstand sie nach heftigem Drosseln; einmal bey einer syphilitischen Weibsperson nach Erkältung. Blutigel an die Seitentheile des Halses in grösserer Anzahl angelegt und Calomel zum innerlichen Gebrauche dargereicht, hat der Herr Verfasser besonders wirksam gefunden. In dringenden Fällen schlägt er die Eröffnung der äussern Drosselader vor. — Ich selbst auch hatte Gelegenheit, im clinischen chirurgisch-äugenärztlichen Institut der Universität zu Berlin unter Leitung des H. Geh. Rath's Graefe eine Entzündung dieser Art als Folge von einer catarrhalischen Affection beobachten zu können. Der Verlauf und die Cur verhielten sich, wie bey Walther. So erwähnt sie schon Baillie in den Zusätzen zu seinem trefflichen Werke morbid Anatomy etc. London 1798. Cfr. Sammlung auserlesener Abhandl. XX. Bd. 3. et 4tes Stück p. 355. p. 361 — 63. und ganz neuerdings auch Carron, der diese Entzündung 3 Mal bey Frauen beobachtet, die durch das Alter ihre Reinigung verloren hatten, und zum vierten Mal bey einem Geistlichen. Die Geschwulst nahm zu, ward schmerzhaft, hinderte durch Druck auf die Luftröhre das Athemholen, drohete sogar Erstickung. Die Methode war die bey allen Entzündungen gebräuchliche, und die Kranken wurden alle bald geheilt. vid. Journal général de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie rédigé par In. Sédillot etc. Tom. XLIX. Paris 1814. Heft vom Januar 1814. 8. S. Medicinisch-chirurgische Zeitung, fortgesetzt von Joh. Nep. Ehrhardt 1ster Bd. 1815. Salzburg. N. 13. p. 209 — 10. So endlich G. J. Guthrie, über Schusswunden in den Extremitäten etc. A. d. Engl., und mit Anmerk. von G. Spangenberg, mit 4 Kupfert., Berlin 1821. pag. 91 — 92.

quam glandula thyreoidea magna vasorum copia instructa sit, qua status inflammatorius facile effici possit, rarius tamen accidit, ut per se inflammetur. Quasi autem alia excitatur causa, sequentibus manifestatur signis: glandula ipsa partesque adjacentes magis intumescunt, et calescunt, aeger primo dolorem surdum in profundo partis affectae, pulsationemque arteriarum sentit, quae de die ad diem magis crescunt acriusque pungunt, pressionem digitorumque tactum vix perferre potest, sitis, inquietudo adaugetur, deglutitio molesta fit, omnes aegroti difficillime respirant, spiritumque trahunt, quod ex compressione tracheae a glandula lata et inflata effici liquido constat, sic enim liberior aëris transitus per arteriam asperam satis impeditur, ut non sine molestia quadam aërem inspirare ac remittere queant: hinc enim loquela illorum admodum mutulata et corrupta fit, dum magno conatu et miris gestationibus verba male articulata proferunt. Accedit stertor narium, raucedo et asperitas gulae, unde voce obtusa et rauca nec unquam clara gaudent et denique sopores, vertigines et dispositio ad apoplexiam ex compressione vasorum sanguiferorum oriuntur, quae reditum sanguinis a capite impedit, ideoque congestionibus sanguinis versus caput vehementissimis ansam praebet.

§. 29.

Neglecto morbi decursu, omissisque remediis aptis tempestivisque sequitur *suppuratio*. Peracta inflammationis periodo dolores acerbi subito remittunt, neque tamen ut in resolutione ejusdem omnino cedunt, sed ictus remanent pulsatorii, pulsus mollior fit et debilior, horripilatio nonnunquam irregularis incurrit. Glandula thyreoidea suppurante facillime nascuntur, abscessus, uti vomica in substantia illius clausa, qui vel sub integumentis communibus apparent, vel per laryn-

em vel tracheam (*Joh. Bapt. Monteggia* in fasc. athol. Mediol. 1789.) viam sibi parant, quo fieri potest, ut puris efflexu aeger morti succumbat suffocatio-
 ia, cujus exemplum in musaeo anatomico *Hunteri* condini videri potest. (Cfr. *Baillie* add. l. c. p. 362. et
 jusdem engravins Fasc. II. fig. 3.) Observationes de
 truma vi suppurationis vel sponte natae ¹⁵¹⁾ vel tumo-
 ris irritatione accidentali prolatae ¹⁵²⁾ disrupta et feli-
 citer curata communicant *Willius* et *Mauchart*, *Ver-*
duc et *Assalini*. Ex his nonnunquam ulcera substan-
 tiam glandulae thyreoideae magis minusve corrodentia
 formantur; sicuti *Henning* in *Hufelandi Journal der*
prakt. Arzneikunde Bd. VIII. St. 4. p. 52. c. fig. obser-
 vavit. Nonnunquam etiam ulcera illa sinus fistulas-
 que omni curationi repugnantes sequelas habent, ex
 quibus concrementa calcarea cum pure proveniunt,
 quod vidit *J. B. de Siebold* ¹⁵³⁾; nec observationes de-
 sciunt, aegrotos ingenti suppuratione vita privatos
 esse. ¹⁵⁴⁾

§. 30.

Nascitur quoque ex inflammatione, vel ex aggre-
 gatione materiae peregrinae, tum tenuioris, tum fir-
 mioris, *induratio* glandulae thyreoideae (*struma*
lymphatica Waltheri ¹⁵⁵⁾), quae nonnunquam
 in scirrhum mutatur; (*struma scirrhusa Wal-*

151) *Willius* in Nov. Act. Nat. Cur. Tom. III. p. 412. — *Mau-*
chart Eph. Nat. Cur. 1712. Cent. 1. Obs. 17. 152) *Verduc*
 path. de Chir. p. 145. — *Assalini* Versuch über d. Krankhei-
 ten des lymph. Systems, a. d. Franz. Dresd. 1792. p. 58. —
 Dictionaire raisonné etc. Tom. VII. p. 730. 153) In Cl. *Lo-*
deri Journal für die Chirurgie. III. Bd. 25. St. p. 390. 154)
F. Hildani Observ. et epist. chirurg. med. Argent. 1717. P. II.
 p. 397. — *Roncalli* l. c. n. 229. 155) l. c. p. 12 — 14.

theri) ¹⁵⁶). Illic producantur *Gilibert* ¹⁵⁷), *Cham-
bon de Montaux* ¹⁵⁸) et *Baillie* ¹⁵⁹). Differentias tame-
strumae a scirrho glandulae thyreoideae hoc in loc-
nihil moror, cum instituti non sint nostri; videas plu-
ra inferius in §. 45. nr. 4. ubi hoc nobis ulterius exa-
minandum reservamus.

§. 31.

Summus inflammationis gradus in *gangrae-
nam aut sphacelum* abire potest, ita quidem
ut glandula thyreoidea putrescens ad magnitudinem
juglandis minuatur, quod observabat *A. Zipp.* ¹⁶⁰

-
- ¹⁵⁶) l. c. p. 397. Repetantur verba ipsa: „So wenig der eigent-
liche lymphatische Kropf in einem wahren Scirrhus der Schild-
drüse besteht, unterliegt es dennoch keinem Zweifel, daß dies
Drüse allerdings der scirrhösen Entartung gleichfalls unterwor-
fen sey, und ein wahrhaft scirrhöser Kropf, obgleich sehr sel-
ten, vorkomme. Ich habe ihn selbst mehrere Male, aber im-
mer bey alten Leuten beobachtet. Die Schilddrüse ist dabey
nicht sehr vergrößert, allein ungewöhnlich hart, knotig und
höckerigt. Alles benachbarte Zellgewebe ist geschwunden; die
scirrhöse Masse verwächst sehr bald mit der Lufröhre und mit
den Muskeln des Halses; sie verwandelt sich in ein Carcinum
und in ein wahres Krebsgeschwür. In diesem Zustande des of-
fenen Krebses habe ich sie selbst gesehn. So wie bey dem ge-
wöhnlichen Kropfe die Scropheln am Halse seltene Erscheinun-
gen sind, so schwellen dagegen bey dem Scirrhus der Schild-
drüse, besonders wenn er einmal cancrös geworden ist, die
lymphatischen Drüsen des Halses an, und bilden eben so viele
secundaire Scirrhen.“ — ¹⁵⁷) *J. E. Gt. Adversaria medico-
practica s. annotationes clinicae*, Lyon. 1791., in das Deutsche
übersetzt von *E. B. G. Hebenstreit*. Leipzig 1792. S. 24.
¹⁵⁸) *Nicol. Ch. de M. Observationes clinicae, curationes mor-
borum periculosorum et rariorum aut phaenomena ipsorum in
cadaveribus indagata referentes*. Paris 1789. 4. deutsch: Merk-
würdige Krankengeschichten und Leichenöffnungen. Mit eini-
gen Anmerkungen. Leipzig 1791. 8. S. 317. ¹⁵⁹) add. l. l.
p. 357. ¹⁶⁰) In *B. de Siebold* Sammlung selt. und auserles.

Denique ex resorbtione materiae in strumis contentae lamina quandoque oriri *Desault* ¹⁶¹⁾ putat, et *Bertrandi* dicit, saepe materiam putridam in struma contentam esse, qua gangraena producat. ¹⁶²⁾

§. 52.

Glandula thyreoidea magis minusve interdum *intumescit*, ita quidem, ut per carotides et venas jugulares sese expandat, et ad laryngem, quin imo ad thoracem descendat, nec raro sub sterno aut claviculis iam in cavum thoracis inveniat ¹⁶³⁾, quam quidem strumam internam vocant. Quae intumescencia si glandulam thyreoideam solam aggreditur, struma audit, e qua plura infra dicendi locus erit. Vitium huic contrarium est, si glandula thyreoidea et sine progressu suppuratione tali modo minuitur et corrugatur et consumitur, ut nihil huic simile amplius possit conspici ¹⁶⁴⁾.

Jam vero exitus datur ad digressionem. Fuerunt, *Hallero* auctore, qui orgasmum statuerent, quo virginis nuper vitatae totum corpus turgeret. ¹⁶⁵⁾ Sed

chirurg. Beobacht. und Erfahrungen, Bd. II. Rudolstadt 1807. p. 729. 161) *Traité des maladies chirurgicales et des opérations*, qui leurs conviennent, par M. M. *Chopart* et *Desault*, Paris 1779. Tom. I. p. 249. 162) *Bertrandi* Abhandlungen von den Geschwülsten, aus d. Ital. Leipzig 1788. p. 390. 163) *Girard* loupologie, ou traité des tumeurs connues sous le nom des loupes. à Londres 1775. p. 417. — *Monteggia* fasciculi pathologici Mediol. 1789. p. 75. 164) Talem observationem communicat *Renaultin* in Journal gén. de Méd. Pluviose an. XI. (Cfr. *Hufeland's*, *Schreger's* und *Harles* Journal der ausl. med. Lit. 1803. Maerz p. 233.) cui auctori glandula thyreoidea influxu aëris expirati ita consumta esse videtur; ut inde connexum ejusdem glandulae cum larynge explicare conatur. Cfr. etiam *Bell's* System der Wundarzneyk. Bd. III. et *Richter's* Anfangsgründe der Wundarzneykunst, 4ter Bd. p. 289. 165) *Haller* instit. physiol. Bernae 1765. 4. Vol. VIII. lib. XXIX. §. 12. p. 24.

longe plures tamen ex veteribus collum tantum recentium gravidatarum intumescere existimaverunt ¹⁶⁶⁾. Huic familiaris erat veteribus colli commensuratio, ex qua inquit *Mercurialis* ¹⁶⁷⁾, postridie nuptiarum puellam integram vel corruptam cognoscebant, quem morem etiam *Catullus* ¹⁶⁸⁾ in epithalamio expressit:

Non illam genitrix orienti luce revisens
Hesterno poterit collum circumdare hilo.

Neque defuerunt inter recentiores, qui experimentum illud certo cum eventu repetitum esse adfirmarent ¹⁶⁹⁾ quod et hodie hic illic inter homines praecipue agreste usu adhuc obtinere satis constat. Si quid veri inesse huic colli post coitum tumori, ad glandulae thyreoideae tumorem hoc redire putaverim, id quod hujus § inscriptione statim significatum ivimus. Sunt vere omnino in promptu nonnulla, quae pro ornanda et aliquo modo fulcienda hac sententia in medium proferri possint, si quidem utero puellarum ad pubertatis annos accedentium sese efformante saepius glandula thyreoidea ita turget, ut in strumam abeat, de qua re *Parentem meum* egregie et subtilissime disserentem audivi. Jam vero cum non solum procedente graviditate sed vel ipsa conceptione uteri ulterior efformatio maturetur, nec miros nos habere videtur glandulae ejusdem post virum admissum maturata et repentina intumescencia. — Praeterea neque hoc praeunte *Riolo* ¹⁷⁰⁾ in dijudicanda hac re praetermittendum esse existimaverim, vocem gravidarum ex canora in languentem, ex clara in rauciores verti, ad quod jam *Martialis* adlusit. ¹⁷¹⁾ Quo indicio etiam forsitan usus

¹⁶⁶⁾ Jo. Riolanus anthropographia Paris 1626. p. 302. ¹⁶⁷⁾ In libro variar. lectt. ¹⁶⁸⁾ De Aty, LXIII. v. 76 — 77. ¹⁶⁹⁾ Musitanus apud Palsynum de la femme p. 46. ¹⁷⁰⁾ l. c. p. 302. ¹⁷¹⁾ Epigr. I. 95.

est *Democritus*, qui teste *Laërtio* ¹⁷²⁾ *Hippocratis* puellam prima die ut virginem, secunda ut feminam salutavit. Referunt quoque, *Albertum Magnum*, ex museo puellam ab oenopolio vinum pro hero adferentem vitiatam fuisse in itinere, deprehendisse, quod in reditu subinde cantillans mutatam haberet vocem ex acuta in gravem. ¹⁷³⁾ Nonne ex hac vocis mutatione et glandulae istius mutationem factam esse eo magis conijcere licet, cum et vox struma laborantium clara olim, nunc rauca evadat? Quidquid vero sit, neminem equidem huic observationi circa recens vitiatarum collum inflatum institutae plenam fidem jam nunc tribuere posse arbitrer, qui meminerit, quam fallax et ambiguum sit hesterni fili collo virginis circumdati postridie nuptiarum angustioris experimentum, in quo tamen solo hucusque innititur. Nam quam multum in ejusmodi re in sensus vix incurrente diligenter investiganda inde pendeat, ex quamam materia, constrictione seu relaxatione magis minusve obnoxia filum illud, ungulae divinae instar, a matre aviae dignitatem exoptante adhiberi solitum, deductum sit? an in colli ambitu emetiendo adtrahatur, aut laxetur? an accurate in eadem, qua heri, et hodie regione collo circumdetur? etc. vix est, quod moneamus. — Quae cum ita sint, *Ill. Osiandro* ¹⁷⁴⁾ adstipulor, qui istum colli tumorem inter conceptionis fallacia refert indicia. Neque tamen oleum et operam perdidisse putaverim, qui curam solertiozem in hac re, experimentis magis fallere nesciis, et virgine, quid agatur, nescia salvaque ejus verecundia, exploranda collocaverint, cum vel

Ad Aegen fellatricem.

Cantasti male, dum fututa es, Aegle,

Jam cantas bene; basianda non es.

¹⁷²⁾ lib. IX. 42. ¹⁷³⁾ *Riolanus* l. l. pag. eadem. ¹⁷⁴⁾ *Grundriss der Einbindungskunst*. Götting. 1802. Vol. 1. p. 147.

ipsum, quod tale quid, absque praevia suspitione observatum sit, subsequentem moveat suspitionem, aliquid saltem veri, quantulumcunque sit, rei inesse.

§. 33.

Tumores ¹⁷⁵⁾ diversissimae naturae e. g. *saccati* in glandula thyreoidea, praesertim strumosa formantur, et inter suos limites veluti circumscribuntur, in quibus materies variae formae et consistentiae plerumque adest.

§. 34.

Aggregatio *materiei peregrinae* mox *tenuioris* v. c. aëriiformis ¹⁷⁶⁾, serosae ¹⁷⁷⁾, mucosae ¹⁷⁸⁾, glutinosae ¹⁷⁹⁾, caseosae ¹⁸⁰⁾, pultaceae et purulentae ¹⁸¹⁾, sanguinolentae ¹⁸²⁾, mox *spissioris* v. c. adiposae ¹⁸³⁾, carnosae ¹⁸⁴⁾, et in massam fungo-

-
- 175) Morgagni Epist. XXIII. Articul. 4. Epist. L. art. 32. — Stoll Heilungsmethode B. III. Th. II. S. 171. Vergl. Th. I. S. 198. — Joh. Fr. Meckel Handbuch der pathol. Anatomie 2ter Bd. Leipzig 1818. 2te Abth. C. Drüsen. i. Schilddrüse p. 322. 176) L'Alouette traité des scrophules communément nommées écruelles. à Paris 1780. 177) Monteggia l. c. 178) Stoll. rat. med. Tom. III. p. 599. — de Haen Heilungsmethode B. III. Th. VII. cap. III. §. 300. 179) Stoll. rat. med. P. I. p. 203. 180) Heister diss. observ. med. misc. Helmstadii 1730. — Chambon de Montaux observ. clin. Paris 1789. S. 317. — Tyrolensium, Carynthiorum, Styriorumque struma a Josepho Gautieri observata et descripta. Vindobonae 1794. pag. 24. 108. etc. 181) Bertrandi Abh. von den Geschwülsten, a. d. Ital. Leipz. 1788. p. 589. — Bonneti Sepulchret. T. III. p. 262. 182) Alix observ. chir. Fasc. I. 1774. — de Haen l. c. — Portal in Sammlung auserl. Abhdl. 25ster Bd. 1stes Stück. Leipzig 1806. p. 86. — Foderé l. l. §. 8. etc. v. Vest et Parens noster in Iphofen l. m. Th. 1. p. 11. 12. 15. §. 17. 19. 21. 183) Girard loupologie, ou traité des tumeurs connues sous le nom des loupes. à Londres 1775. p. 405. — Portal cod. loc. — de Haen l. c. — Chambon de Montaux l. c. S. 51. — v. Vest in Iphofen l. l. p. 12. §. 19. 184) Morgagni Epist.

sam ¹⁸⁵) degeneratae, imo paullo *firmioris* v. c. cartilaginosae ¹⁸⁶), osseae ¹⁸⁷), lapideae ¹⁸⁸), calcarae ¹⁸⁹), tophiaceae ¹⁹⁰) et sabulosae ¹⁹¹), *cochlear* quoque in strumis, *cornua*, *foenum*, *pili* ¹⁹²), *insecta* ¹⁹³) et *vermiculi* ¹⁹⁴), *embryo* ¹⁹⁵)??, *hydatides* ¹⁹⁶) et *ovula verminosa*, quorum praesentia autem non ad statum hujus glandulae sanum affirmante *Jacobo Ver-*

L. art. 31. — *Foderé* l. c. §. 8. etc. — *Gautieri* l. m. — *Parens noster* in *Iphofen* l. c. p. 13. §. 21. 185) *Halleri* opusc. path. Obs. 8. — *Burns* surgical anat. of the head and neck. p. 282. ff. — *Fr. Meckel* Handbuch der pathol. Anat. 2ter Bd. Leipzig 1818. 2te Abth. C. Drüsen. i. Schilddrüse: p. 322. 186) *Panarolus* Jatrologism I. Pentec. 1. cartilaginem firmam in struma invenit. — *Haller* l. c. Obs. 8. — *Stoll* Heilungsmethode. B. III. Th. II. S. 171. Vergl. Th. I. S. 198. — *Portal* l. c. p. 86. — *Joh. Fr. Meckel* loc. et pag. cit. 187) *H. A. Nicolai* Dec. obs. illust. anat. Argentor. 1724. Obs. IV. — *Bartholinus* hist. anatom. Cent. VI. n. 64. — *v. Haller*. Disp. anat. select. Vol. VI. — *Maraltus* in Eph. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. p. 270. — *Monteggia* l. c. p. 77. — *Sellie* in *Schmucker's* vermischten Schriften II. Bd. p. 204. — *Baillie* l. c. p. 358. — *Joh. Fr. Meckel* loc. et pag. cit. — *v. Vest* in *Iphofen* l. l. p. 11. §. 17. p. 12. §. 19. Tab. I. A. B. et *Parens noster* eod. loco p. 13. §. 21. 188) *Sandifort* Mus. anat. Vol. I. Sect. III. p. 104. n. C. Sec. V. n. LXXXII. LXXXIII. Tab. CVI. Fig. 6. — *J. G. Walter* observ. anat. p. 43. et in anatom. mus. Bd. I. S. 139. n. 277. 189) *Alix et de Siebold* l. c. 190) *I. B. Verduc* pathologie de Chirurgie p. 145. — *Willius* in Nov. Act. Nat. Cur. Tom. III. p. 412. 191) *A. Hallefi* Elem. Physiol. 4. Tom. III. p. 400. 192) *Lamboin et Morvaux* in Journal de médecine T. LXI. p. 497. — *Andr. Laurentius* de mirab. strumas sanandi vi etc. Paris 1609. 8. — *Haller* bibl. med. P. II. p. 276. 193) Eph. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. obs. 13. Ann. V. app. p. 8. 194) *Paullini* Eph. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. append. p. 8. 195) *ibid.* Ann. X. obs. 56. Sic *P. de Sorbait* bufonem viventem in struma se invenisse narrat. 196) *Morgagni* de sed. et caus. morb. Ep. 50. Art. 32. — *Haller* l. c.

cellonio ¹⁹⁷⁾ medico Pedemontano pertinet, inveniuntur.

§. 35.

Glandula thyreoidea degeneratur nonnunquam omnino in *massam molliorem* v. c. in meliceridem ¹⁹⁸⁾ vel *firmiorem* v. c. in cartilagineam ¹⁹⁹⁾, osseam ²⁰⁰⁾, quin imo lapideam. ²⁰¹⁾

§. 36.

Tela cellulosa glandulae thyreoideae adiacens variorum tumorum, qui *bronchocele* vocantur, sedes est, de quibus in §. 47. nr. 6. plura tractabo.

§. 37.

Musculi glandulam thyreoideam circumdantes majori hujus expansione situm facile movent, valde extenduntur, et structuram musculosam commutant in membranaceam, quin imo rumpuntur. *Gavard* ²⁰²⁾,

197) In dissertatione anatomico - medica de glandulis oesophagi conglomeratis etc. Astae 1711. 4., in qua aliis persuadere adlaborat, ex glandula thyreoidea colli maxima congeriem ovorum verminosorum ad oesophagum et ventriculum transmitti, quae chylo characterem vitalem concilient. Quam opinionem opugnavit in diss. med. de glandula thyre. in statu naturali ab ovulis verminosis libera contra *Jacobum Vercellonium* Pr. J. Hager. Rp. J. G. Richter. Vitemb. 1721. 4. 198) Joh. Henr. Freytag epistola gratulatoria de glandulae thyreoideae partim osseam, partim meliceridis speciem referentis, exstirpatione. Lipsiae 1778. Cfr. Fr. A. Weiz neue Auszüge aus Diss. für Wundärzte, Bd. IX. p. 66. — Stoll ratio medendi T. III. p. 399. 199) Giraud in *Desault's* chirurgischem Nachlaß, herausg. von *Wartenburg*, Götting. 1800. II. Bd. 4. Th. p. 8. Nucleus strumae exstirpatae erat cartilagineus. 200) Freytag l. c. — Baillie l. l. p. 350. et Jo. Fr. Meckel l. m. p. 150. 201) F. A. Weiz glandulam thyreoideam omnino petrifactam in theatro anat. Havniensi vidit. Cfr. ejusdem vollständige Auszüge aus den besten chir. Disput. B. II. p. 210. 202) *Traité de myologie suivant la methode de Desault* p. 12.

Graefe ²⁰¹⁾ et *Parens noster* ²⁰¹⁾ musculū colli latissimum, musculos sternohyoideos et sternothyroideos struma premente omnino deletos viderunt.

§. 38.

Vasa glandulae thyreoideae iisdem, quibus vasa generatim, morbis afficiuntur.

a) *Vasa sanguifera* in morbo, qui struma vocatur, incredibili modo extenduntur, et aneurismatis signum habitu prae se ferunt (*struma aneurismatica Waltheri* l. c. p. 10. 11. 12.) huncque statum ibi adfuisse credo, ubi autores de bronchocele ex vasorum nodatione ac dilatatione orta loquuntur ²⁰⁴⁾. Non desunt exempla. *Foderé*, *Gautieri* et *Portal*, *Graefe* et *Parens noster* ²⁰⁵⁾ illa ad amplitudinem pennae expansa videre. Rumpuntur interdum ²⁰⁶⁾, quo fit, ut sanguis in substantiam telamque adjacentem cellulosa effundatur glandulae thyreoideae. *Alix* ²⁰⁷⁾ quinque sanguinis extravasati libras materiasque calcareas in struma offendit.

α) *Arteriae* thyreoideae aneurismatis exem-

203) *Gr.* et *Par. n.* quater in strumarum exstirpatione musculos illos observarunt membranaceos, vid. plura inferius, ubi de exstirp. copiose disputatur. 204) *Paulus Aegineta* de re med. lib. VI. cap. XXXVIII. E. F. p. 565. ex edit. *Henr. Stephani*. — *Aëtius* Tetr. IV. sermo III. cap. VI. p. 743. ex ead. ed. Tetr. IV. sermo I. p. 669. — *Albucasis* de chirurgia, cura *J. Channing*. Oxon. 1778. Lib. II. Sect. 44. p. 229. — *J. Vigierus* opera med. chirurg. Hag. Comit. 1659. Lib. I. p. 94. — *G. Fallopius* tract. de tumor. praeter natur., in op. omn. Frft. 1584. fol. Part. II. p. 220. 205) *Foderé* l. et pag. cit. — *Gautieri* l. et p. cit. — *Portal* cours d'Anatomie médicale Tom. III. p. 160. — *Gr.* et *Par. n.* vid. infra ubi de exstirp. nobis uberior sermo erit. — *Hopfsengartner* l. c. p. 29. 206) *Douglas* philosophical transactions nro. 305. 207) *Observ. chir.* Fasc. I. Altenburgi 1774. 8. p. 31.

pla non desunt. *Alix* l. c. 54. ramum arteriae thyre. superioris ad internam strumae superficiem disruptum adnotavit.

β) *Venae* thyreoideae nimis extensae varicosae fiunt.

b) *Vasa* glandulae thyreoideae *lymphatica* cum suis glandulis in consensum trahuntur, scrophulis cum struma conjunctis. *Gilibert* ²⁰⁸) exploratione strumarum anatomica glandulas scirrhus affectas in medio substantiae illarum invenit.

§. 39.

Nervi partim ex linguali medio ad musculos glandulae thyreoideae adjacentes, partim ex parte cervicali nervi sympathici ad arterias illius properantes variis, et quidem vel pressione, nimia vasorum nervos sic dictos molles circumdantium sanguinis repletionem, et expansionem, vel sympathia et consensu ²⁰⁹) cum alia parte propter anastomosin multiplicem ramorum nervorum implicantur morbis. Sic nervorum compressio tam generales quam speciales producit effectus: generales sunt nervorum torpor, mentis hebetudo, omniaque ea symptomata, quae ex laesione functionum nervi vagi oriri possunt ²¹⁰); speciales sunt auditus difficultas ²¹¹), vel vocis mutatio ²¹²) vel aboli-

208) In advers. medico-practicis etc. Lyon 1791. p. 24. 209)

Pressio strumae in N. vagum indigestionis causa fuit; vid. *S. Th. Soëmmering*, Hirn- und Nervenlehre, Frankfurt am Main 1791. p. 253. 210) *Monteggia* l. c. p. 87. — *Watkin's* travels through Swisserland. in The univers. Magazine, Febr. 1793.

p. 86. — *Foderé* l. c. p. 29. 211) *Verduc* pathologie de Chirurgie. Paris 1710. Tom. II. p. 308. 212) Vocis mutatio in

struma variis dependere videtur caussis, partim nempe ex laryngis, partim ex nervorum loquellae inservientium compressione, partim ex musculorum laryngis et ossis hyoidei affectione. *Foderé* autem eam ex imminuto ac impedito humoris, in glan-

tio totalis ²¹¹); haec a compressione nervi laryngei superioris et recurrentis, illa fortasse ex vicina nervi vagi cum acustico conjunctione explicari potest.

dula thyreoidea parati, in laryngem influxu derivat. Cfr. *Bertrandi* Abhandl. von den Geschwülsten, a. d. Ital. Leipz. 1788. p. 590. — *Foderé* l. c. 213) *Tarin* cadaver paralytici cujusdam dissecuit, qui mensibus nonnullis ante obitum suum vocem perdiderat, et truncum N. vagi paullo eum supra locum, ubi recurrentem demittit, pressum invenit tumore cystico, gelatina spissa repleto, nucis magnitudine aequali. Sic intumescenciae glandularum axillarium haud raro paralyticum brachium reddunt, si plexus vel nervi brachiales iis nimis premuntur.

B. D e s t r u m a.

Inter illos auctores, quos *Perill. de Plouquet* in literatura medica digesta Tom. IV. p. 85 et 437. commemorat, *Barton* ²¹⁴) *Foderé* ²¹⁵), *Gautieri* ²¹⁶) et *Wichmann* ²¹⁷) prae ceteris notandi sunt, atque inter Neotericos, qui rem totam accuratius exposuerunt, *Hausleutnerum* ²¹⁸), *Iphofenium* ²¹⁹), *Ph. Waltherum* et

- 214) *Benj. Smith* B. A memoir concerning the disease of goitre etc. Philadelphia 1800. a. d. Engl. übers. von *Wilh. Liebsch*. Göttingen 1802. 8. mit der Ueberschrift: Abhandlung über den Kropf, so wie er sich in verschiedenen Theilen von Nordamerika häufig findet. Siehe auch *Hufeland's* Bibliothek der pr. Heilkunde Bd. XVIII. p. 272 — 285.; ferner Götting. Anzeiger 1801. und *Alber's* americanische Annalen. 215) *Fran. Eman. F.* essai sur le Goitre et le Crétinage. à Turin 1792. a. d. Französischen übers. von *H. W. Lindemann*. Berlin 1796. 8. Siehe auch *Aug. Gottl. Richter's* chirurgische Bibliothek 15ter Bd. 1stes Stück. Göttingen 1796. p. 15 — 27. Neuerdings auch *Voyage aux Alpes maritimes* etc. par *F. E. Foderé*, Paris 1821. Tome II. Chap. 2. Art. I. pag. 232 — 236. 216) *Joseph. G. Tyrolensium, Carynthiorum, Styriorumque struma observata et descripta*. Vindobonae 1794. 8. Siehe auch *Richter's* chirurgische Bibliothek. 15ter Bd. 1stes Stück p. 28 — 32. 217) *Joh. Ernst W.* Ideen zur Diagnostik Bd. I. Hannover 1794. 8. p. 99. et sequu. Siehe auch *Richter's* chir. Bibl. eod. volum. pag. 49 — 54. 218) *Hausleutner* über die Erkenntniss, Natur und Heilung des Kropfes, in *Ernst Horn's* Archiv für praktische Medicin und Klinik 10ter Bd. 1stes Heft S. 1. Jahrg. 1810. Siehe auch medicinisch-chirurgische Zeitung, fortgesetzt von *Joh. Nepom. Ehrhardt*, 2ter Bd. 1811. Salzburg N. 32. p. 120-122.; ferner allgemeine medicinische Annalen des neunzehnten Jahrhunderts auf das Jahr 1810. Altenburg p. 838 — 844. 219) *August Ernst Iphofen* der Cretinismus philosophisch und medicinisch untersucht, 2 Theile mit 7 Kupfertafeln, Dresden 1817.

*Muehlibachium*²²⁰), non ausim silentio praetermittere. complures praeterea in medium possent adduci, sed eorum historiam universam non damus; paucula igitur nec exempla ex magno et pleno acervo deprompsisse sufficiat.

§. 40.

Antequam vero ipsam hujus argumenti disquisitionem pertractationemque adgrediamur, primo omnium operae erit pretium, de verbis, quibus usuri sumus, distinctas et completas exhibere notiones.

1) Onomatologia et Homonymia.

a) Onomatologia.

Vocabulum *strumae* pure latinum est, et a *ruma* dictum existimatur, quasi nempe sit struens rumam, id est propendentem v. g. de collo mammam. Rumam enim veteres vocabant mammam; sic exemplo hic intervenire potest *Varro* in *Caton.* vel de liberis educandis lib. 2. *Nonium* 2n. 756. „hisce manibus lacte fit, non vino, Cuninae scil. Deae propter cunas, Ruminae scil. Deae propter rumam, id est prisco vocabulo, mammam;“ porro *rumen* pro mamma dictum reperitur, (*μαστός*); exemplo tibi sit *Plinius* 15, 18. 5. 20. de medicinis Ruminali: „magisque ob memoriam ejus, quae

220) *Ph. Ir. v. W.* neue Heilart des Kropfes durch die Unterbindung der obern Schilddrüsensclagadern nebst der Geschichte eines durch die Operation geheilten Aneurisma's der Carotis, Sulzbach 1817. Siehe auch *Salzburger* medicinisch-chirurgische Zeitung, 4ter Bd. 1817. N. 91. p. 198—206. — *N. T. Muehlibach*, der Kropf nach seiner Ursache, Verhütung und Heilung. Aus den natürlichen Verhältnissen des Schilddrüsenorgans dargestellt. 8. Wien 1821. Opusculum istud in usum meum perlustrare non potui, cum nondum sit evulgatum doctisque igitur plane adhuc ignotum; quod ut edat maturius, otium auctori exoptare, qui rerum medicarum scientiam appetunt, omnes debent.

nutrix fuit *Romuli* et *Remi* conditoris appellata: quoniam sub ea inventa est lupa infantibus praebens rume (ita vocabant mammam) miraculo ex aere juxta dicatam tanquam in comitium sponte transiisset;“ denique *rumis* (ῥήλη) idem quoque, quod *ruma*, id est mamma sed proprie animalium; confirmare hoc possum e *Varrone* de R. R. 2, 11, 5. „Mammae enim rumis, si ve *rumae*, ut ante dicebam, a rumi, et inde dicuntur subrumi agni lactentes, a lacte.“ Respicit ad 2, 120. Uterque locus varietate lectionis laborat. Hinc legendum arbitror apud *Juvenalem* 11, 106.

— — geminos sub rume Quirinos

pro rupe, quod vix convenit; conf. *Tertull.* de resurrectione carn. c. 4. Addit *Isidorus* 12, 1. „*Ruma* mamma est, ut *rumen* et *rumis*. Fluctuat enim vox non tam scriptoribus usitata, quam jactata inter parvos et nutrices.“ Hinc *rumare* pro lactare dictum reperitur, quas mammas in rumen immittere: hinc *Ruminus* inter *Jovis* cognomina est, *Augustin.* de G. Dei 7, 11. pr. „Dixerunt eum Victorem, Almus, Ruminum et alia;“ quia cum almo jungit, forte intelligi voluit, qui velut lactaret quasi rumine praebito omnia; porro *Rumina*, quae rumis, id est mammis, hoc est, pueri lactentibus praesidebat, eadem Dea, quae *Rumina*, de qua superius nobis sermo erat; hujus memin. *Augustin.* de Civit. D. 4, 11. et 6, 10. *Varro* de R. R. 2, 11, 5. „Non negarim, ideo apud Divae *Ruminae* sacellum a pastoribus satam ficum. Ibi enim solent sacrificare lacte pro vino, et pro lactentibus.“ Sic placet referre *ficum ruminalem*, (Ῥωμινάλιος ἐκινεὸς) sub qua Lupa Romulo et Remo dicitur mammam praebuisse ut ait *Festus*: quae et *Romula* vocitata est. vid. *Servium* ad Aen. 8, 90. et *Salmas.* ad Solin. p. 300. *Ovid.* Fast. 2, 411.

Arbor erat, remanent vestigia, quaeque vocatur
Romula nunc ficus, Rumina ficus erat.

uminalis arbor deminuta et revirescens *Tacit.*
nal. 15, 58. 1. cfr. *Livium* 1, 4. *Plinium* 15, 18. 1. c.
 ne quoque *subrumi* agni dicuntur, quia adhuc
 mamma habentur, *Varro* de R. R. 2, 1. „Etsi pa-
 mam habet lactis mater, ut subjiciat sub alterius mam-
 mam, qui appellantur subrumi, id est, sub mamma:
 antiquo enim vocabulo mamma rumis, ut opinor.“
 Add. 11. Porro *subrumari* dicuntur hoedi, quum
 mammam admoventur, quia ea rumis vocatur, vel
 rumine trahunt lac sugentes. *Festus*. *Colum.* 7,
 „Diligenti cura servandum est, ut et suis quotidie
 matribus et alienis non amantibus agni subrumentur.“
 Item 12, 37. „Nec minus interesse pastoribus fructum
 matribus, aut foetus ovium aliarumque pecudum
 subrumantibus.“ Cfr. *Eundem* 12, 3, 9. Hinc denique
 fluctum videtur illud foedae significationis verbum
irrumare. Irrumat, quae mammam praebet. vid.
irrumus. Sed vulgo obscoenitatis extremae est, *Mar-*
cell. 2, 7.

„Quae faciat, duo sunt: irrumat et futuit.

Eundem 2, 47 et 83. Item 4, 50. *Catull.* 15, 1. et
 5. *Irrumatus* *Martial.* 2, 70. „Undis ne fovea-
 irrumatis“ i. e. aquis contaminatis ablutione mentu-
 rum. Add. *Catull.* 21, 15. *Irrumator*, *Julius Fir-*
minus 8, 20. *Catull.* 10, 12. *Irrumatio*, *Catull.* 19,
 „Tangam te prius irrumatione.“ — Sed quorsum
 tam longus de definitione nominis excursus? nimi-
 ut vocem ejusque originem rite intelligamus, cum
 ad cognitionem rei haud parum conferat. —

Jam vero sequitur, ut loca nonnulla, in quibus
 vocabulum strumae occurrit, ex *veteribus* addu-
 mus; nam a multis hoc videmus praetermissum. Sic
Isid. 5, 28, 7. idem 1, 9. idem 2, 1 et 5, 18. n. 25. se-
 u. *Scribonius Largus* 79, 214. etc. *Marcellus Em-*
ericus de medicamin. lib. cap. XV. p. 505. ex ed. Henr.
Steph. *Plinius* sub fine libr. XXV. idemque in infini-

tis adhuc aliis locis, quorum taediosa esset enumeratio; *Coelius Aurelianus* 30, 26. *Columella* 7, 11. *Vitruvius* 8, 3. tumores, qui maxime in cervice nascuntur, strumam appellant, sed non perpetuo vocabulum illud eo sensu usurpant, saepenumero enim et quidem in iisdem quoque locis, quos enumeravi, significat tantum id, quod *Latinis* scrophula vocatur et vel in anteriore colli parte, et ab altera ipsius parte et ab utraque, vel in alis et inguinibus et in lateribus oritur. Ex his igitur liquido constat, veteres minime exacte de tumoribus hisce diversis egisse; excusationem tamen aliquam vel eo nomine merentur, quod *Graecis* ex parte in hos errores fuerint inducti. Hi enim late extendunt τῶν χοιράδων vocabulum, illudque cum quibusvis tumoribus imprimis glandulosis in quacunque corporis parte apparentibus confundunt, et non tantum bronchocelen, sed et atheromata, steatomata, melicerides, atque herniam carnosam inter tumores strumosos referunt, atque per illos quarumcunque partium tumores etiam sub alis et inguinibus interdum intelligunt, de quo *Sennertus* in instit. l. 5. sec. 2. c. 13. p. 1054. consulatur. Sed de his abunde: Plurimum inferius. — Quod autem struma affectus sit antiquis et nostris temporibus valde existimatus turpis et molestus, non solum ex eo apparet, quod *Hippocrate* istum ad pessimum colli morborum genus referat, libro de glandulis cap. VI. p. 417. ex edit. *van der Linden*, sed etiam quod *Cicero* ad turpitudinem et perniciositatem alicujus rei uberius exprimendam vocabulum strumae eleganter utatur: „Hi“, ait pro Sext. 155, c. 65, „medentur reipublicae, qui exsecant pestem aliquam, tanquam strumam civitatis;“ porro *Cic.* *Attic.* 2, 9. „Proinde isti licet faciant, quos velint Consules Trib. Pleb. denique etiam Vatinii sacerdotii strumam διστάφω vestiant.“ Videbis cet. Et apud *Erasmum* in chiliad. adagium enatum: „strumam διστάφω vestiri

ve tegere, i. e. infamiam, scelera, turpitudinem
 gnitate aliqua obliterare.“ *Catulli* illud carm. LII.
 se ipsum de *Struma* et *Vatinio*:

Quid est, Catulle, quid moraris emori?

Sella in curuli *Struma* *Nonius* sedet:

Per consulatum pejerat *Vatinius*.

Quid est, Catulle, quid moraris emori?

Catullus enim cum homines indignissimos, *Nonium*
Strumam et *Vatinium* ad summos honores, hunc qui-
 am ad Consulatum, illum ad aedilitatem praeturamve
 electos videret, ob vix ferendam rei indignitatem non
 amplius in terra sibi morandum putat. Simili fere
 animi indignatione *Horatius* Epod. IV. invehitur in
Maenam, *Pompeji* libertum, qui levitate et perfidia
 quoque eo pervenerat, ut non solum divitiis, sed eque-
 stri splendore adeo superbiret. Meminit etiam *Nonii*
Strumae *Plinius* hist. natur. XXXVII. 4. 21, cujus
 extinguendi causa addit, „quem *Catullus* poeta in sella
 curuli visum indigne tulit.“ *Struma* hoc in loco est
 cognomen a *struma*, cervicis tumore, cujusmodi multi
 quod veteres a naëvis corporis vel ab alio eventu tra-
 hant cognomina: sic *Scrofa* est cognomen *Tre-*
belliorum, *Scrofa* *Tremellius* ponitur in *Varronis*
 R. R. lib. 2, 4. ubi de avo suo, „Avus,“ inquit,
 meus primum appellatus est *Scrofa*: qui quaestor
 cum esset *Licinio Nervae* Praetori, in Macedonia
 provincia relictus, qui praeesset exercitui, dum Prae-
 tor rediret, hostes arbitrati occasionem se habere vi-
 ctoriae, impressionem facere coeperunt in castra. Avus
 cum hortaretur milites, ut caperent arma, atque exi-
 unt contra: dixit, celeriter se illos, ut *scrofa* porcos,
 pecturum, id quod fecit. Nam eo proelio hostes
 a fudit, atque fugavit, ut eo *Nerva* Praetor, Impe-
 tor sit appellatus: et avus cognomen invenerit, ut
 ceretur *Scrofa*. Itaque proavus et superiores de *Tre-*
belliis nemo appellatus *Scrofa*. Nec minus septimus

sum deinceps Praetorius in gente nostra.“ Hactenus *Varro*. Haec tamen natalium explicatio cum expositione a *Macrobio* Sat. 1, 6. facta minime consentit: ridiculum est, quod huic referre placet. „Tremellius Scrofa,“ inquit, „cognominatus est eventu tali:“ i. Tremellius cum familia atque liberis in villa erat servi ejus cum de vicino scrofa erraret, surreptimè conficiunt. Vicinus advocatis custodibus omnia circumvenit, ne qua efferri possit, isque ad dominum appellat, restitui sibi pecudem Tremellius, qui ex villicorum rem comperisset, scrofae cadaver sub centonibus collocat, super quos uxor cubabat, quaestionem vicini permittit. Cum ventum est ad cubiculum, verba jurationis concipit, nullam in villa sua scrofam, nisi istam, inquit, quae in centonibus jacet, lectulum monstrat. Ea facetissima juratio Tremellio Scrofae cognomentum dedit. — Sic etiam *Scrofa* aliquis scripsit de R. R. libros, quos *Plinius* allegat 17, 25. — Multa adhuc hic disputari possent de cognominibus apud veteres, sed quis haec brevi commentario perstringeret, quae non nisi justo volumine explicari possunt? —

Quemadmodum vero vitia postquam diu multumque invaluerunt, quandoque in virtutes abire videntur, ita corporis quoque deformitates nonnullae, si publice grassantur, et communes fiunt, totamque gentem, aut magis conspicuos invadunt, non pro labe amplius habentur, sed venustati corporis annumerantur, quasi formae gratiam conciliarent, et de generis antiquitate testimonium perhiberent. Tam imperiosa est in oculos consuetudo, quam tanti fecerunt philosophi omnes et medici, ut eam natura non inferiorem duxerint. *Aristot.* lib. de mem. et rem. cap. 2. ait: „ὥςπερ γὰρ φύσις ἡδὴ τὸ ἔθος,“ tanquam enim natura jam consuetudo est;“ lib. etiam 7. de morib. cap. 11. ibid. scribit difficile esse mutare consuetudinem, ὅτι φύσει ἔσται,

mod naturae perquam similis sit, quemadmodum pro-
ut ex his *Eveni* versibus:

φημι πολυχρόνιον μελέτην ἔμεναι φίλε· καὶ δὴ
ταύτην ἀνθρώποισι τελευτῶσαν φύσιν εἶναι:

Multos, quod partum est meditando, permanet annos,
Atque in naturam tandem convertitur usus.

quod ipsum quoque affirmavit *Michael Ephes.* comm.
Arist. de mem. et rem. unde eleganter *Galen.* com-
ment 5. in libr. *Hippocr.* de officina part. 21. consuetu-
dinem vocat ex maximorum medicorum mente ἐπίκτη-
τη φύσιν, adventitiam naturam, quam appellationem
est *Galen.* ei tribuit Melet. lib. de structura hominis
p. quot facultatibus homo praeditus est, ex eo factum
se reor, ut a *Sext Empir.* advers. Mathem. c. 10. con-
suetudo habita sit nec ars pura, nec mera natura οὔτε
ἀνήνη οὔτε φυσικὴ συνέσθαι, sed aliquid medium inter
artem et naturam. Imo vero tantum consuetudini tri-
bitum Hippocratis aetate, ut consuetudo pro ipsa na-
tura usurparetur. Testem habeo *Gal.* comm. 2. in
prognost. *Hipp.* part. 11. „ἀλλὰ ἐπὶ τῶν Ἱπποκράτους
ἰσχυρῶν,“ inquit, „οὐκ ἄλλο μὲν τὸ κατὰ φύσιν, ἄλλο δὲ
ἐκθῆ;“ at vero temporibus Hippocratis non aliud fuit
natura, aliud in consuetudine. „Ex qua quidem
analogia consuetudinis cum natura idem pene conces-
sum utrique imperium, eadem potestas attributa: licet
cum natura omnibus honoribus insita sit, et ex pri-
ordiis generationis enata, consuetudo vero adventi-
tia externa et aliunde comparata, iis tamen interdum
obstant viribus, ut consuetudo naturae nomen induat,
natura consuetudinis appellatione delectetur. Sic Euro-
peos candor delectat, nigror Mauritanos, quo fit, ut
signum laetitiae atque ornatus nigras vestes assu-
mant, quae apud Europaeos moeroris sunt et funeris
monumenta. Invenustarum mulierum deformitatem
familiaritas et convictus sic lenit vel dissimulat, ut pro
natu haberi possit, ad quod non male accommoda-

veris illud Lucretii de amore lib. 4. de rerum natura:

Multimodis igitur pravas turpesque videmus
Esse in deliciis summoque in honore vigere.
Nigra *μελίχροος* est, nervosa et lignea *ἄκοσμος*;
Caesia, *παλάδιον*; immunda et foetida, *δορκὰς*,
Parvula, pumilio, *χαρίτων ἴα*, tota merum sal.
Magna atque immanis, *κατάπληξις* plenaque honoris:

et illud Ovid. in lib. secundo amorum, eleg. 4.

Candida me capiet, capiet me flava puella,
Est etiam in fusco grata colore venus:
Seu pendent nivea pulli cervice capilli,
Laeta fuit nigra conspicienda coma.
Seu flavent, placuit croceis Aurora capillis,
Omnibus historiis se meus aptat Amor.

Inter corporis vero vitia strumae gentibus quibusdam familiares, non morbis ab iisdem accensentur, qui formae labem aspergant, sed pro dignitatis nota habentur, et in numerum ornamentorum referuntur. Nemo enim juxta *Juvenalem* Satyr. 13, v. 162. in Alpibus tumidum guttur miratur, imo tantum potius incolis es ornamentum, quanta aliis aurea diademata gemmis et unionibus intertexta. Luculentum hujus rei testimonium dat femina in Ducatu Carynthiae, quae decocto Vincetoxici suis glandulosis mederi laborabat, et ab *Elsnero* medico interrogata, cur non eodem remedio sibi met ipsi struma laboranti consuleret? respondebat se nullo indigere remedio, cum tumores isti sibi sine ornamento. Haec de strumis opinio honorifica si omnibus probaretur, qui iis laborant, nae ego haberem, cum ab opera, quam in evolvenda hujus tumoris indole curatione collocare in animum induxi, potius abstinerem? Enimvero longe aliter sentiunt aequi formae spectatores, qui gratiam corporis in legitima partium structura quaerunt, eamque organorum proportionem convenienti metiuntur, atque colli potissimum aequallem et fere circularem rotunditatem laudant; foedo

vero ejus tumores horrent, et tantum non abominantur. Operae itaque pretium me facturum spero, si de colli gratia et structura naturali restituenda laboravero. — Multa dici possunt similia, sed non video, quid utilitatis inde ad lectorem redeat; quae enim in tali re sint servanda, executi sumus. Jam vero non ausim silentio praetermittere diminutivum *strumella*, parva struma, quod apud *Marcellum Empiricum* c. 15. occurrit; porro adjectivum *strumosus*, qui id vitium patitur, vid. *Juvenal.* Satyr. 10, 509.:

Nec praetextatum rapuit Nero loripedem, nec
Strumosum, atque utero pariter, gibboquo tumentem.

Colum. l. 7, c. 10. „Subus strumosis sub lingua sanguis mittendus est.“ Sic etiam Adjectivum *strumaticus* extat apud *Jul. Firmium* lib. 8, c. 19. „Vicesima tertia pars arietis, si in horoscopo fuerit inventa, strumaticum faciet, exulcerata macularum labe possessum, vel certe elephantiaca contagione maculatum.“ Hinc quoque deductum videtur *strumea*, herba, quae ipso nomine et fronte mirum quid promittit ad curationem, sed in exsolvendo promisso languet; vid. *Plinius* 12, 13. de quarta ranunculi specie: „Nostri,“ inquit, „herbarii *strumeam* vocant, quoniam metetur strumis, et panis, parte in fumo suspensa, creantque ea rursus sata, rebellare quae curaverint, vitia, quo scelere et plantagine utuntur.“ Eadem herba vocatur alio nomine *strumus*, utilis herba ad strumatas, unde nomen: *Plin.* l. 27, c. 8. ad fin. et *Apuleius* de herb. cap. 74. — Sed haec sufficiant ad nominis illius rationem intelligendam: forsitan alia adhuc vocabula in usu fuerunt Latinis, sed ad vivum omnia rescire hominis est potius curiosi quam docti, quare ad alia commigro. —

Variis aliis nominibus morbus hic designari solet.

Graecis strumae appellantur χοιράδες ²²¹ a, b) et quidem ex mente *Aeginetae* lib. 6. cap. 35. p. m. edit.

221 a) Qui rem exactius nosse voluerit, consulat *Hippocratem*, Aphor. III. 26. p. 81. lib. de glandulis cap. VI. p. 417. et Coac. Praenot. 145. pag. 574. vol. I. ex edit. van der Lindten. Porro *Galenum* de tum. praeternatur. 3. a. 84. F. de different. morb. 3. a. 3. D. multisque aliis locis, quos ex magno et pleno acervo depromere non placet: vide *Antonii Musae Brasavoli* indicem refertissimum in omnes *Galen*i libros. — *Oribasium* de morb. curat. lib. III. cap. XLIII. vol. I. p. 634. C. D. — *Paulum Aeginetam* lib. IV. cap. XXXIII. p. 518. vol. I. lib. IV. cap. XXXV. p. 564. vol. I. — *Aëtium* Tetr. IV. Sermo III. cap. V. p. 741 — 742. vol. II. — *Actuarium* de method. med. lib. II. p. 190. F. G. vol. II. — *Nicol. Myrepsum* de Propom. sect. XXXVIII. p. 773. vol. II. ex edit. *Henr. Stephani*; — *Dioscoridem* lib. 2. c. 153. sic denique haec etiam ex *Julii Pollucis* onomastico repetantur, qui ita scriptum reliquit: χοιράδες περὶ σιαγόνι καὶ τραχήλῳ καὶ μασχάλοις καὶ βουβῶσιν, id est, tumores sive strumas aut scrofulas circa maxillam et collum et axillas et inguina reperiri. — Quam quidem Graecae vocis ambiguitatem interpretes non assecuti, per strumas omnes corporis praeternaturales eminentias exposuere, quas tumores debuissent nominare. 221 b) χοιράς, ἄδος, id est porcula, scrofula, quam primariam significationem confirmare possem ex infinitis *Graecorum* locis, nisi rem notam omnibus et perspectam in memoriam revocarem. At peculiari nomine χοιράδες dicuntur πέτραι λεῖται ἐν θαλάσῃ, ἢ δεξοχαί, ἢ ὄχθη πετρῶν, teste *Suidā*. Aliis saxa sub mari nigra, aliquantulum eminentia, ut porco nanti similia videantur. Sic *Euripidis* quoque Scholiastes χοιράδα nominari scribit πᾶσαν πέτραν δεξιέχουσαν καὶ περικλυζομένην θαλάσῃ, σπήλαιον ἔχουσαν, quamlibet rupem e mari eminentem, quaeque undis marinis circumluitur, et cavum antrum habet; id quod ipse Tragicus innuit sub finem *Andromachae*, Ἐλθὼν παλαιᾷς χοιράδος κοῖλον μυχὸν Σηπιάδος, ἴσεν. Idem alibi *Troad.* v. 89. Διήμιοι χοιράδες dicit, Delii scopuli; sic in *Eumenidibus Aeschyli* v. 9. λιπὼν δὲ λίμνην Ἀηλίαν τε χοιράδα, *Apollo* autem cum paludem *Deliacam*que rupem reliquisset; rupem vero *Deliam* dixit *Aeschylus* et similiter *Euripides*, ideo quod arida et saxosa esset haec insula, dicta inde κρανικὰ Ἀήλος ab *Orpheo* 5. *Onomacrito* in

graecae 187. τοῦνομα λάβουσα ἢ ἀπὸ τῶν χοιράδων πετρῶν
 nomen acceperunt, aut a choeradibus petris, quae
 sunt saxa sub mari nigricantia, aspera, aliquantum
 eminentia, et ideo porcis natantibus, dum capite emi-
 nent, ita dicente *Joh. Langio* epist. med. 43. l. 1. pag.
 218. similia; ἢ ἀπὸ τῶν συνῶν, ὅτι πολυτόκον ζῶον, ἢ ὅτι
 τοιουτώδεις οἱ χοῖροι τραχήλους ἔχουσιν; aut a suibus, eo
 quod numeroso foetu foecundum est animal, aut quia
 ejusmodi colla habent, in quibus vulgus scrofulas
 illas de collo pendentes vocare solet Klöckchen am Halse,
 habenturque pro signo bonae frugis. Inde quoque, ut
 et forsā quod strumulae interdum aliquo modo repre-
 sentent mammas scrofularum, hi strumosi tumores
 scrofulae ²²²) vocantur.

Speciali nomine quibusdam ²²³) struma in antica
 parte colli apparens βρογχοκήλη a voce *Graeca* βρόγ-
 γος, aspera arteria, et κήλη, hernia, seu ramex guttu-

Argonauticis, et a *Pindaro Isthm. od. 1.* ubi juxta veteres
 ejus enarratores τραχεῖα καὶ πετρώδης ἡ νῆσος eadem traditur.
Theocritus petras symplegadas etiam χοιράδας appellat, ut
Idyll. 13. de Argo navi. In Epigrammate legimus etiam χοιρά-
 δας εἰς πέτρας addito substantivo, quod in praecedentibus omis-
 sum est. — Jam vero Adjectivum etiam occurrit, χοιραδώ-
 δης, *strumosus*, quod *Plutarchum* habet auctorem in *Symp.*
 4. „ὥςπερ ἐν τοῖς σώμασι τὰ χοιραδῶδη καὶ ἀδενῶδη φύματα
 θερμότητες τινες καὶ ὑγρότητες αἵματώδεις ἐν δημιουργοῦσι.“
 De reliquis cum satis copiose sint commemorata, non est, quod
 pluribus exponantur, ne his coctam crambem apponere cogar.
²²²) Ad probandam hanc sententiam prodeat ex veteribus *Cel-*
sus lib. V. cap. 28. — *Scribonius Largus* de compos. med.
 liber cap. 20. B. C. p. 206. vol. I. — *Marcellus Empiricus* de
 medicam. lib. cap. XV. A. B. p. 307. vol. I. ex edit. *Henr.*
Stephani. ²²³) *Paullus Aegineta* de re med. lib. VI. cap.
 XXXVIII. E. F. vol. I. p. 565. — *Aëtius* Tetr. IV. sermo III.
 cap. VI. vol. II. p. 743. Tetr. IV. sermo I. vol. II. p. 669. —
Celsus lib. VII. cap. XIII. H. A. B. vol. I. ex edit. *Henr. Ste-*
phani.

ralis, dicitur. Quomodo vero differant, jam videas apud *Aquapend.* de chirurg. operat. p. m. 251. Sic porro *Juvenalis* Satyr. 15. v. 162. eam appellat tumidum guttur:

„Quis tumidum guttur miratur in Alpibus?“ — —

Vetus interpres addit: „tanquam si in Alpibus homines gutturosos admireris, ubi tales sunt plurimi; nam lata et inflata colla habent.“ Quam quidem gutturis significationem *Plinius* quoque lib. 11. cap. 37. sect. LXVIII. confirmavit his verbis: „Guttur homini tantum et suibus intumescit, aquarum, quae potantur, plerumque vitio.“ Adjectivum *gutturosus*, qui tali tumore laborat, extat apud *Ulpian.* in Pandect. de aedilicio edicto l. 12. §. 2. „Si quis natura gutturosus sit, aut oculos eminentes habeat.“ —

Latini recentiores ex graeca in suam tradiderunt linguam nomina. In eorum itaque scriptis morbum sub nomine *Scrofulae* ²²⁴⁾, *Bronchoceles* ²²⁵⁾, *Tracheoceles* ²²⁶⁾, *Trachelophymatis* ²²⁷⁾, *Herniae gutturalis* ²²⁸⁾, *hydropis glandularum colli* ²²⁹⁾, et in lingua latina plane inculta *Botii* ²³⁰⁾, *Bossii* ²³¹⁾ et *Bocii* ²³²⁾ designatum le-

224) *Fabric.* ab *Aquap.* lib. de tumoribus p. 26. — *Daniel Sennertus* instit. med. libr. V. part. I. sect. II. cap. XIII. p. 963. — *Heisterus* instit. chir. edit. Amstel. 1750. p. 678. — *Unzerus* medicin. Handbuch 1794. N. 52. n. 1. — *Thomas White* über Scropheln und Kröpfe nebst Widerlegung ihrer Erblichkeit 1783. 225) *G. Fallopii* tract. de tumor. praeter natur. in op. omn. 1584. Part. II. cap. 17. — *Monteggia* l. c. p. 75. — *de Sauvages* Nosol. method. Tom. I. p. 157. — *Zoonomie* von *Darwin* 3. Th. Class. I. 20. 226) *Fernelii Ambiani* univ. med. Francf. 1693. p. 649. 227) *Sagar* system. morborum sympt. 1783. Spec. 31. 228) *Arn. Villanovani* oper. omn. Basil. 1585. p. 1190. 229) *Chr. Gottl. Lange*, diss. de strumis et scrofulis, Viteb. 1707. p. 3. 230) *Monteggia* l. c. p. 73. 231) *Gautieri* l. l. p. 11. 232) *Astruc* Abhandlung

gimus. Paulo post *Kortum* ²³³) in hanc quoque ar-
nam prodiit, rem aliquam natura sua difficilem via ac-
ratione excussurus, et hic revera prae aliis nominan-
dus est, qui primas illas denominationes vituperaverit,
quibus de alio morbo, dilatatione nempe membranae
interioris asperae arteriae vel quando ex membrana
tracheae disrupta aëris fit infiltratio in glandulam thy-
reoideam et telam cellulosa adjacentem, nunc uti
solent; *intumescientiam* vero *glandulae thy-*
reoideae strumam appellant, quo nomine vete-
res etiam *scrophulas* significabant. *Scaligero* et
Camerario ii, quorum guttur tanquam spongia quae-
dam intumescit, *gutturones* nuncupantur. —

Germanis strumae vocantur Kröpfte sive Gröpf-
fe et Kröpfe, forsitan a comparatione ab ingluvie
pennatorum desumpta, quae nobis pariter der Kropff
dicitur, et in anteriore colli parte, praecipue si alimen-
tis repleta fuerit, eminenter conspicua est; porro Ge-
wächse, Aftergewächse am Halse, et *Unzerus*
nomen ei tribuit Halskropff ²³⁴) et *Schmalzius*
Gurgelgeschwulst, dicker Hals ²³⁵).

Batavis est Krop, Kropgezwel ²³⁶), Krop-
zweer, Keelgezwel, Keelbreuk.

Danis Keigbyld, Quaerkbyld.

Suecis struma, Knöliaext, Knölar.

Polonis Wól (id est Wola).

Russis ζοδζ (id est Zob.)

von Geschwüren und Geschwülsten mit Anmerk. und Zusätzen
von O. B. G. Hebenstreit 2. Th. p. 184. — *Musitanus* de tu-
moribus praeter naturam cap. XXV. ²³³) C. G. T. *Kortum*
Abhandlung von den Scropheln aus dem Latein. Lemgo 1793.
p. 49. ²³⁴) l. c. No. 52. m. 1. 2. ²³⁵) Versuch einer me-
dizinisch - chirurgischen Diagnostik in Tabellen etc. 1808.
XLVIII. B. ²³⁶) Proeve over de voornaamste langdaurige ge-
zwellen. Voor Dr. van Gescher, Amst. 1767. p. 220.

*Anglis est Bronchocele, Derbyneck*²³⁷), *Goitre*²³⁸),
Wen on the throat, Derbyshire Neck.

*Francogalli nomine Gottre*²³⁹), *Gouatre*²⁴⁰),
*Goêtre*²⁴¹), *Herme gutturale*²⁴²), *Gultron*,
Tumeur de Cou.

*Italīs est Gozza*²⁴³), *Gosso della Gola*,
Gozzaja, Soggioja.

Hispanis Seca, Lapos, Lobanillo, Papera.
Iusitanis Papo, Papeira, Inchaco, Bocio,
Enchaco, Goetra, Trama.

b. Homonymia.

Homonymiam quod attinet, sumitur in scholis
medicis vocabulum *strumae late, stricte et stri-*
ctissime. Late et improprie omni fere tumori aut no-
tabili extantiae, in quacunque demum parte illa sit,
tribuitur; sicuti nomine *Bocii* penes *Valescum de*
Tharanta in *P hilonio* Tract. Chir. c. 15. *Langium* L.
I. epist. 43. aliosque varii tumores veniunt, tam non
glandulosi, quam glandulosi. (Usitatiore tamen signi-
ficatione *bocium* idem denotat, quod *bronchocele*).
Hinc pro gibbere apud *Celsum* medicorum olim Cice-
ronem, et apud *Langium* in epist. 4. lib. 3. p. 980. pro

237) *Th. Prosser* an account and method of cure of the *Bron-*
chocele or *Derbyneck*. Lond. 1769. *R. Hamilton's* *Eeobach-*
tungen über die Scrophelkrankheit, a. d. Engl. Leipzig 1793.
p. 107. 238) A memoir concerning the disease of *Goitre* as it
prevails indifferent parts of North-America, by *Barton*, Phi-
ladelphia 1800. 8. 239) *Foderé* essai sur la goître et le crê-
tinage. Turin 1792. — *Girard* loupologie, à Londres 1775.
p. 404. 240) *L. Pétit*, traité de mal. chir. et des opér. qui
leur conviennent, Paris 1763. Tom. I. cap. IV. p. 173. 241)
Précis de chirurgie pratique, Paris 1763. Tom. II. chap. 12.
242) *Dictionnaire raisonné des sciences et des arts etc.* Tom. VII.
p. 770. 243) *Dionis* cours d'opérations de chirurgie, par
G. de la Faye, Paris 1757. p. 639.

abscessu in folliculo seu propria membrana coarctato et coalito accipitur. *Lindenius* melet. part. 1. §. 55. pag. 101. strumam, glandulam et nactam steatomatis accenset. *Langius* in diss. de struma ac scrophulis 1707. Viteb. praeside *Sperlingio* habita §. 4. per strumam tumorem simplicem, per scrophulas autem magis multiplices et plerumque minores significari optime vult. *Durantes Scacohus* in suo subsidio medicinae l. 4. c. 14. p. m. 351. in qualibet corporis parte strumas evenire posse scribit, et *Laurentius* Regis Galliae quondam medicus, Nobilem quendam totum fere a capite ad calces strumosum observavit. *Johannes Philippus Ingrassias* lib. de tumoribus in dissectione cadaveris strumas circiter septuaginta diversae magnitudinis vidit in mesenterio. Observatum quoque est in praxi non una vice, illos, qui strumis externis afficiuntur, internis quoque ut plurimum laborare, et glandulam majorem mesenterii, quae Pancreas Asellii vocatur, plerumque affectam, justo nempe majorem et durior-em inventam fuisse quam alias esse solet in statu naturali; vid. *Ephem. Germ. Ann. I. obs. 57. p. 155.* Juxta *Galenum* in libr. de tumoribus praeter natur. omnis inflammatio indurata, et in scirrhum mutata struma dici potest. Et sane ipse *Hippocrates* non in una eademque significatione vocabulum τῆς χοιράδος adhibuit. Nam in *Coacis* L. II. Sect. 3. aphor. 2. ex distinctione *Hollerii* χοιράδας anno decimo ad quadragimum secundum fieri docet, quod nobis de struma et de glandulis folliculo instructis experientia teste assumendum est. In aphorismo vero 26. sect. 3. χοιράδες καὶ τὰ ἄλλα φύματα mox post dentitionem jam nasci scribit, ubi per illos sine dubio glandulas dispersas vel collectas, easque tumefactas, utpote qui affectus junioribus admodum frequentes cernuntur, per haec vero omnes tumores, qui extra glandulas nascuntur, annotavit, minime autem strumas, utpote huic aetati non

competentes. Sic *Blancardus* ²⁴⁴⁾ in maxillis et in hepate strumas descripsit; brachio adnatum tumorem magnum strumam vocavit; *Schenkius* ²⁴⁵⁾ vero ingentem in coxa tumorem, cujus praecisae carnis moles pondus sexaginta librarum excessit, *Benivenius* ²⁴⁶⁾ in dorso, et *Ephem. Nat. Curios.* ²⁴⁷⁾ strumas toto corpore dispersas commemorant, *Pechlinus* ²⁴⁸⁾ tumorem ad duorum pugnorum magnitudinem majorem in spatio superiori, quo cor spectat, inter utrumque ventriculi orificium sectione detexit, quem strumam ventriculi vocavit *Frankenau* ²⁴⁹⁾; curiosa est observatio, quam *Bonetus* sepulchr. libri IV. sect. 2. ex *Nicolai Fontani* Resp. et Cur. med. allegat, videlicet juvenem strumis, quae gulam asperamque arteriam simul adeo compresserant, ut neque potus vel ipse aër transire posset, mortuum esse, cujus dissecto cadavere reperiatae fuerunt in orificio stomachi etc. etc. Indurationem glandularum oesophagi ventriculi orificio superiori vicinarum, penitus deglutitionem assumptorum abolentem, *Mauchartus* ²⁵⁰⁾ strumam oesophagi appellavit, et secundum Ephemerides Naturae curiosorum in aliis adhuc locis insolitis strumas sedem habuisse scriptum legitur. Sic denique Callisen complures intumescantias, quibus glandula thyreoidea non afficitur, ad strumas sic dictas spurias numeravit, et huc sequentes refert affectiones:

a) Strumam fungosam, i. e. tumorem colli ex infiltrationem materiae gelatinosae in telam cellulosa coli, quo glandula thyreoidea minime tumet. Haec au-

²⁴⁴⁾ Anat. pract. C. 2. Obs. I. p. 193. ²⁴⁵⁾ Observat. med. Lib. V. p. 723. ²⁴⁶⁾ lib. de abditis morbor. et sanationis causis cap. 13. p. 219. ²⁴⁷⁾ Dec. II. ann. 10. observ. 115. pag. 207. ²⁴⁸⁾ Observat. 31. Libr. 3. p. 481. ²⁴⁹⁾ Eph. N. C. Decas. 3. An. 5. et 6. obs. 175. p. 401. ²⁵⁰⁾ Diss. de struma oesophagi hujusque coalitu etc. Tubing. 1742.

in struma cum bronchocele cellulari Schmalzii est comparanda.

b) Strumam cysticam. Inciderunt recentiorum multi v. c. Noël, Lieutaud, Astruc et alii in illum verum errorem, strumam tumorem cysticum esse, forma tumoris externa decepti; tumores enim cysticos colli strumae figuram accipere, iisque symptomatibus conjunctos esse posse, Kortum bene jam monuit, quod tamen naturam et sedem magnum intercedit discriminem, de quo infra adhuc exponemus.

c) Strumam aneurismaticam Callisen quoque ad strumas spurias refert. Aneurisma arteriae carotidis saepe figuram strumae prae se fert, ita ut pulsatione ab hac secerni possit. Itaque *Wisemann* (several surgical treatises, by *Wisemann*. Lond. 1767. pag. 1.) affirmat, multos se adiisse aegrotos cum colli tumore, quem strumam esse multi crederent, a pulsatione autem tumoris se intellexisse, aneurisma adscribere.

d) Inter alia Callisen strumam glandulosam ad strumas numerat, quam, tumorem a scrophulosa glandularum colli affectione excitatum, appellat. Hanc strumam vero ad scrofulas esse referendam, nemo est, in hoc concedat. — *Stricte* vero idem accipitur pro glandularum duris et peculiari membrana conclusis tumoribus, qui in glandulis sub axillis, in inguinibus, ut in mammis, plerumque autem in collo oriri solent: *de Hippocratem* in libri de glandulis cap. VI. 65. p. 7. ex cit. edit., *Galenum* 14, meth. med. cap. 11. *Reginetam* de re med. lib. VI. cap. XXXV. p. 564. et lib. IV. cap. XXXIII. p. 518. *Aëtium* Tetr. IV. Sermo 1. cap. 5. p. 741—42. *Actuarium* de meth. med. lib. I. F. G. pag. 190. ex edit. cit. et *Paullum a Nicaea*, quae verba ipsa producantur, cum manuscriptum, quod *Cl. Dresdensis medicus, Weigeli*us, quo praefatus Aesculapio arae semper calebunt, Romae invenit,

nondum sit evulgatum doctisque igitur plane adhuc ignotum. Qui vir cum alios *Angelicae Bibliothecae* codices perlustraret, in hunc quoque thesaurum incidit, eumque descripsit. Consilium, quod tum ceperat, libri edendi, postea non abjecit, eique servatum est, ut pretiosissimas illius vetustatis reliquias e tenebris protrahat, eoque incremento rem literariam fortinet. Caeterum *illustri viro* ago gratias, ut debet immortales, quod ita animatus in me sit, ut his non solum frui voluerit, sed reperti thesauri me quoque liberaliter participem fecerit. Auxit meum amore in virum omni literarum genere eminentissimum habita a me non exspectata, eoque jucundior voluntatis erga me minime dubia significatio; soleo enim amare in hominibus humanitatem haud paullo plus mehercule quam doctrinam. Sed ut eo, unde digressus sum redeam; scripsit *Paullus a Nicaea* haec verba: „
 ἔστι χοιράδες; φύματα μὲν ἐπὶ τραχήλου καὶ μέχρι κατακλάδων καὶ στήθεος ἐκφύονται.“ Et denique consulere non pigeat *Celsum* lib. V. cap. 28. *Leonh. Fuchsium* de curandi Ratione L. V. cap. XVI. *Hieronymum Morituum* in pract. med. parte IV. cap. XXIV. *Sennertum* Prax. L. II. P. I. cap. XXV. aliosque. Nonnulli autem strictissime loquendo strumam et scrophulas aliasque intumescencias inter se distinctas esse voluerunt de quo legi potest *Warthonus* in adenogr. cap. 40. m. 253. et *Platerus* in Prax. T. 3. cap. 3. ac per strumam κατ' ἐξοχὴν dictam, eum saltem, qui in colli secundo gutturi incumbente residet, atque glandulam thyroideam ²⁵¹), saepius cum tela cellulosa vicina, nec non

251) *J. B. Morgagni* de sedib. et causis morbor. Louani 1761. Lib. IV. Cap. 50. — *Sauvages* l. c. p. 57. — *Girard* l. c. p. 407. — *Baillie* l. l. — *Camper* in libro doctis percognito. *J. J. Plenck* novum Systema tumorum Part. I. p. 104. — *Foderer* l. m. — *Bell's* Chirurgie Tom. IV. p. 337. — *Hausleutner* et cl. *Iphofen* l. l.

glandulis colli minoribus, occupat, tumorem intelligunt, de quo etiam nobis in praesentiarum potissimum sermo est. — Jam vero res et tempus me monet, ut illa pandam, et e portu tandem aliquando navigem; strumae enim difficultati satisfactum puto, quamquam multa adhuc, ut opinor, hac de re disputari possent; sed nolim obvia quaeque quasi ex occasione abripere.

§. 41.

2) Natura et forma strumae.

In morbo explorando primum ad ejus naturam, deinde ad formam, quae ex phaenomenis apparet, spectemus. Sed non sufficit morbum solum cognoscere, sed etiam, quae partes maxime affectae sint, intelligere. Struma itaque, ut supra dixi, est forma pseudorganica glandulae thyreoideae, colli anteriorem partem occupans. Sedes morbi est glandula thyreoidea, et quilibet alius tumor colli, sit hic vel aneurisma aortae, vel tumor cysticus, vel intumescencia colli infiltrationem materiae peregrinae etc. inepte ad strumam refertur. Peculiariora signa adsunt, quae enarrandi hic locus est. In anteriore colli parte tumor subest, qui ab initio raro sentitur, nullos dolores excipiens, et inaequalem et fere granosam superficiem praesens. Tumor, qui tarde increscit, mollis, elasticus, non raro mobilis, in basi latus et digito prementis cedens conspicitur. Saepe una glandulae thyreoideae pars ista abnormitate affecta est, ibique tumor efficitur; reliqua glandulae pars sana. Sic omnis hic tumor isthmum solummodo medium saepe indit⁵²⁾, saepe lobus unus alterve modo tumet, et

52) Monteggia l. c. p. 75.

reliqua pars in statu sano versatur ²⁵³). Si ars humoralis nullo modo nullo fines imponit, tumor magis magisque incrementum accipit et augetur ²⁵⁴ a. b.), interdum totum fere collum cingit, imo etiam ad claviculam aut sternum usque in cavum pectoris descendit, tracheam, pulmonemque comprimit ²⁵⁵), et magnitudine accrescente in-

253) *Paullus Aegineta* de re med. lib. VI. cap. XXXV. p. 564. *Halleri* opusc. pathol. Observ. 8. 254 a.) *Noël* précis sur la nature des maladies produites par le vice des humeurs lymphatiques, Paris 1779. p. 101. et *Girard* l. c. p. 408. ad pectus imo ad umbilicum usque pependisse observarunt. 254 b.) Inter nonnullas gentes et populos strumae ob frequentiam suam in statum ipsis plane naturalem abeunt, ut nequidem medela adversus illas expetant. Multis nationibus quam maxime familiares sunt, habitantibus praecipue in locis paludosis et montibus v. g. in Silesia, Carynthia etc., inter quae tamen regio Tyrolensis notari meretur; nam ibidem in tractu Bünsgensi nempe fere nascitur et vivit, qui hac labe non inficiatur, adeo ut adveniens et proficiscentibus structura elegantiori praeditis vitio ad incolis vertatur, ac si membro ab iis pro principali habito destituerentur, et si quandoque nascitur infans sine ejusmodi tumore monstroso, pro imperfecto habent, atque aram Deumque venerantur argenteis vel aureis ad similitudinem efformatis strumis sacra loca exornando, precibusque impense fuis hoc decorem eximium pro recens nato exorant, quod etiam facile assequuntur, cum diaeta illorum satis sufficiens sit in progressu ad ejusmodi tumores excitandos. Strumae Bünsgensium adeo ingentes ac monstrosae sunt, ut etiam ad genua usque quandoque dependeant, sic uti videre est in icone I. dissertationi a Mittemayero editae: de strumis ac scrophulis Bünsgensium. Erfordiae 1723. praefixa. Aliae minores occurrunt mulierculis potius frequentes, quamvis utraque specie haud raro viri foeminaeque corripiantur; quantum vero quantitate prioribus cedunt, id numero supplent, dum totum fere collum cingunt, et multitudinem accrescente in molem satis notabilem atque molestam coacervantur, distinguuntur porro variis interstitiis seu foveis, ut uvularum baccas ex eadem racema dependentes quasi imitentur, v. quandoque etiam alterutro laterum annectuntur magis, et humerum sese reponunt. vid. fig. II. in dissert. cit. 255) *Schmucker's* vermischte chirurg. Schriften Bd. 1. obs. 35.

blem satis notabilem et molestam coacervatur: nunc
 maximae molestiae oriuntur, vitae periculo conjun-
 ge. Color superficiei strumae, qui antea naturalis fu-
 erat, in rubrum et coeruleum mutatur, et circa eam
 ssa interdum plena, vel pallida, vel livida tendun-
 tur ²⁵⁶) et quasi incurvantur, sic ut animantis cancri
 ductos pedes similitudine quadam representent. Per-
 multa alia adsunt signa et phaenomena, quae partim
 compressione in partes vicinas, partim ex natura et in-
 de strumae dependere videntur. Semper adest re-
 mandi et deglutiendi difficultas ²⁵⁷); ex pondere stru-
 mae et compressione laryngis ac nervorum loquelae in-
 venientium derivanda est vocis mutatio ²⁵⁸); voces
 im eduntur altiores, interruptae, suspiriosae asth-
 maticorum vel orthopnoicorum instar, accedit stertor
 rium, continua quasi gravedo et asperitas gulae,
 de voce obtusa et rauca nec unquam clara strumosi
 vident. *Mauchart* ²⁵⁹) in virgine extincta coagmen-
 ta prolifera struma tracheam adeo coarctatam vidit,
 nec tenuissimum graminis foliolum admittere potue-
 rit. A compressione octavi nervorum paris, capite in
 cretinis male conformato deducit hanc vocis mu-
 tionem *Ackermannus* ²⁶⁰). Respiratio interdum ita
 impedita, ut aegrotus in metu pneumoniae ²⁶¹),

256) *Astruc* l. c. p. 183. 257) Memorabile hujus rei exemplum
 refert *Monteggia* l. c. p. 73. Saepe etiam cariem laryngis ac
 tracheae ortam esse, observatum est. Cfr. *J. Lieutaud* hist.
 anat. med. Paris 1767. Tom. II. p. 302. — *B. Goosch* Cases
 and practical remarks in Surgery Norw. 1767. Vol. II. p. 99.
Monteggia l. l. p. 79. 258) vid. §. 39. nost. opusc. 259) dis-
 sert. cit. p. 22. 260) Ueber die Cretinen, eine besondere
 Menschenabart in den Alpen; mit Kupfern. Gotha 1790. 261)
 Recueil d'observations chirurg. faites par *M. Saviard*. Paris
 1784. p. 304. — *Consbruch* in Nov. Act. Nat. Cur. Tom. V.
 p. 83.

suffocationis et apoplexiae versetur, multa quoque exstant ab hac causa suffocationis exempla ²⁶²).

Oesophagus a tumore saepe ita comprimitur, ut cibis et potus a strumoso rejiciantur ²⁶³).

Ex compressione nervi laryngei superioris, recurrentis et nervi vagi auditus difficultas et vocis mutatio explicari facillime potest ²⁶⁴).

Compressio vasorum sanguiferorum reditum sanguinis ex capite impedit, ideoque congestiones sanguinis versus caput; unde sopores, vertigines et dispositio ad apoplexiam oriuntur et saepe teste *Hallero* ²⁶⁵ mors apoplectica inde secuta est.

Copia vasorum in glandula thyreoidea sanguiferorum permagna est, vasa congestionem valde dilantantur, facile itaque fieri potest, quod etiam factum est, ut disrumpant. Effunditur tunc sanguinis copia aneurisma quasi spurium oritur, quod subitaneum tumoris incrementum excitat, indeque suffocationem aut apoplexiam minatur ²⁶⁶). Struma nullis ei oppositis medicamentis semper quamquam tarde increscit interdum usque ad mortem, non raro etiam usque ad

262) *F. Roncalli* medicina Europae, Brixiae 1747. p. 229. — *A. Halleri* opusc. pathol. Obs. 8. — *Th. Kerkring* obs. anat. 74. in op. omn. an. p. 148. — *Pettmann* Nov. Act. N. Cur. Tom. III. p. 494. — *M. A. Severinus* de recond. abscess. natura. Lib. VIII. Lugd. Batav. 1724. p. 198. — *N. Tulp* obs. medic. Amst. 1672. p. 86. 263) *P. H. Verduin* in Auctuar. II. ad *J. Sculteti* Armam. chir. Amst. 1741. Obs. 18. — *Saviard* l. l. p. 304. 264) vid. §. 39. nost. opusc. 265) Loc. cit. Observ. 8. 266) *Severinus* l. l. c. 198. — *Foderé* l. c. p. 18. — *Petit* l. m. p. 125. — *Alix* etiam exemplum effusionis sanguinis ex arteriae thyreoideae sinistrae ramo in strumam narrat, quo aegrota apoplectico modo necabatur. Vid. Observ. Chirurg. Fasc. I. Obs. VII. Sed dubito, an observatio haec ab eo facta sit: alius enim medicus *Rumpel* totam rem verbotenus jam aliquot annos antea in Tomo V. Nov. Act. Nat. Cur. 1772. p. 247. enarravit.

quod tempus, quo ipsa sibi certos fines terminos-
e constituit. Observatione constat, quibusdam tem-
pibus strumam imprimis mollem, nec inveteratam
tumore augeri, aliis vero imminui. Hocce phaeno-
non imperio lunae in organismum humanum tribu-
um est, et omnia medicamenta contra strumam lau-
a decrescente luna porrecta esse legimus. *Noël* ²⁶⁷⁾
alii hoc negarunt et ridiculosum habuerunt hanc ex-
audi rationem, et potius connexui hujus morbi cum
menstruo mulierumtribuendum esse censerunt.
amquam influxus lunae in corpus nostrum nondum
ra omnem dubitationem positus est, tamen permul-
exempla adsunt, quibus vim e sideribus influentem
corpora haec inferiora ²⁶⁸⁾ et praesertim etiam in
corpus nostrum ²⁶⁹⁾ non parvam esse edocemur.
quidem cum ex vario coeli motu ortuque siderum et
usu non solum anni tempora distinguantur, sed et-
aër varias subeat mutationes, quibus hominum
peramenta afficiuntur, idcirco *Hippocrates* l. de
et. et lib. I. de aër. loc. et aq. Astronomiam Medico
necessariam esse putat, cui suffragatur *Galenus* comm.
lib. V. epid., assentiuntur gravissimi medici *Fortu-*
Fidelis in Bisso lib. 2. cap. 6., *Roder a Castro*
Med. Polit. lib. 2. cap. 2., *Hippol. Obicius* lib. Astro-
micarum praedict. et *Adria. Alemann.* comm. in lib.
apocratis de aër. loc. et aq. text. 15. Caeterum quaeri
posset, quot modis coelum in aërem resque sublu-

7) l. l. p. 101. 268) *Rich. Mead* de imperio solis et lunae in
corpora humana et morbis inde oriundis. Amstelod. 1710. 269)
Dissertatio valdopere laudabilis de struma auct. *J. G. Jordan*,
Götting. 1795. p. 20. „Equidem ipse, inquit auctor huj. diss.
duos vidi infantes, puerum quinque et puellam novem anno-
rum: ambo ab infantia jam glandulae thyreoideae tumore labo-
rabant, eorumque mater sanctissimo mihi affirmabat, se talem
mutationem lunae mutationibus arctissime respondentem, et in
infantibus et in semet ipsa strumam gerente observasse.“

nares agat, an manifesta ratione per lumen et motum an occulta per influxum, ac per motum si agat, an per se calefaciat, vel per accidens; si per lumen, an immediate vel radiorum interventu, si denique per influxum, an per effluxum substantiae aut virtutis. Sequia a philosophis magni nominis haec fusissime in utramque partem explicata sunt *Zabarell. Caesaer. Telesio, Pererio, Patritio, Anton. Bernardo, Bartholino*, idcirco nihil transcribam rerum ipsa experientia contentus, qua sola astrorum virtutes ne a doctis sed ab idiotis deprehenduntur. Soli quidem mundo oculo, planetarumque principi praecipua auctoritas adscripta, qui suo accessu generationis, recessu corruptionis rerum maxima est causa, sicque anni tempora distinguit, ut in aëre fiant varia temperamenta in animalibus tam potenter agit, ut varios humores producat, et ad coitum generisque propagationem quemadmodum jam scribit *Galenus* lib. 5. de cris. cap. 2., sollicitet. Magnae quoque sunt lunae in haec inferiora vires; nam et mulierum menstrua provocat et Epilepticis nocet, et stirpes fructusque adauget, et animantia saginat, et corpora humectat, emollit, putrefacit, velut eleganter insinuat *Gal.* loco cit. et *Plinius* lib. 2. cap. 100. Addit etiam *Galenus* mutationes quae morbis acutis accidunt diebus criticis, lunae esse tribuendas. Jam vero pro quadruplici ejus forma atque habitu, quem induit, dum lumen a sole foenatur, varias aëris mutationes inducit, interlunio quidem atque plenilunio vehementiores, quod illud frigidius sit, hoc calidius. Caeteros etiam planetas aërem suis qualitatibus immutare docet jam *Ptolem.* lib. 11. de indic. astro et ejus comment. *Porphyrius*. Id ipsum stellarum fixarum proprium esse *Hippocrates* demonstravit, dum canis, pleiadum, arcturi ortum et occasum cognosci a medico debere docuit lib. de aër. loc. et aquis, quod ab illis magnae in aëre contingant muta-

ones et alterationes. Exortu enim caniculae quis aequare maria, fluctuare in cellis vina, canes in rabiem i ex *Plinio* cap. 42. lib. 1., quis difficillimas illo tem-
 pore esse purgationes ex *Hippocr.* aph. 5. lib. 4. non
 servavit? Deinde si *Columellae* credimus cap. 2. lib.
 de re rust. Pleiadum occasu tempestates ventique
 quilonii insurgunt, et procellosae grandines Arcturo
 emergente. Denique quis non mirabitur cum *Ruell.*
 2. de nat. stirp. cap. 152. stupendos effectus Aequi-
 noctiorum et Solstitiorum, quorum etiam notas indu-
 ctas significavit natura et eas manibus ipsis Agrico-
 rum ingessit? floret ipso brumali die suspensa in te-
 ss aridis herba pulegii et musculorum jejuscula au-
 untur: Cynocephalum utriusque Aequinoctii tempore
 er horas diei singulas et duabus itidem noctibus uri-
 m profundere notaverunt Aegyptii. Aestivo solsti-
 arthritide tentari corvos obvertique olearum et tilia-
 m folia omnibus est exploratum; haec quidem par-
 astrologicae, partim medicae sunt considerationis.
 ea spectat Astrologus, ut fortunas rerumque even-
 vaticinetur, Medicus, ut temporum aërisque muta-
 nes et ex his nascentes morbos agnoscat. — Fluxum
 mensium inter et strumam singularem adesse harmo-
 am, ex variis patet. Saepe enim struma in foemi-
 mensium difficultate aut suppressione laborantibus
 tur, et menstruatione in ordinem redacta iterum
 paret ²⁷⁰⁾. Saepe autem nullus hujus rei in strumam
 fluxus animadvertitur ²⁷¹⁾. Singularis harmoniae in-
 strumam et menstruationem exemplum narrat Ver-
 in ²⁷²⁾. Foemina notabili infestabatur struma, ex qua
 ximam trahebat difficultatem anxietatemque. Omni-
 s remediis frustra tentatis, apertura in loco tumo-
 eminentiore facta est, ex qua flavus tenuisque liquor

²⁷⁰⁾ *Petit* l. 1. p. 209. ²⁷¹⁾ *Prosser* l. c. p. 41. ²⁷²⁾ *Cfr.*
unct. II. ad *J. Sculteti* armam. chir. L. B. 1695. obs. 18.

emanabat. Reliqua vero tumoris pars nullis absumi poterat remediis. Interea diu post aperturam factam notatu dignum superveniebat phaenomenon. Singuli videlicet mensibus sanguis menstruus non per ordinarias et consuetas vias, sed per hoc foramen, imo per oculos et nares effluebat. —

Homines struma affecti saepe magnam aetatem sine ullo detrimento attingunt, tumor raro augetur, nullas ceteroquin excitat molestias, in carcinoma fere nunquam mutatur ²⁷³⁾, quamquam multi de exitu strumae in gangraenam verba fecerunt, et nonnullis exemplis hanc opinionem firmiorem reddiderunt. ²⁷⁴⁾ Interdum quidem strumam suppuratione esse curatam legimus ²⁷⁵⁾; plura tamen phaenomena ab Assalini collecta et descripta magis in alios tumores, quam in strumam cadunt, et talis exitus tristissimos habuit effectus, saepe ulcus malignum originem duxit et fistulae sunt relictae, omnem curationem oppugnantes, denique etiam Hildanus ²⁷⁶⁾ observavit, tales aegrotos ingenti suppuratione vita esse privatos. —

Cum in omnibus morbis, praecipue in iis, qui partium quarundam formam et structuram destruunt, maximi momenti sit, partes istas incidere, et quas destructiones illi produxerint morbi, scrutari. Qua propter medici celeberrimi, e. g. *Bonnetus*, *Morgagni*, *Hallerus*, aliique, quos superius enumeravi ²⁷⁷⁾, summam in dissecandis strumis operam adhibuerunt, et quae iis invenerint memorabilia, litteris tradiderunt.

²⁷³⁾ Noël l. I. p. 101. — *Callisen* Principia opt. Chirurgiae hospitaliariae, Hafn. 1790. II. p. 107. ²⁷⁴⁾ *Aëtius* Tetr. IV. sermo III. cap. VI. p. 743. ex edit. cit. — *Deidier* des tumeurs c. n. p. 231. — *Mangetti* Biblioth. medic. pract. Tom. I. p. 258. ²⁷⁵⁾ *J. B. Verduc* pathologie de chirurgie p. 145. — *Assalini* Versuch über die Krankheiten des lymph. Syst. a. d. Franz. Dresden 1792. p. 58. ²⁷⁶⁾ *Observ. et epist. chir. med.* Argent. 1771. P. II. p. 579. ²⁷⁷⁾ vid. §. 34 et 55. nost. opusc.

in universum autem partium dissectio nos docuit, alias informes fuisse et rudiores habuisse structuram, alias vero propius ad organicam formam accessisse; commodissimum itaque videtur illas materias, in strumis contentas et inventas, ita esse rependendas, ut a simplicioribus naturae plasticæ productis inciperent et ad easque progredirentur, quae individua organica sensim persistentia referant. Observatores autem affirmant, se mox materiam melli aquaeve similem²⁷⁸⁾, adiposam²⁷⁹⁾, melleam²⁸⁰⁾ et purulentam²⁸¹⁾, tephaceam²⁸²⁾, mox tendines, cartilagineas²⁸³⁾, ossa²⁸⁴⁾ et multa alia et quae incredibilia in iis reperisse²⁸⁵⁾. Ex his repertis causam, olim continentem strumarum, deducendam esse testati sunt, simulque dixerunt, causam nullam esse posse, quam particulas viscidas, tartareas, terrestres, salinoacidas, similesve spissiores²⁸⁶⁾; quae eadem mediante circulatione a massa sanguinea vel pro impuro et gelatinoso deponuntur continuo ac reperiuntur; ita successive substantia glandularum exundatur a materia sic dicta peccante illa copiosiori,

278) *Paul. Aegineta* de re med. lib. VI. cap. XXXV. p. 564. — *Aëtius* Tetr. IV. sermo III. cap. VI. p. 743. — *Celsus* lib. VII. cap. XIII. p. H. A. B. ex edit. cit. 279) *Paul. Aegineta* de re med. lib. VI. eod. cap. et pag. ead. *Aëtius* l. m. c. 280) *Aëtius* l. m. 281) vid. §. 34 et 35. 282) vid. §. 34 et 35. 283) vid. §. 34 et 35. 284) *Celsus* lib. VII. cap. XIII. „interdum etiam, inquit, minutis ossibus pili immisti.“ 285) Complura, quae tutis firmisque adminiculis innixa protulimus, etiam *Pauli a Nicæa* testimonio confirmantur, qui ita scriptum reliquit: „διαφυξαι εἰσιν πλείσται. αἱ μὲν γὰρ αὐτῶν εἰσι ξηραὶ, αἱ δὲ ὑγრაὶ, αἱ δὲ πιώδεις, αἱ δὲ σαρκώδεις καὶ αἱ μὲν μετὰ ἀλοθῆσεως.“ Sic *Celsus* lib. VII. cap. XIII. modo caro hebes etc. 286) *Galenus* 14. method. med. cap. 11. *Paulus a Nicæa* hanc quoque sententiam ad finem capituli illius amplexus est, ubi scripsit haec verba: „πάσαι μὲν οὖν ἀπὸ παχῶν καὶ γλισχρῶν χυμῶν ἐπερφευσάντων συνίστανται καὶ φύονται.“

usque dum monstrosus ejusmodi tumor evadat, qui si inveteratus tandem adeo pertinax esse solet, ut omne medicorum studium et operam eludat, nec sine vitae periculo radicitus curari queat. Et fere omnes opiniones de causa strumarum ex pathologia humoralis ortae eandem habent indolem. — Hoc vero infra nobis ulterius examinandum reservamus. Strumae multis in regionibus endemiae reperiuntur, quibusdam tam crebrae observantur, ut ne unus quidem incolarum a malo liberatus inveniatur. In hisce regionibus praecipue nominandae sunt variae Helvetiae²⁸⁷⁾ partes, valles imprimis Alpium altissimae (les vallées subsubalpines, Fod.) montibus saxisque praecipitissimis undique circumdatae. Insignis ibi esse videtur nexus inter strumam et singularem illam corporis habitudinem, quam Crétinage vocant. Valles quoque montium Pyrenaeorum, quaeque Galliam inter ac Italiam sitae, strumosos incolas alunt²⁸⁸⁾; sic etiam comitatus Tirolensis. Sed et in aliis adhuc regionibus struma endemia observatur, uti e. g. in variis Italiae²⁸⁹⁾, Galliae²⁹⁰⁾ atque Hispaniae²⁹¹⁾ regionibus, in Anglicana provincia Der-

287) *Juvenalis* l. c. et *Vitruvius* primi sunt auctores: *Vitruvius* ita scriptum reliquit: „Praesertim apud Aquicolas Italiae, et Medullas Alpinos strumae inveniuntur.“ vid. etiam perill. *de Haller* opusc. pathol. Laus. 1755., qui et Gottingae frequentes esse strumas asserit. — *Scheuchzer* tertiam incolarum Vallesiae partem ingentes in collo tumores gestare narrat, vid. ejusd. *Naturgeschichte des Schweizerl.* Turin 1752. P. II. p. 325. 288) narrat *Bordeu* in *Prix de l'academie de Chir.* Tom. III. p. 71. sq. 289) Agri Bergamensis feminas glandulae thyreoideae tumoribus infestari refert *Sauvages* N. M. T. II. P. I. p. 57. Ducatus Mediolanensis ac Augustani incolas huic malo aeque obnoxios esse refert *Keyszler* in itinerrario Hannov. 1751. ed. P. I. p. 291. et 240. Sabaudis quoque solennes esse testatur *Dionis*, vid. *de la Foye* notes ad *Dionis* Cours d'operat. pag. 639. 290) *Girard* l. l. p. 412. 291) *Laurentius* refert: „Singulis annis plus quam quingentos ex Hispania ad Galliae Regem acce-

beshire ²⁹²), in Carinthia ²⁹³), Styria, Carniola ²⁹⁴), Hungaria ²⁹⁵), Bohemia ²⁹⁶), Thuringia ²⁹⁷), nec non in Westphaliae montosis et in variis Hercyniae regionibus; ex hisce praecipue pagus, Laerbach, praecellit, cujus situs et clima plane descriptioni illi adaequat, quam *Foderé* de vallibus subsubalpinis dedit; sic strumae frequentissime et fere endemice occurrunt in quibusdam Saxoniae provinciis, Freybergae ²⁹⁸), Dresdae, sic porro Berolini et Petropoli. ²⁹⁹) Maximae autem strumae in siberica regione Kireng ³⁰⁰) reperiri dicuntur. Nec in aliis extra Europam regionibus desiderantur ³⁰¹). Contra aliis provinciis strumae perrarae sunt. Ita *Cl. Willich* in Insula Rügen in numero 25595. encolarum unam tantummodo foeminam et virginem struma laborantes se invenisse dicit: foemina illa praeterea peregrina fuit. ³⁰²)

A struma ipsa verum differunt varii in hac regione

dere, sanitatis remedium exposcentes, lib. II. c. XI. p. 208. ²⁹²) in comitatu Darbiensi feminas praecipue tumoribus colli strumosis infestari, narrat *Prosser* l. c. p. 39. vid. etiam ill. *Richteri* chir. Bibl. vol. I. P. I. p. 168. *Mead.* mon. med. c. XV. p. 521. seq. ²⁹³) *Ed. Brown* a brief account of some travels in divers parts of Europe. London 1685. p. 77. ²⁹⁴) *v. Swieten* Comment. Tom. II. p. 632. ²⁹⁵) inprimis montium incolae prope Schemnitium. vid. *Keyzler* itinerar. Hannov. 1741. P. II. p. 1024. ²⁹⁶) *Leonhard Ludwig Fincke* Versuch einer allgem. medicinisch-praktischen Geographie 3ter Bd. p. 478. Leipzig 1795. ²⁹⁷) *Willich* in Ill. *Baldinger's* neuem Magazin VII. Bd. p. 114. ²⁹⁸) *Iphofen* l. c. p. 31. aliisque adhuc locis. ²⁹⁹) *L. Formey* Bemerkungen über den Kropf und Nachricht über ein dagegen neu entdecktes wirksames Mittel; Berlin 1820. p. 8. ³⁰⁰) *Gmelin's* Reise durch Siberien; 2 Thl. p. 282. — *Girard* l. l. p. 410. ³⁰¹) e. g. in Jamaica, aliisque Americae provinciis. vid. *Russell* diss. de tabe glandul. Lond. 1750. Hist. 39. p. 133. et obs. et disq. med. lond. Vol. II. p. 232. v. g. ³⁰²) Vid. *Baldinger's* neues Magazin VII. Bd. p. 114.

observati tumores, qui vel in tela cellulosa, vel in glandulis conglobatis hic sitis, vel in vasis majoribus sanguiferis proximis, vel in pharynge, vel in aspera arteria et larynge locum habere possunt; pertinent nempe huc:

§. 42.

1) Tumores cystici et quidem, ut plurimum, melicerides, qui hic, uti ubique, sub cute in tela cellulosa generari possunt. — Jam ab antiquissimis temporibus struma cum tumore cystico commixta est, et omnia phaenomena in tumore cystico conspicua et ab auctoribus medicis collecta ad strumam quoque redundant, nec minus eadem medicamina in struma, uti in tumore cystico, laudata et adhibita sunt. Interea nullum adest dubium, quin signa atque phaenomena eaque per multa adsint in tumore cystico, quae etiam in struma deprehenduntur, praecipue quoad locum, quem occupat, quoad materiam in iis refertam, quoad denique signa concomitantia multa habent inter se similia, et si ad magnitudinem spectes, observabis magnos, qui late sese extendant, et inde simul cervicem cum nuca occupent, imo ad mammas usque procedant ³⁰³). Chirurgus tamen exercitatus et circumspectus signa nonnulla detegere potest, quibus una morbi forma ab alia accurate separatur et distinguitur, et haec sunt sequentia:

a) Forma tumoris cystici magis est rotunda et aequalis, strumae autem lata et inaequalis.

b) Tumores cystici cognoscuntur ex situ immediate sub cute, cui adhaerent, ex mobilitate, fluctuatione, et quod circumscripti sint et in ingentem quandoque magnitudinem increscant.

303) *Garengeot chirurg. Tom. II. pag. 401. — Bernh. Gottl. Schreger's chir. Versuche, 1ster Bd. p. 310. Nürnberg 1811.*

c) Hi frequenter radice quadam gaudent, qua cum his partibus alligantur ³⁰⁴), strūma autem fundum noscit latum et tota basi adhaeret.

d) Tumores cystici frequentissime in interstitiis musculorum, in tunicis aponeuroticis et folliculis sebaceis generantur.

e) In media tumoris cystici inveterati parte rubor ne dolore et reliquis inflammationis signis persentire, in struma nunquam.

f) Inflammatio et suppuratio tumores cysticos saepe invadit, strumam raro.

g) Nunquam in glandula thyreoidea tumor cysticus observatur, sedes autem strumae una est glandula thyreoidea.

h) Tumores cystici plerumque ex metastasi ³⁰⁵), suppressione haemorrhagiae habitualis ³⁰⁶), ex crisi retro pulsus exanthematibus originem ducunt, struma rarissime.

i) Tumores cystici frequenter in scrophulosis, arthriticis et syphiliticis subjectis deprehenduntur, strumae autem magis in hominibus sanis et bene nutritis occurrit, et alias causas agnoscunt, quare *Stoll* strumae diagnosin requirit, ut homo sit ceterum sanus. —

§. 43.

2) Tumor glandularum conglobatarum ante superiorem partem asperae arteriae et laryngem circa glandulam thyreoideam jacentium; in morbo nempe scrophuloso glandulae hae insigniter intumescere possunt, quae ita ab Antiquis inepte sic dictam strumam for-

³⁰⁴) *Heister* l. c. pag. 446. ³⁰⁵) *Reichel* de tumoribus tunicatis post cephalalgiam exortis, Lips. 1765. ³⁰⁶) *Triller* de tumoribus singularibus a mensium suppressione ortis, Viteb. 1785.

mare, qui vero tumor licet sedem et figuram interdum strumae verae habeat, ab ipsa tamen eo dignoscitur.

a) Quod sit inaequalis ex pluribus diversis et initio sejunctis globosis tuberculis conflatus.

b) Quod tumores hi immediate sub cute jaceant et super glandulam thyreoideam, quae profundius jacet, saltem initio morbi sint mobiles.

c) Quod scrofulae vel lymphaticarum glandularum tumores simul plures in collo appareant.

d) Quod et cetera cacoehymiae scrofulosae signa, ut labium superius tumens, alae nasi tumidae etc. eo observentur, cum contra in vera struma scrofulosi vitii signa plane deficere soleant; nunquam enim struma cum ista sic dicta cachexia conjuncta est, quae scrofulas semper comitatur, struma est morbus localis, nullum alium progignens.

e) Struma saepius cum imbecillitate mentis procedit, scrofulae saepe cum acutiae ingenii incedunt.

f) Struma morbus unius glandulae, scrofulae viciissitudo totius systematis lymphatici.

g) In pubertate tolluntur scrofulae, minime autem strumae.

h) Redeunt interdum in senibus scrofulae, minime autem strumae.

i) Scrophulae saepe suppurant, struma raro.

k) Struma fere semper ex causis accidentalibus ortum ducit, quod praecipue in struma sporadica fit, scrofulis nunquam observatur.

§. 44.

3) Aneurysmata carotidum, rarius quidem, attamen interdum observata orta esse dicuntur a nisu vehementi, tussi, risu et vomitu, et cognoscuntur e sede in regione carotidis, mollitie, facili compressione, pulsatione ceterisque aneurysmatum signis.

§. 45.

4) Alia, magno quoque momento digna, superest differentia nostri morbi a scirrho. Jam ex longo tempore omnes fere, certe plurimos tumores colli cum scirrho comparati sunt, et fere omnia rerum medicarum compendia naturam strumae in induratione glandulae thyreoideae posuerunt; et quia omnino inter symptomata quaedam cum scirrho conjuncta sunt, quae etiam in struma adesse solent, tumores colli in benignos et malignos diviserunt. Benignae indolis ex eorum sententia sunt ii, qui penitus dolore carent, et colorem nonnihil rubescentem aut naturali cutis colori perfecte similem obtinent; ad benignos tumores strumam recens ortam retulerunt. Magni tumores omnes scirrhusi et canerosi erant, qui non modo periculosam prae se ferunt indolem, verum exitiosa quoque symptomata habent conjuncta et ad summum egros perducunt vitae discrimen; sub maligno veteres strumam inveteratam (*Trachelophyma*, *sarcoma agarii*) intellexerunt. Sed haec divisio, cum a rebus fortuitis, non perpetuis sit repetita, non laudanda esse videtur.

Translatio notionis scirrhi ad strumam a natura scirrhi, quam veteres sibi formarunt, derivanda est, qua quaelibet glandula indurata nomine scirrhi insigniatur. *Sprengelius* ³⁰⁷⁾ tumorem glandulae conglomeratae et *Richterus* ³⁰⁸⁾ indurationem permagnam in qualibet parte occurrentem scirrhum nuncupat. Cum autem notio scirrhi adhuc incerta sit, et signa et phaenomena valde dubia et infirma deprehendantur, necesse est, ut, quantum fieri possit, signa characteristica nonnulla, eaque graviora proferamus, quibus haecce differentia nititur.

307) Handbuch der Pathologie. II. Bd. §. 338. 308) Chirurgie I. Bd. §. 426.

a) Scirrhus quam maxime aetatem senilem arripit, raro juvenilem, nunquam autem infantes. Juvenes et infantes frequentissime strumae expositi sunt.

b) Scirrhus, si per aliquod temporis spatium duraverit, in toto organismo signa et phaenomena valetudinis adversae efficit; minime autem struma, quae in robustis non solum et bene nutritis subjectis oritur, verum etiam neque debilitatem neque cachexiam sic dictam excitat.

c) Scirrhus magna, interdum lapidea propemodum duritie gaudet, struma non.

d) Scirrhus saepe inflammationem excipit, struma sponte oritur.

e) Cum scirrho glandulae thyreoideae volumen imminuitur, in struma augetur.

f) In scirrho inveterato nonnunquam dolores persentiuntur pungentes, in struma nulli.

g) Scirrhus nullis medicamentis resolvi et curari potest, et extirpatione peracta saepe redit, struma autem, certe ab initio, remediis externis et internis tollitur.

Haec sunt gravissima signa, quorum auxilio unus morbus ab altero recte riteque secerni potest, leviora autem et vix notatu digna ita sunt comparata, ut statim in oculos incurrant.

§. 46.

5) Pharyngocele vel saccus, quem pharynx format, propter extensionem a coarctatione in loco quodam oesophagi inferiore scirrhusa vel ab inepta et violenta constrictione fasciae collaris natam ³⁰⁹⁾, etiam a corpore deglutito et ob volumen in oesophago retento, observata est, dum interim aeger continuo vorando famem sedare tentat, cibus vero deglutitus descendere

309) *Baldinger's N. Magazin*, l. c.

quit, ubi tunc gula supra locum angustatum, cibo primis solidiore repleta, extenditur; quae extensio iam dein, obstaculo remoto, remanet. Malum hoc agnoscitur, quod tumor adsit, ut plurimum tantum in eo latere inter laryngem et colli vertebrae, mollis, qui sub devoratione ciborum insigniter increscit, deinde sub ruminationis specie sensim imminuitur, per alternam quoque compressionem disparet, qua inter cibum contenti per vomitus speciem expelluntur.

§. 47.

6) Bronchocele, potius tracheocèle dicenda, est operae arteriae hernia, quando nempe vel interna huius canalisis tunica inter annulos duos cartilagineos antea inter laryngis cartilagineas propulsa et pro tempore quasi incarcerata saccum et speciem herniam facit ³¹⁰), vel quando ex membrana tracheae disrupta aëris fit infiltratio in glandulam thyreoideam et telam cellulosa adjacentem; tumores huius ab ingenti nisu, qualis sub irritatione vel elevatione aut portatione magni ponderis et sub retentione spiritus violenta fieri solet, item sternutatione, cachinno, tussi vehementi et vomitu fieri possunt, et cognoscuntur ex eo:

a) Quod tumor ab initio parvus, sensim incrementum, sit elasticus, saltem mollis et qui facile comprimitur, sine fluctuatione.

b) Quod sub expiratione augeatur et imprimis repleto spiritu incrementum soleat; sub inspiratione vero decreascit, imo si levis sit, dispareat, et sub hoc incrementum aut decrementum singularem sonitum reddere soleat ³¹¹), quae quidem symptomata facile ex eo excutuntur, quod inter saccum hunc et tracheam satis libera sit communicatio, adeoque et aëris liber motus.

³¹⁰) Girard Lupiologie p. 706. ³¹¹) Cohlus l. c. cap. XXI. §. 3. et 5. et Neues Magazin für Aerzte III. B. 5. St. p. 241.

Interdum vero hoc commercium non ita liberum esse vel deficere videtur, probabiliter propter parvum ex trachea ad saccum ducens ostiolum, ubi tunc tumor non ita sub inspiratione minuitur, neque sine dolore comprimi potest.

c) Quod tempore aestivo respirationem gravet ob aëris purioris et frigidioris defectum; aër enim, qui in sacco mora incaluit, sub sequenti demum inspiratione aëri atmosphaerico mixtus in pulmonem transit; hinc hyeme aegri liberius respirant et hilariores sunt.

d) Quod bronchocele semper cito et ex causis mechanicis originem suam ducat, v. c. ex risu immoderato ³¹²⁾, rixa, loquela, a conatibus ad coitum vel ad partum, a summis animi motibus, ab elevatione ponderum. Ratione partus helveticae foeminae magis quam viri, et canes femellae, quam mares bronchocele laborant, sic et Sabaudae foeminae. ³¹³⁾.

Nonnunquam saccus aëre plenus in partu disrumpitur, aër uno vel altero modo vias sibi parat, quibus glandulam thyreoideam intrat. Haec eo distentitur, interstitiis inde ortis, lympa extravasatur, quae magis accumulatur et sensim strumam producit ex tumore, qui antea emphysematosus tantummodo fuit et *Plenkius* dicit: „bronchocele est fere semper aliarum strumarum origo.“ ³¹⁴⁾ *Hallerus* inquit: „frequenter

³¹²⁾ *Douglas* in phil. transact. n. 305. ³¹³⁾ Conante profecto omnimode foemina ad foetus expulsionem, abdomen coarctatur et respiratio sustinetur; sanguis exinde ad partes superiores defertur, easque magna vi invadit; collum itaque intumescit, venarum tumor et faciei rubor arteriae et venae rupturam minitant. Obstetrices in nonnullis regionibus, quae parturientem foeminam postquam in sella partui dicata posuerint, sudariolis linteis collo ter quaterque circumligatis arctatisque, bronchocelelen impediunt; nonnunquam autem apoplexiam et pneumoniam promovent; *Gautieri* l. c. p. 145. ³¹⁴⁾ Novum systema tumorum. Part. I. p. 203.

mores aëreos in glandula thyreoidea a rixu partu-
 entium oriri, qui telam cellulosa distendant, mani-
 festo argumento, vias esse ex arteria aspera, per quas
 in glandulam thyreoideam exeat.“ ³¹⁵⁾ *Bordeu* plu-
 res vidit gutturosos, ceterum sanos, qui cum struma
 supurationem abiret, materiam purulentam ex-
 creabant et tumor inde diminuebatur. ³¹⁶⁾ Observante
Alouette ³¹⁷⁾ struma incisione post mortem patientis
 seminae aperta, nil nisi flatum emisit, et statim po-
 stea collapsa penitus propemodum disparuit. *Foderé*
 saepius talem infiltrationem aëris observavit, indeque
 dispositionem ad strumam posse oriri affirmavit. ³¹⁸⁾
Elis Platerus ³¹⁹⁾ primus eorum videtur, qui strumas
 hac causa duceret, et multi ejus opinionem secuti
 sunt. Constat itaque observationibus *Waltheri*, *Mor-*
gagni, *l'Alouette* ³²⁰⁾ aliorumque virorum clarissi-
 morum aëris infiltrationem in glandulam thyreoideam
 fieri posse et huncce morbum bronchocelen esse appel-
 landum. Nominavit hanc *Platerus* herniam colli em-
 physematicam, *Sagar* Trachelophyma ventosum.

Medicus anglicus *Smith* ³²¹⁾ bronchocelen pro col-
 lectione aquosae materiae habet, nec minus *Halle-*
us ³²²⁾ et *Morgagni* ³²³⁾ hydatides invenerunt, qua-
 rum rudimenta vasorum lymphaticorum varices vel
 cisti habenda sunt. Commemorat etiam Trachelophy-
 ma aquosum *Sagarius* ³²⁴⁾. Ita extensione vesicula
 nascitur inter duas rami lymphatici valvulas, quae cum
 aliquo systemate resorbente per canalem angustiore

³¹⁵⁾ Elem. physiol. Tom. III. p. 398. ³¹⁶⁾ l. c. pag. 152. ³¹⁷⁾
 Auserslesene von einigen Gelehrten an die Königl. Acad. der
 Wissensch. zu Paris eingeschickte und von *Beer* herausgegebene
 Abhdl. 2 Th. pag. 228. ³¹⁸⁾ l. c. p. 33. ³¹⁹⁾ Prax. med.
 Tom. III. Basil. 1625. p. 238. ³²⁰⁾ l. l. p. 159. ³²¹⁾ Sy-
 stem of physic. Lond. 1768. p. 339. ³²²⁾ Observ. 8. ³²³⁾
 De sede et caus. morb. Lib. IV. epist. 50. art. 32. 33. ³²⁴⁾
 l. c.

cohaeret. In hac vesicula primum extensione mere mechanica nata novae vegetationis existit officina. Sed ex signis a nobis prolatis struma satis superque a bronchocele et collectione aquosa dignosci potest.

Alii etiam bronchocelen menstruaalem adoptarunt ³²⁵), eamque tumorem glandulae thyreoideae ex vasorum sanguiferorum extensione ortum et in fluxu menstruo incipiente, irregulari, suppresso, aut denique in graviditate occurrentem appellarunt. In hac vero descriptione nulla strumae signa characteristica adsunt, et tota affectio glandulae thyreoideae nihil aliud est, quam congestio sanguinis ex consensu harum partium excitata.

Bronchocele cellularis ³²⁶), sive struma fungosa Callisenii, in glandula thyreoidea non est quaerenda, quae potius ex telae cellulosa induratione in circumferentia glandulae thyreoideae posita est petenda. Hic tumor vel in una tantummodo vel in tota anteriore colli parte conspicuus, mollis est et comprimendus, non fluctuans; in decursu autem firmus, elasticus, non circumscriptus; cutis externa vasis abundat varicosis, adest etiam respiratio anxiosa, vertigo, susurrus aurium et alia signa, quae habent cum struma similitudinem; quoad vero sedem et naturam dissimilitudinem permagnam.

Ex variis in struma contentis *Sagar*, *Sauvages*, *Plenkii* alique bronchocelen steatomatosam, sarcoiticam, et calcaream appellarunt. Sed haec differentia, cum de uno momento sumta sit, haudquaquam ex omnibus partibus absoluta videtur. Hae igitur species strumis sunt adnumerandae.

³²⁵) Schmalz l. c. ³²⁶) Schmalz. l. c. c. 48.

CAPUT II.

A e t i o l o g i a.

*Neque enim numerandae sunt, sed perpendendae....
observationes.*

(MORGAGNI, Epist. 51. n. 47.)

De morborum glandulae thyreoideae
causis.

§. 48.

Expositis hucusque signis morborum glandulae thyreoideae characteristicis, causae, quibus illi producantur, inquirendae sunt. In qua autem indagatione ante omnia momenta exponi debent, quae ad morbos glandulae thyreoideae disponere, vel ortus illorum occasionem praebere, observatio docet. *Causae* glandulae thyreoideae morbiferae sunt vel *praedisponentes*, vel *occasionales*.

a) *Causae praedisponentes.*

a) *nulla vitae humanae periodus a morbo glandulae thyreoideae immunem reddit, sed quavis aetatem, uti utrumque sexum his morbis obnoxium esse experti scimus; differunt tamen hi morbi ratione aetatis, generis, constitutionis, structurae atque situs glandulae ipsius. In aetate enim infantili, in qua san- guis majore quantitate prius internas, dein externas corporis partes petit, obruitque, glandula thyreoidea magis expanditur, contra autem senium magis obdu-*

rationes scirrhasas, ossificationes concrementaue terrea producit.

β) *sexus et constitutio*. Constitutio corporis debilis, fibraque laxa morbis glandulae thyreoideae praecipue favere videntur.³²⁷⁾ Raro hi in hominibus animadvertuntur, quibus fibra est rigida, cutis fusca, sicca, capilli nigri. Fortasse in illis topica adhuc glandulae thyreoideae dispositio adest, atonia³²⁸⁾ fortasse, quae lymphae haesitationi, partium terrearum depositioni, et obstructionibus occasionem praebet. Haec etiam praecipua esse videtur causa, cur feminae magis quam viri iis sint obnoxiae³²⁹⁾, quarum fibrae in genere laxiores, et glandula ipsa in statu naturali mollior et major, quam in viris invenitur.³³⁰⁾ Praeterea feminae adhuc peculiaribus obnoxiae sunt mutationibus, quae morbum per se jam producere possunt: sic struma ex graviditate ortum ducere videtur; *Roncali*³³¹⁾ et *Girard*³³²⁾ causam ex crebrioribus sub graviditate vomitionibus ducunt; *Foderé* autem eam in impedimento quaerit, quod respirationi ex uteri mole paratur³³³⁾; sic fluxus menstrui vitia saepe morbum

327) Noël l. c. p. 101. 328) In dem Anhange zu *White's* Werke über Scropheln und Kröpfe sagt der Übersetzer: „Ich denke mir zur Grundursache der Kröpfe Atonie in der Schilddrüse. Verschiedene andere Schriftsteller haben eben so geurtheilt, und *Paussure*, in Hinsicht auf die allgemeine Schlassheit in allen Theilen des Cretinen, leitete die Ursache ihrer Kröpfe ebenfalls davon her. So auch *Hausleutner*: „die Ursachen des Kropfes sind dunkel. Eine der ersten ist ohnstreitig die eigene Disposition der Schilddrüse, wahrscheinlich ist sie in einer gewissen Atonie dieser Drüse begründet etc.“ Ebenfalls *Iphofen* l. c. p. 20 — 26. §. 31 — 42. 329) *Prosser* l. l. p. 40. M. P. M. Précis der Chir. pract. p. 568. 330) *Barbett*. chirurg. part. 3. l. 2. c. 3. p. 352. 331) L. c. p. 229. 332) l. l. p. 414. 333) Siehe auch *Hufeland's* und *Osann's* Bibliothek der pract. Heilkunde, 8tes Stück, August, Berlin 1820. p. 116., wo in der Critik über *John Burn's* Grundsätze der Geburtshülfe, in

efficiunt. Plerumque struma in puellis pubertatis tempore oritur, et praecipue, si menses cum difficultate erumpunt. Suppressiones fluxus menstrui saepe eundem habent effectum, tumor tamen plerumque iterum disparet, menstruis in naturalem ordinem redactis³³⁴); in iis etiam feminis, qui utero nunquam gestarunt, aut in coelibatu vivunt, frequentius occurrunt Ill. *Claro auctore* in quaestionibus de partibus pseudorganicis actione organismi morbosa natis. Lipsiae 1805. Sic denique ab impedita se — et excretionem lactis in sexu sequiori saepenumero strumas oriri, observationes docent: v. M. N. C. Dec. II. a. 6. app. obs. V. p. 10. cf. *Fordyce* in Med. Obs. and inq. Vol. I. p. 171. V. G. et *Raulin* in lib. ex gall. serm. vers. Krankheiten der Sechswöchn. p. 288.

γ) *Structura*. Debilis glandulae thyreoideae tela cellulosa, qua circumdata est, tumores cysticos procreare, receptaculumque corporum alienorum esse videtur; non minus multa magnaue vasa sanguifera facile inflammationem, anevrismata excitare valent. Succus huic inhaerens facili modo inspissatur, sicque concrementorum alienorum occasionem praebere potest. Caeterum glandula thyreoidea per situm et connexum cum larynge, arteria aspera, vasis nervisque in consensum trahitur, morboseque afficitur.

β) *Causae occasionales*. Recensita hactenus momenta tantummodo valent, ut glandula thyreoidea ad morbos praedispone possit. Nihilo tamen secius salvo glandulae vasorumque statu in sua functione non detinentur, nisi aliae potentiae nocivae occasione illata vim

d. Engl. übers. von Dr. E. H. C. Kölpin, Stettin 1820. erwähnt wird, daß diese Geschwulst nach Entbindungen in England häufiger einzutreten pflegt, als bey uns. 334) *Prosser* l. I. p. 41. *Chopart* et *Desault* l. c. p. 249. — *Petit* l. m. p. 208. seqq. — *Noël* l. c. p. 102. *Consbruch* l. I. p. 83.

suam exerceant. In quarum autem numero praecipue ponendae sunt:

a) *Atmosphaera*. Atmosphaerae istarum regionum, quae morborum glandulae thyreoideae ortui favent, character proprius humiditas est, quacum magnus conjunctus est calor a solarium radiorum percussu ex saxis valles circumdantibus prolatus. Talis autem atmosphaera corpora, imprimisque eorum superficiem et partes externis potentiis praecipue expositas, quibus glandula thyreoidea etiam adnumeranda est, debilitare dicitur. Equidem stagnans, crassus, et nebulosus aër, qualis in quibusdam regionibus, aequae ac in vallibus, altis montibus circumseptis, deprehenditur, non solidorum modo justum elaterem infrangit, sed transpirabili etiam materia absorbenda ineptus est; unde vi torpente vitali, retentisque particulis excrementitiis fieri non potest, quin sanguis et omnes ex eo deducti humores depraventur, atque varii generis obstructions producantur. Aër quoque frigidus, qualis in montibus noctu existit, itemque exhalationibus acidis refertus³³⁵⁾ strumarum generationi favere creditur. Singularis est observatio, quam *D. Bordeu* proferit, quaeque aëris respectu strumarum potentiam luculenter demonstrare videtur, quamvis ejus causam eruere difficile sit. Animadvertit nempe is, in quibusdam vallibus medio flumine divisus unius lateris incolas boreae expositos strumis infestari, cum e contrario alterius lateris incolae, utpote meridiem versus et orien-

335) in altis majorem quam in humilioribus locis acidi copiam aërem continere, auctor est *Bordeu*, quod ex viridiore florum, quae in montibus crescunt, colore, atque ex crusta salina rupes contegente colligit; idque eo magis humano corpori nocere credit, quoniam exhalationibus animalium haud involutum atque mitigatum sit, vid. *Prix de l'acad. de Chir.* l. c. p. 56.

tem siti, ab hoc malo immunes sint; quamquam utrique eodem victu ac vitae genere utantur. ³³⁶⁾

β) Diaeta prava, abusus alimentorum, quibus humoris tenacitas producit. ³³⁷⁾ Quid enim cibi et potus sive quantitate sive qualitate peccantes conferant, passim testantur auctores. Voracitas ac bibacitas digestionem omnino difficilem efficiunt, unde non pauca crudiatum quantitas colligitur, quae chylo admiscetur, si tandem resoluta quodammodo fuerit, atque ita cacochymiam pituitosam procreant. Hanc ob causam sues hoc malo frequenter corripitur dicuntur. Imo *Galenus* lib. de morb. differentiis ob hanc ipsam causam in quodam strumam observavit, et crescenti aetati ob nimiam saepe voracitatem strumas exoriri omnes auctores testantur. Quaecunque chylum crassum et viscidum reddunt, ut lacticinia ac mucilaginosa, apta nata sunt, ut huc trahantur. Huc spectant, quae de potu copiosiori et intempestivo a coena *Rasaeus* 7. ad Almansonem c. 8. advertit, quo peponum quandoque magnitudine strumas et bronchoceles excrescere aiebat. vid. *Georg. Hieron. Velchium* in dissert. de aegagropolis. Sic *Bünsgensium* diaeta merito depravata dicenda strumis sane haud exiguum dat incrementum, imo ortum ipsum; namque cibis vescuntur disceptis potissimum v. g. caseosis, farinaceis, pinguibus et quae alia huius generis appetunt alimenta. Parant nimirum ex farina cum axungia vel butyro igne liquefacto pulvem ipsis *Sterz* nominatam, vel globulos ex farina et affusa aqua formant, eosque axungiae calefactae immergunt, quos dein *Nudeln* appellant, haec et similia fercula ipsis exoptatissima quotidie fere assumunt cum hilaritate quadam non vulgari, unde apud eos tritum est:

³³⁶⁾ ibid. p. 72. ³³⁷⁾ *Deidier* des tumeurs c. n. p. 230. *Noël* l. 1. p. 101. *Burmans* Wundarzney. I. Th. cap. 42. *Lange* in *Richter's Chirurg. Bibl.* VIII. Bd. 3. St.

„Nudeln und Sterz, freu dich mein Herz.“ Imo famulantes servitium vix ac ne vix quidem subeunt, nisi per septimanam cibos hos aliquoties accipiant. Omnibus vero in universum commune esse solet, ut qualibet die saturni placentas in sartagine frixas, dictas Pfannkuchen comedant, et hoc quidem ex superstitione illis admodum familiari; hinc strumas augeri vel etiam produci eo luculentius constat, cum farina praesertim secundaria seu crudior et furfuracea lympham copiosam eamque viscidam generet; et ita materiam det non ineptam, quae his concrescentiis optime praestat. —

γ) *Refrigeria colli*, potus aquae frigidae ³³⁸⁾ et denudatio colli hyemali tempore; quam immediatam lymphae in glandula thyreoidea coagulationis causam esse quidam volunt. ³³⁹⁾

δ) *Nisus vehementes colli* laryngis praecipue tracheae et pulmonum, gestatio ponderum in capite et transportatio eorum per montes ³⁴⁰⁾, risus ingens ³⁴¹⁾, clamores praecipue sub partus laboribus et resupinationes colli. ³⁴²⁾

338) *P. Forest* Obs. chir. de tumor. pr. natur. p. 102. — *Freind* history of physick Lond. 1726. Tom. II. p. 146. Sic sexus femineus, qui magis communiter his tumoribus est expositus, has partes inter labores domesticos ipsosque sudores prae aliis partibus glandulosis inconsiderate consuevit denudare: inde transpiratio libera et lymphae circulus facile impediuntur. ³³⁹⁾ *Fr. Hoffmann* de morbis certis regionibus et populis propriis: vid. Op. omn. Tom. VI. p. 202. *Boneti* sepulchret. an. p. 262. — *Astruc* l. l. p. 187. *Hufeland's* neueste Annalen der französischen Arzneik. und Wundarzn. I. Bd. Leipz. 1791. p. 340. ³⁴⁰⁾ *Theden's* neue Bemerk. Tom. II. p. 108. ³⁴¹⁾ *Riedlini* lineae medicae Ann. II. Aug. Vind. 1696. p. 356. ³⁴²⁾ Quemadmodum enim hic praeter vitae discrimen alia etiam incommoda affert, et saepe ex magno conatu peritonaeum rumpitur, ac hernia fit, aut rumpitur vena pectoris, unde phthisis, de quibus consulatur *Rod. a Castro* de morb. mulier. lib. 4. p. 459.

ε) *Vestes* collum glandulamque thyreoideam nimis prementes a multis auctoribus morborum hujus organi causis adnumerantur. His adjungi debent plagae, percussiones ac compressiones fortiores.

ξ) Non minus *quies corporis nimia* et vita sedentaria atque otium humores corporis torpidos reddunt, atque efficiunt, ut motus sanguinis intrinsecus et progressivus inhibeatur, et transpiratio libera sufflaminetur. Inde vero partes inutiles in corpore cumulantur, et lymphæ quoque impura evadit, quæ ad motum minus idonea, promptius in vasis capillaribus subsistit, atque sic etiam sensu physico valet illud: „Otia dant vitia.“ Excreta quoque et retenta, si consuetum morem non servant, et potissimum in sexu potiori hæmorrhoides, si in adsuetis sunt obstructæ, satis multum contribuunt ad strumam procreandam. —

η) Inter causas porro occasionales nulla magis frequens existit, quam *plethora*. In junioribus enim subjectis, dum crescunt, abundantia humorum nunquam non invenitur, quæ si naturæ gravis fit, non raro in glandula thyreoidea deponit id, quod moleste superfluum, quo decubitu struma postea exsurgit. Et quoniam natura, si semel atque iterum locum aliquem

ita a nimia, necessaria tamen spiritus cohibitione, colli in magno conatu inflatione, distensione, et nisi obstetrix vel adstantes id impendant, capitis versus tergora vehèmenti reclinatione, facile strumis fores et fenestræ aperiuntur, imprimis cum ob circulationem brevem, quæ per pulmones fit, tunc temporis non recte procedentem, humores ad stagnationem invitentur. *Verduc* pathol. de Chirurgie p. 307. Praecipue huc quoque referenda videtur nociva illa consuetudo matrum et nutricum, infantes ita portandi, ut caput resupinetur, anterioresque colli partes admodum extendantur. — *M. Bronzet*, essai sur l'éducation médicale des enfans. Paris. 1754. Tom. II. p. 272., *Winckler* in *Hufeland's Journal der pr. Arzu*. VIII. Bd. 5tes Stück p. 184.

elegerit, quo redundantiam deponit, facile conamen suum repetit, jam cognoscere poterimus, qui fiat, quosdam ex junioribus longe crebrius et diutius hoc affectu colluctari, quam alii. Praeterea quia glandula thyreoidea tonum legitimum hac stagnatione, accumulatione humorum magis, magisque amittit, aptior inde redditur levi etiam abundantia in corpore nascente ad liquaminis supervacanei receptionem. —

§) Nec *animi pathemata* omni culpa carent: Sic v. c. ira intumescuntiam glandulae thyreoideae efficere potest. *Brodleett* ³⁴³⁾ incolas anglicanae provinciae Derbshire, simulac nimio cursu fatigati, aut ira inflammati erant, intumescuntia glandulae thyreoideae dolorifica laborare animadvertit. — —

ι) Tali modo morbi tam *universales* e. g. scrophulae ³⁴⁴⁾, lues venerea, metastasis forsitan ex arthritide ³⁴⁵⁾ pellagra orta, quam *topici* partium vicinarum in glandulam thyreoideam pessime influunt.

343) in diss. de bronchocele. Edinburg 1794. 8. 344) *J. C. Arantius* de tumoribus praeter naturam Cap. 37. vitium scrofulosum in struma latere putabat; quae quidem opinio a recentiorum multis adhuc defensa est; vid. *Heisteri* instit. chirurgicas, Amst. 1793. p. 724. — *Bordeu* diss. sur les écrouelles: v. Prix de l'acad. de chirurg. T. III. p. 71. — *Charmetton* essai sur les écrouelles. Ibid. p. 204. — *Hamilton* Beob. über die Scrophelkr. a. d. Engl. Leipzig 1793. p. 108. — *Theden* l. c. p. 151. — *Kortum* l. l. p. 41. 345) *Stoll* rat. med. P. V. p. 437. *J. N. A. Leuthner* in Beob. über hitzige Gall- und Faulfieber. Nürnberg 1776. p. 339. strumam metastaticam ex febre bilioso-putrida vidisse se refert; sic etiam *Volpi* in *Léveille* Nouvelle Doctrine chirurgicale, T. IV. p. 128. et in *Samuel Cooper's* neuestem Handbuch der Chirurgie etc. nach der dritten englischen Original-Ausgabe übersetzt, durchgesehen und mit einer Vorrede versehen von Dr. *L. F. v. Froriep*, iste Lieferung, Weimar 1819. p. 302 — 303.

B. De strumae causis.

§. 49.

Quod ad causas strumae attinet, fateri debemus, magnam hic adhuc esse obscuritatem, in qua dispellenda eo usque laborabitur, donec Anatomicorum et Physiologorum studia de glandulae thyreoideae usu et functione majus incenderint lumen. —

*Causam proximam morbi, congestionem et coagulationem humorum lymphaticorum in glandula thyreoidea paulatinam, et inde ortam perversam hujus partis organisationem esse constat.*³⁴⁶) Jam vero tritum et notum est proverbium: „causa morbifica inventa curationem esse inventam.“ Hanc in definitione diximus esse lymphae stagnationem et coagulationem paulatinam; haec enim causa immediata est et continens, qua posita ponitur noster morbus, qua sublata idem removetur. Stagnationem dum dicimus,

³⁴⁶) Girard l. c. p. 407. — v. Gesscher. l. c. p. 220. — Gautieri l. l. p. 30. suam ipse protulit de causa strumae proximam sententiam hisce verbis: „Alia tamen adest, et potior causa, qua humor, licet sincerus fuerit secretus, tamen immutari potuerit; mora nimirum et praesertim in sacco praeternaturali, et non sinceri humoris. Mora profecto sic mutantur humores secreti, ut aliam induant naturam, aut proprietatibus longe aliis instruantur, quas vix secreti offerebant. Hinc mora crassescunt, spissescunt, indurescunt, lapidescunt absorpto a lymphaticis vasis tenuiore liquido. Nonnulli separantur ab aliis, alii aliis combinantur.“ etc. — August Gottlieb Richter's Anfangsgründe der Wundarzneikunst, 4ter Bd. p. 293—294. §. 410. — Iphofen l. c. p. 18—20. §. 26—30.

praesupponimus lymphae circulationem: ex hocce naturali statu sunt aestimanda, quae praeternaturaliter eveniant. Nempe secreti et imbibiti a glandula thyreoidea humores lymphatici, si neque per transpirationem educuntur, neque, ut par est, in viam reducuntur, necesse est, ut facillime coagulentur, et tandem in strumam accrescant. Notanter diximus in definitione fieri paulatim. Non enim una nocte fieri huncce tumorem observatum est, sed longiori mora est opus, non confertim et cum impetu, sed sensim et sensim in parte affecta fit collectio. Causas vero *remotas* enodare, pluribus subjunctum est difficultatibus. Auctorum de hac re opiniones valde differunt, et saepe plane sibi contradicunt. Praecipuas afferam theorias, quibus medici strumarum originem derivare studuerunt, iudicio lectoris relicturus, quam verisimillimam putet.

Ante omnia autem hic distinguere debet struma *endemia* et *sporadica*. Causa proxima, symptomata, caeteraque omnia in utraque eadem esse possunt; causae vero occasionales valde differre videntur. — Primo itaque de strumá *endemia*. Antequam autem ad causas ejus transeamus, necesse est, ut de *dispositione* praecipue *hereditaria* pauca proferamus. Animadvertitur nonnunquam hereditaria ad strumam dispositio, quae tamen diversimode sese ostendit: saepe enim infantes cum morbo ipso nascuntur. Quod multi observarunt ³⁴⁷⁾, et *Foderé* pluries ipse

347) *Laurentius* de mira strumarum curatione, Par. 1609. lib. II. c. II. p. 212. — *G. Falloppii* tract. de tumor. praeter natur. in op. omn. Frft. 1584. fol. Part. II. p. 288. — *P. Pigræi* epitome praeceptorum medic. chir. Paris 1612. p. 221. — *Roncalli* l. I. p. 352. Sic denique *Gohlius* in Act. med. Berol. Dec. II. Vol. VI. p. 70. exemplum commemorat bronchoceles congenitae. Tumor erat permagnus, qui in puero neogenito ab aure et gena lateris dextri ad thoracis cum abdomine confinia propendebat. Eum cum arteria aspera communicare, et ad ra-

it. Praecipue hoc fieri dicitur, si per aliquot generationes strumosi semper strumosas in matrimonium tunc³⁴⁸⁾; *Iphofen*³⁴⁹⁾ tamen, *Wiesner*, *de Vest*, *Gl*, *Gautieri*, *Marquet* atque *Odet* hoc negant, et *Carp*³⁵⁰⁾ dicit, se observasse, morbum nunquam esse secundum aetatis annum oriri. Nihilominus opinii priori adsentiendum credo: cum enim fetus a matre nutrimentum suum accipiat, partium quoque solidarum quam fluidarum indolem ac constitutionem, eam matris relaturas, nemini obscurum esse potest. Quidni ergo dispositio ista, strumae generationi quae favet, ex matre in fetum transplantetur? Cognitum quoque hoc ipsum iis observatur, qui in regionibus istis, ubi strumae endemiae sunt, immutabiliter ab hoc malo vivunt, adeo ut in contrahendis matrimoniis ad parentes quoque respiciant, an huic vitio obnoxii.³⁵¹⁾ Saepius autem infantibus dispositio³⁵²⁾

riorem bronchoceles et strumae speciem pertinere, ambitus ejus in inspiratione, et dum puer clamaret, auctus, in expiratione, et dum non clamaret, imminutus et considens, indicabat. Methodus, qua *Gohlius* in sanando hoc vitio usus est, non describitur; arbitror tamen, in principio fomentationes spirituosas et adstringentes in simili casu utiles fore, quibus laxitas partium aboleri et status naturalis restitui poterit. Neque exitum morbi Noster enarrat; suaserim tamen, si tumor nimium increseat, illum variis locis incidere, ut contentum emittatur. Aliud exemplum bronchoceles congenitae, strumis adhuc magis analogae, idem *Gohlius* l. l. habet, ex glandulis scilicet colli obstructis et tumefactis ortae. Optimum esse videtur, ut similes tumores ad adultiorem usque aetatem gerantur, ubi vel resolventia iis adhiberi, vel si ea non sufficiant, exstirpatione tolli possunt. — *Mead* mon. med. c. XV. p. 321. *Charmetton* Prix de l'académie de Chir. T. III. p. 176. 348) *Foderé* l. l. p. 27. 349) *Iphofen* l. m. p. 4—10. §. 7—14. 350) Vid. *Th. Percival's* essays médical philosoph: and experimental. War.ingt. 1788. Vol. I. p. 176. 351) *de Heucher* oper. Tom. I. p. 280. ed. *Haenel*. Lipsiae 1745. 352) *Aetas*, juxta *Hippocrat.* aphor. 26. l. 3. et in *Coac.* praenot. 512. p. 882. ex edit.

ad strumam tantummodo innata est. Morbus tunc intra septimum et decimum aetatis annum plerumque oriri solet; sed dispositio propria jam antea luculenter animadvertitur. Propriis *Foderéji* verbis utar ad designandos dispositionis characteres. „En effet, inquit, avant l'époque fixée ces enfans sont très beaux. Leur peau est ordinairement fine et délicate; l'incarnat des leurs joues est mêlé de roses et de lis; leurs yeux sont ordinairement grands, bleus, et vifs; leur cheveleure est blonde, ils joignent à une grande vivacité beaucoup de souvenance, marchent et parlent d'assez bonne heure. Ces préludes heureux sont ordinairement les avantcoureurs d'une triste fin. Le goût vient à l'époque fixée, et à mesure que la tumeur se développe sur le col, les yeux deviennent ternes, le teint de lis et de roses s'évanouit pour faire place à

Chart., puerilis magis proclivis est ad huncce tumorem ab ἀδ-
 ῥηφαιάς; quae sententia quoque *Galen*i est. Ab anno vero
 aetatis quadragesimo secundo usque ad sexagesimum tertium
 strumas fieri negant, quod verum esse *Sennertus* docet, quando
 ab interno humorum vitio fiunt; causam vero externam v. g.
 aquarum vitiosarum potum nullam aetatem excipere, sed ad
 strumam disponere ait; sic viatores et advenae, qui integerrima
 valetudine utuntur, si per aliquot annorum spatium eas ipsas
 regiones, ubi struma occurrit endemice, incolunt, eodem tu-
 morum genere inficiuntur, e. g. si aquas fluvii Putzcow in Sty-
 ria vel regiuncula Styriae bibunt; id in bello septenni tota co-
 hors militum experta est, quae postquam in Styria aliquamdiu
 castra locaverat, emissâ, struma laborare visa est. Sed ut re-
 deat oratio unde aberravit: et revera inter causas remotiores
 haud immerito aetas puerilis refertur, quippe quae longe aptior
 est ad gignendam strumam quam juvenilis vel adulta. Sive in-
 deducas ex constitutione puerorum molliori, sive ex addepha-
 gia, cui indulgent juniores, sive ex lymphae gelatinositate, quae
 in illa aetate abundant, sive aliunde id derives, effectus admo-
 dum frequens de causa juventuti familiari nos dubitare haud
 sinit.

blanc mat, qui accompagne l'empatement, et cet
 va toujours en augmentant suivant la progression
 la tumeur. " ³⁵³) Cel. *Watkin* eliam hanc disposi-
 tem observavit; signa autem, quae ei tribuit, non
 eum cum illis *Fodéreji* consentiunt. „These Goitres,
 it, are preceded (as I had frequently opportuni-
 of perceiving in the children) by a yellow and
 ly countenance, deformed features and a languor
 heaviness in their eyes. They bring on for the
 part, a total privation of the intellectual facul-
 which we considered as a happy circumstance
 these poor creatures, from its rendering them in-
 ible of their situation cet. " ³⁵⁴) Sufficiant haec de
 positione ad strumam. — Ad causas transibo ge-
 ales, et primum aliquorum tantum antiquioris
 poris scriptorum sententias huc facientes recensebo.
Veteres enim, ut Huxhamius est auctor, profe-
cto non viri erant solum magni ingenii, sed quo-
que maximae diligentiae et indefessae applica-
tionis, qui oculos rebus, de quibus agere vole-
bant, constanter affigebant, et nobis veram ima-
ginem nudamque rerum exhibebant veritatem;
quae omni adfectato ornatu atque excogitato ve-
stitu luxuriantis nostrae aetatis ingenii est pul-
chrior: quanto descriptio est accuratior, tanto
excellenterior; quid juvat simulacrum, nisi cum
archetypo conveniat? — Quemadmodum natu-
ram ipsam, quo attentius contemplamur, eo
magis admiramur, sic is, qui ipsius faciei ima-
ginem nobis exhibet verissimam, artifex semper
aestimabitur maximus.

³⁵³) *Fodéré* l. l. p. 29. — Sic *Lommius* in observationibus suis
 adnotat, facilius struma corripit illos, qui breve collum habent,
 et pressa tempora, et largas maxillas. ³⁵⁴) *Univers. Maga.*
 Febr. 1793. p. 86.

Putet quis primo intuitu, *Veteres* nobiscum dissentire, si quidem uno quasi ore omnes fatentur, *pituita* esse in caussa. Hoc *Hippocrates* voluit lib. de gland. l. c. dicens: „si pituitosa et multa et lenta fuerit fluxio strumas, pessimum colli morbum, generat.“ Et lib. de affect: „strumae ex pituita fiunt.“ *Galen.* comment. ad aphorism. 26. sect. 3. idem sentit: „struma est non ex calida materia, neque ad suppurationem properante, sed pituitosiori et frigidiori praecipue consistens.“ Sic *Durantes Scacchus* ³⁵⁵), et cum eo plures strumas vocant *excrementas phlegmaticas*. Quidam ex humore crasso et lento strumas oriri asserunt, cui interdum *melancholicus* sit admixtus. *Avicenna* ex humore *melancholico* strumas oriri ait. Ast in verbis erimus facile quia in re ipsa convenimus. Quod enim *Veteres* pituitam vocarunt, id nos lympham coagulatam diximus quoniam pituita nihil in rei veritate aliud, quam seu sive lymphae coagulum est. Galenici strumam dicunt pronasci a *collectione* vel humorum, vel flatuum inter cutem colli et asperam arteriam, abs qua cutis distenditur et succi alimentares crassiores ibidem coaccervantur; eandem quoque cutis distensionem et flatuum impulsionem a magno excitari affirmant conatu in enixu partus, egestionem faecum, aut sustollendo onere, aliisque laboribus gravioribus. — *Paracelsus* bocii originem *spiritui minerali* assignat, quatenus hic, qui in tartari genera permiscendus erat propter naturae suae conditionem elevatur et adscendit, unde si collum obsederit et occupaverit, nodos gutturis gignat, quippe tartarum faciendi minime potest quoniam sine corpore existat, bocium tamen materia cruspuleam contineat, qua singulariter oblectetur, in venosis partibus nodos magnos aut parvos suscite

355) Subsidiium medicinae l. 4. c. 14. p. c. 351.

ta tartara mineralium alimentum tantum aut nutri-
 tum strumarum fiant, ac illarum generatio, seu
 iter, eaque cognationem et affinitatem quandam ha-
 bere pronunciat cum tartaro vini in vesica, adeo ut si-
 modo liquores tartari collum obsideant, eoque
 vasa sua et virtutem habeant crescentem. Prae-
 ca lib. Philos. de generat. stultor. commemorat,
 omnis strumae stultis non sint propriae, sed ipsis
 aliis communes; in stultis tamen cum aliis defor-
 mitatibus esse frequentissimas, idque hanc ob causam,
 id non tantum sculptura mala ipsa ratio corrumpa-
 re, verum et ipsum corpus, quod indecoris formis
 cens turpetur. Oriri vero ex metallicis et mine-
 ralis aquis, quae strumas ex nativa proprietate gi-
 unt, ubi multae etiam constellationes coincidunt, et
 rarissimum ubi hujusmodi regiones reperiantur. Nasci
 quoque easdem ex mineralibus vult modo plane eodem,
 et aliis, quae oriuntur ex iisdem, sicut intempestiva
 et chasita, vel mineralia cruda, et hinc fieri putat,
 strumosi magis ad maniam, quam ad intellectus tem-
 perantiam praeconi sunt, propter minerarum nempe crudita-
 tem in struma sitam, quae collum occupat, in quo
 generalium est principium; quodvis autem minerale
 illud prope radicem crudam generare excrescen-
 tiam illi similem, quod inde fieri debuisset, quoniam
 illud quodque mater sit et origo nodosorum. Ortum
 quoque adsignat bocio ex menstribus et haemorrhoidi-
 bus, eodem loco, in quo ambae hujusmodi fluxiones
 fiunt, illudque in alio fluxu proprium sibi met fa-
 cere emunctorium, liquorem enim seu fluxum, si con-
 stat fuerit, ut ad locum pervenire nequeat, nec
 opus exequi valeat, quod sui fuerit officii, retro-
 li asserit, donec transeat in carnis generationem. —
 monitius bocium defectum dicit esse transmutatoris
 phaesi, non vero coagulationem Tartari, sed ex bono
 cruore, cui strangulans potestas vitae mediae sit

relicta, Archaeum enim omnem sibi substratam transmutare massam, nisi a vita media potentiore victu cesserit. Contradicit proinde manifesto Paracelso, dum easdem ex cachymiis mineralibus et aquis potis mineralibus pronasci credit, poscitque ab eo, ut per ignem cachymias istas in aquis ostendat, quibus proprium sit in ultima duntaxat nostri digestionem, nec alibi quam circa jugulum coagulari, quod eum nunquam praestitutum esse novit. Interim fatetur quidem aquae inesse vitam mediam, cui sit proprium Archaeum excitare et inficere in commutatione boni alimenti, non autem tartari peregrini illi inexistentis materialiter in duritiem petrosam, sed ad strumas requiri contendit materiam, quae proprietate sui Archaei nata sit praeccludere fauces, ac quasi praefocare, idque citra adstrictionis aut terrestris acerbitalis, transmutataque in alimentum, retinensque pristinas vires vitae mediae perfungatur sua potestate, circa guttur magis quam alibi, et hanc potestatem jure sibi hereditario in alimentis, et hinc in cruore relictam convertere proximum solidorum alimentum in excrementum petrosum, quod directoris facultate strangulante ad guttur concedat. Hoc trutinantem Seduni se reperisse dicit fungos praefato praevocandi veneno pollere, illosque frequentes e radice laricis, abietis et pinorum, in rupibus ad septentrionem declivibus succrescere, ubi niger agaricus ejusdem criminis haeres in trunco frequens, unde didicerit, totum terrae Leffas fungosa indole ibidem contaminari, credideritque strumas nasci usu herbarum et aquarum, quae hujusmodi Leffas imbiberunt. — *Willisius* strumam oriri vult ab humore nerveo in transitu suo impedito, et in parte quadam colli stagnante, dum spiritu depresso aut avolante, particulae salinae a volatilitate in acorem degeneres, consortia aliena mox meant, atque corpuscula sulphurea sibi arripientes, in tumores strumosos coagulentur. — *Syl-*

strumarum naturam ex *lymphā* deducit *peccate*, et causam esse affirmat *rupturam* et *dissensionem* cutis et subjacentium membranarum a quibus partibus et humorum, flatuum, seu aëris sub collectione, quod frequentius a violentiori continuatione. — *Cartesiani* differentiam strumarum a *phlegmā* saltem in mājori copia particularum *terrestrium* particulis *ramosis* et *angularibus* strumarum consistere credunt, quae minus ab auribus coagulari queunt, hinc massa non ita inspissatur, et cum particulae quaedam porosae iisdem insistentiae aliquando existant, potius dilatatur et fibrae glandularum colli majorum et membranarum adjacentium magis tenduntur, unde et tumor incrementum accipit, maxime dum *lymphā* massam contentam satis coactat, ad quae insuper si *chylosus* aliquando accesserit liquor per arteriolas, hic ipsemet tandem corrumpitur, materia putrida et foetida ob dissoluta salia facile emergit. Quod autem in quibusdam regionibus strumae copiosiores conspiciantur, quam in aliis, hoc iisdem particulis rigidioribus, angularibus, terrestribus, et ramosis copiosioribus, quam porosis et mollioribus, per dietam succis corporis internis commutatis, contingere rentur, quae per angustos ductuum glandularum vascularium meatus tam facile nequeant effluere, sed angulis suis hic illic tubulis adhaerentes eosdem obstruendo tandem claudunt, et circa obstructionem istam, variarum particularum pariunt collectionem, coagulationem, aut aliam quandam misturam inconciunnam et minus convenientem. Strumamque oriri putant, dum vi quadam impetuosā, et actione spiritus membrana asperam arteriam aut venam colli investiens nimium extenditur, et a rebus partibus divellitur; spiritus enim animales a propria repellantur, et magna vi regredi coguntur, hinc cum sufficiens non reperientes in tubulis consuetis,

impetu vehementi membranam divellunt, quo interdum simul vascula quaedam et nervuli dirumpuntur, ut succi eorum in cavilatem seu sacculum hunc effundantur, et successive non modo majori copia colligantur, sed accedentibus particulis diversimode figuratis singularem quandam constituent massam, modo spissiore, modo flatulentam, a qua cutis simul distenditur, et pars ea colli redditur tumida. — *Dolaei* sententia: „si glandulae colli majores a materia tantum *viscosa* et *tenaci* cum particulis *terrestribus* commixta impleantur, oriuntur tumores nostri strumae dictae, si praedominentur acidae acres particulae degenerant in cancos, at si terrestres imperium habeant, degenerant in scirrhus. Qui succis abundans viscidis et acidis, proniores sunt in affectum hunc quod pueris contingit scorbuticis sanguinem lutosum habentibus, et catarrhosis; praeterea aër nimis frigidus et humidus, hoc est, qui abundat acido nitroso et victus humidus acidus, chylum acidum subministrans ad coagulationem et stagnationem pronum, strumis producendis facile inserviunt; maxime vero hic culpatum aqua praeter mercurium particulas austeras in se continens, quales sunt in Carynthia, Styria, et circa Alpes; quo pertinet luxus, vitae intemperantia et ingluvies, ob quam causam et in senibus producuntur. Symbolum suum quoque conferunt somnus longus, otium nimium, vita sedentaria et desidiosa, aut melancholica, et similia, quae succos in copia generant acidos et viscidos facile stagnantes. Haud raro etiam spiritus copiosiores membranam communiores colli tendunt et divellunt, ut sacculus quidam formetur, in quo liquores ex disruptis venis, aut aliis quibusdam stillantes colliguntur, quae pro diversa mixtura aliam atque aliam quandoque componunt massam, sicque nonnunquam materia quaedam, sive succus nerveus, sive lympham pallidam, foetidam et indur-

rata quasi, aut in grumos concreta, propriae cystidi inclusa in parte carnosae prope guttur fuit observata, quae in tanta copia aperta struma emanavit, ut adstantes medici non potuerint satis admirari, qualem videre licet in Zodiac. Med. Gall. Ann. 2. Obs. 9. et 11. p. m. 447. — *Platerus* causam in *semine* et *facultate formatrice* in *utero* quaerit, ac strumas, ubi sunt alicui loco familiares, a parentibus in liberos propagari statuit, annotante *Bonneto* etc. ³⁵⁶⁾ In hanc quoque arenam prodiit *Boerhaavii* de obstructione opinio, cujus rationem praecipue in *constructione arteriarum* noscit, porro in *convergentia parietum arteriarum*, in *conglomerato sanguine intra ipsius caveam*, et in *mutata sphaerica figura elementis ipsius concessa*. — *D. Haenii* sententia in *dilatatione vasorum glandulae thyreoideae lymphaticorum* est posita, quam omnium tumorum constantissimam esse affirmat. Causam vero strumae neque in dilatatione neque in obstructione vasorum lymphaticorum et sanguiferorum quaerendam esse optime argumentis iisque firmissimis *Gautieri* ³⁵⁷⁾ et *Soemmeringius* ³⁵⁸⁾ refutarunt. Sic etiam *Malacarne* in *obstructione glandularum* causam statuit, *Ackermannus* ei opposuit, causam pro effectu et vice versa effectum pro causa recepisse. Nonnulli medici obstructioni faventes causam scrophularum inde derivarunt, strumasque etiam ad hoc genus morborum retulerunt. ³⁵⁹⁾ *He-*

356) An, quemadmodum *Hierocles*, de quo legi potest *Mercurialis* lib. I. de morb. puerorum cap. 5. p. 105 tradidit, jumenta castrata non tententur strumis, idque etiam in hominibus observatum fuerit contigisse, ut, qui carent testibus, strumis etiam non tententur, experientiae ulteriori committimus. 357) l. cit. p. 24 — 30. 358) ad *Baillie* Anatomie des menschlichen Körpers cap. 87. Not. 233. 359) vid. l. l. in §. 46. no. 336.

ekerus ³⁶⁰⁾ et *Bierchen* ³⁶¹⁾, qui putant morbum *scrophulosum* et *syphiliticum* unum eundemque esse, strumam *ex hoc duplici fonte* promanare evincere conantur. *Musitanus* ³⁶²⁾ autem jam de hac strumarum causa dubitavit, et alii clarissimi medici eam plane rejiciunt. ³⁶³⁾ Scrophulae et strumae nullo modo invicem sunt confundendae, quin imo tales prostant inter strumam et scrophulas differentiae, ut ne dubium quidem remaneat circa diversam horum morborum naturam. ³⁶⁴⁾ Vitium tamen scrophulosum etiam glandulae thyreoideae intumescentiam producere posse negandum non est; sed rara tantummodo hujus rei extant exempla. ³⁶⁵⁾ —

Alii strumae originem *ex victu crudo*, et imprimis *castaneorum* abusu derivant; vid. *Mangeti* Biblioth. med. pract. Tom. I. p. 258. *Roncalli* l. c. p. 553. *Matth. Godofr. Purmann* grosser und ganz neu gewundener Lorbeerkrantz der Wundarzneik. Francf. u. Leipzig 1722. Th. I. cap. 42. *Barton* l. c. Castaneae nempe variis incolis Tyrolensibus et Vallesiensibus praecipue abundantissimae eorum appetitum excitant, hinc saepe parvuli, quin imo adulti catervatim sub his arboribus confluent, quarum fructus saepe immaturos saxis petunt comeduntque. Hos magna copia devorant, et cum aliis dividunt. Quid ab hisce expectandum, praecipue crudis, saepe immaturis magna copia ingestis, jam norunt pathologici. Energiam videlicet intestinorum imminutum iri ex quantitate cibi, et aëre evoluto; interea dum non innocens earum suc-

360) Diss. qua morbum syphiliticum et scrophulosum unum eundemque esse evincere conatur. Hal. 1787. 361) Vom Krebse etc. 362) *Musitanus* l. c. cap. 45. 363) *M. Stoll* prael. de morbis chronicis. — *Prosser* l. l. p. 40. Anhang zu *Th. White* über Scropheln und Kröpfe p. 98. 364) vid. §. 43. 365) *The-den's* neue Bemerkungen Th. I. p. 151. *Kortum* l. c. p. 41.

cus humores non admodum laudabiles praeparare, conficere potest. Videatur igitur, ut varii putant, eodem tempore, quo debilitas viscerum chilopoëtico-
rum habeatur, determinari majori quantitate humores ad caput, ut neque absurdum sit opinari, strumam ipsam promoveri posse. Caeterum hac nimia castaneorum ingestione non dico strumas procreari, saltem tamen indigestionem, tumores abdominis et obstructions induci mihi videntur. ³⁶⁶⁾

Antiquissima propemodum opinio causam strumae endemiae, *aquae*, qua certarum regionum incolae coacti sunt, quaeque vel *nivalis*, vel *putanea* partibus salinis crudis terrestribus imbuta est, adscribit ³⁶⁷⁾: tribuerunt alii ipsam *aquae frigori*, alii

³⁶⁶⁾ legas etiam *Foderé* l. l. p. 353. ³⁶⁷⁾ Hoc jam testatus est *Cajus Plinius Secundus* in Hist. Natur. eum alibi, tum maximo lib. XI. p. 624—25. cap. 37. sect. LXVIII. ex edit. *Joannis Harduini*. „Guttur, inquit, homini tantum et suis intumescit, aquarum, quae potantur, plerumque vitio.“ Praecipue aqua frigida cruda et nivalis potens judicatur a *Celso* et *Sennerto*. Quod vero in Alpibus multisque adhuc aliis locis, ubi malum istud occurrit endemice, colli strumis saepe admirandae magnitudinis affligantur, quidam cum *Scaligero* in *Cardanum* Exercit. 60. id fieri volunt ob aquae malignitatem, et propter liquefactas nives, unde aqua multum terrestritatis secum retineat; producat *Schelhammer* de hum. corpor. tumoribus, Jenae 1695. p. 96. *Musitanus* l. c. c. 45. nec non multi medici recentiores morbi causam ex hoc fonte derivandam credunt, v. c. *Prosser* l. c. p. 32. *Girard* l. l. p. 410. *Percival* l. m. p. 176. *Deidier* et *Lange* in *Richter's* chirurg. Bibliothek. B. VIII. 3. St. D. *Bordeu* Prix de l'academie de Chir. l. c. p. 54. peculiare qualitates aquis nivalibus inesse asserit; saponem enim difficulter resolvunt, nec linteaminum impuritatibus delendis, nec leguminibus coquendis conveniunt, ideoque vi solvente destitutae, nec alimentorum in ventriculo digestionem multum adjuvare posse videntur; imo forte nec sanguini diluendo propterea aptae existunt: vid. *Goursaud* propter nitrosas partes, quas continere ait, sanguinem eas incras-

defectui aëris fixi. ³⁶⁸⁾ Sunt, qui ex partibus aquae constitutivis, ex *selenito* aut *topho* aut *marga*, quae corpora in his locis in aqua inveniuntur soluta, omnia declarare cupiant. ³⁶⁹⁾ Alii cum *Lan-*

sare putat, Prix de l'academie de Chir. l. c. p. 292. Has etiam aquas nivales particulis terrestribus scatentes accusat *Fr. Hoffmannus*, vid. A. E. L. 1714. p. 207. *Lucas* exinde derivat strumas, quibus incolae Spadani laborant, sed monuerunt E. L. thermas Carolinas aequae ac simplices ibi scaturientes aquas copiosis particulis terreis abundare, cum tamen nemo ibi strumis laboret: vid. Comm. de rebus in sc. nat. ac med. gest. Suppl. I. Dec. I. p. 23. ³⁶⁸⁾ *Selle* Medicin. clin. 1793. p. 415. ³⁶⁹⁾ *Pallas* Reisen in verschiedene Provinzen des Russischen Reichs, St. Petersburg 1771. 1ster Th. p. 38. Ejusd. Nordische Beyträge, Bd. II. S. 123. *De Luc* physisch-moralische Briefe über d. Berge u. Geschichte d. Erde und des Menschen, Seite 18. u. 19. *Wilhelm v. Coxe* Briefe über den natürlichen, bürgerlichen und politischen Zustand der Schweitz, 2ter Bd. 18ter Brief; *Cl. Coxe* pro unica hujus mali causa materiam calcaream habet aut tophum polymorphum *Linnaei*, germanice *Tuffstein*, tam subtiliter in aqua solutum, ut a naturali sua pelluciditate nihil quidem amittat: quae particulae, ut illi videtur, ad glandulas colli se quasi adglutinant strumamque formant. In omnibus enim Europae regionibus, quibus struma solemnis est, hunc tophum, hanc materiam calcaream in aqua se reperisse asserit: quin etiam non raro chirurgum aliquem particulas tophaceas e strumis extraxisse contendit, et unum exemplum prae aliis memoratu dignum allegat, ubi hic idem chirurgus plures ex hac materia consistentes lamellas longitudine dimidii pollicis manu prehendisse, solisque remediis externe adhibitis et abstinencia ab hac aqua aegrotos sanasse dicitur. Nunc, quamvis huic observatori contradicere nec possim nec temero velim, omnino tamen fatendum erit, non eandem semper hic statuendam esse rationem, non unice, non necessario a causa allata, aut, ut alii volunt, a superflua salis quantitate in aqua soluti pendere hoc malum. Nam accuratiore aquarum et locorum indagatione didicimus, aliquas regiones strumae non expertes minus praeditas esse aquis calce impraegnatis, quam locos excelsiores, in quibus struma prorsus non observatur. vid. *Foderé* l. c.

pro lib. I. epist. 45. in *halitus mercuriales*, it. aquas in Alpibus mercurio infectas; aut mercurium in se continentes causam conferunt. Videatur quidem consentaneum, effectum hunc a mercurio esse deducendum, quia aquae hae ex Alpibus scaturientes juxt. *Langium* etiam casum dentium excitant, et posset forte aër frigidus, liberius admissus, notum lymphae, quem mercurius excitaverat in faucibus, iterum inhibere, ut in glandulis faucium denuo stagnaret, et ita mercurius quidem moveret lympham, sed non promoveret, imprimis si denudatio colli et aliae circumstantiae concurrerent. Quia tamen nihilominus in Hungaria et Transsylvania mercurius in magna copia provenit, et nihilominus incolae strumis non aeque corripuntur, ideo probabile videtur, tumores hosce etiam ex aquis austeris et crudis ex nive liquescente resolutis oriri, cum noxae valde sint et ideo ab *Hippocr.* lib. de aëre, aquis et locis, ὕδατα φλεγματώδεστατα et ὀρυγγωδέστατα i. e. maxime aquosae, inutiles et asperimae nominentur. — Alii denique ex *aquis vitriolicis* strumarum genesin explicarunt, vid. *Jonston* . . 9. tit. 2. cap. proprio et *Camérar.* cent. 9. part. 69. utque ad probandam hanc sententiam multa in medium adducere sunt conati: istae enim particulae, dum continuo harum aquarum usu sanguinem ingrediuntur, ob naturam suam acido stypticam lympham cogunt, ejusque naturam blandam pervertunt: quae sententia maxime confirmari videtur eo, quod *Zeplichál* de incolis Illyrici Iauraviensis prope montes sudetos narrat: vid. ejusd. *Einleitung zur bergmännischen Kenntniss des Erdb.* P. I. p. 94. „isti enim, quamdiu aquas e metalli fodinis scaturientes (Stollenwasser) pro potu assumerent, strumis laborarunt: intacti vero ab eo malo vivunt, postquam neglecto harum aquarum potu aquam fontanalem bibere inceperunt.“ — Attamen in dubio manet haec hypothesis, cum in quibusdam locis aquae vitrio-

licae in magna copia proveniant, quorum incolae strumis haud corripuntur. *De Heucher* l. c. p. 282.

Quod primam, cujus mentionem feci, attinet opinionem, nempe in aqua nivali regelata sumendam esse strumae causam, *Fernelius* ³⁷⁰⁾ jam de hac re dubitabat, et *Wilmer* cum *Foderé*, *Saussure* et aliis ³⁷¹⁾ somnium hoc esse putant, et totam hanc theoriam rejiciunt. Defensores hujus theoriae eam ita explicare solent: „Tam gelatione aquae, quam solutione nivis et glaciei subtiliores et volatiles aquae partes, aërem praecipue fixum aufugere, ac dissipari; crudas vero salinas ac terreas remanere, experientiae esse ³⁷²⁾; tali aquae humoribus semper admixtae illud deficere principium, quo partes istae crudae subigantur, eoque noxii adfectus, quos in lympham habere debeant, impediuntur; visciditatem itaque et coagulationem lymphae, partiumque terrearum abundantiam in ea oriri debere ³⁷³⁾; ideo obstructions effici, quae in nulla alia parte tam facile oriri possint, quam in glandula thyreoidea, quippe organo fungoso, cui pro ambitus proportionem maxima fere humorum pars adducatur, cujusque usus praecipuus in eo consistere videatur, ut sanguinem, imprimisque lympham aliquo modo commutet. Contendant porro eundem fere esse effectum in iis, qui aquis utantur putaneis, partibus seleniticis aliisque salibus lympham coagulantibus impraegnatis.“ Quae omnia non vana esse, argumentis probatur sequentibus:

370) *Fernelii Ambiani* universa medicina Frft. 1693. 8. p. 649.

371) *W. Cullen's* Abhandl. über die Materia med. mit Anmerk. von *S. Hahnemann* 1. Th. Leipz. 1790. p. 444. 372) *Hippocr.* de aërib. aquis et locis in Oper. omn. ed. *van der Linden*

p. 339. *C. Wintringham* von den endem. u. epidem. Krankh. a. d. Engl. Berlin 1791. 1. Th. p. 115. 373) *R. Mead* account of poisons. Lond. 1754. p. 307.

α) Struma nempe in iis regionibus praecipue endemia est, quarum incolae aquam nivalem et glaciam bibere coacti sunt. ³⁷⁴⁾

β) Sic sociis nauticis celeberr. *Forster* ³⁷⁵⁾ sub potu aquae nivalis glandulae colli intumescebant, et postquam ab illo abstinuerant, tumores cito evanescere visus sunt.

γ) Iis in regionibus, ubi multae inveniuntur strumae, pauperes, qui multum aquae bibunt, plerumque iis sunt obnoxii: divites vero, qui parum aquae bibunt et vino ac cerevisia magis utuntur, morbo immunes sunt. ³⁷⁶⁾

δ) Ab eo inde tempore, quo aquae fluminis Vesse canalibus per urbem Rhemi ductae sunt, incolaeque iis utuntur, strumorum numerus, antea hac in urbe eximius, mirum sane in modum est imminutus. ³⁷⁷⁾

ε) In pago *Flach* Tigurinae ditionis fons est, qui ob peculiarem suam vim „Kropfbrunn“ dicitur. In iis, qui aquam ejus bibunt, strumae oriuntur. Incolae pagi Schmiedebergensis „Steinseiffen“ strumae olim quam maxime vexabantur. Malum tamen plane fere desiit, a quo tempore incolae fontibus quibusdam non amplius utuntur, quibus strumas oriri videbant. ³⁷⁸⁾

374) *C. Lucas* an essay on Waters. London 1756. Tom. II. pag. 257. *Watkin* in the univers. Magaz. Febr. 1793. praeterea multo plures adduci in medium possent; sed eorum historiam universam non damus. — 375) *Observations* made during a voyage round the world by *J. R. Forster* Lond. 1778. p. 639. — *Joannes Petr. Frank* de cur. hom. morbis epitome. Edit. a *Joseph. Eyerel* M. D. lib. VI. p. 258. 376) *Ed. Brown* l. c. p. 77. 377) *Thouvenel* Hist. de la Societ. royale de médecine, Ann. 1777. et 78. p. 274. *Sammlung ausserles. Abhdl. für pract. A.* XV. Bd. p. 416. *Percival* l. l. p. 176. 378) *Fr. Hoffmann* de morbis certis regionibus et populis propriis; vid. *Op. omn.* Tom. VI. p. 202.

Jam vero audiamus, quae huic theoriae opponantur:

α) Si aqua nivalis strumae causa esset, morbus in omnibus istis regionibus endemius reperiri deberet, quarum incolae ea utuntur. Contra autem non admodum rarum est, ut in ejusmodi regione struma occurrat, cujus habitatores aqua nivali non utuntur, e. g. in urbe *Neapoli* et in insula *Sumatra* ³⁷⁹⁾ appellata: cum contra in regionibus, ubi omnis aqua potui inserviens e receptaculis glaciei ac nivis hauritur, immunes malo inveniamus incolas: sic *Lapponi*, qui per maximam anni partem aquam bibunt nivalem, rarissime strumis sunt expositi. ³⁸⁰⁾ Simili observatione *Cl. Foderé* opinionem illam refutare studet: „Si les eaux de neige,“ inquit „étaient la cause du goître, ceux, qui les boivent au sortir immédiat de frondrières de neige, devraient être attaqués les premiers de cette maladie; mais tout le contraire arrive. Dans la vallée de Maurienne par exemple les habitans des Paroisses de Bonneval, Bessans, Lanslevillard etc. n'ont point de goître; cependant ces peuples boivent l'eau sortant, pour ainsi dire des frondrières de neige, et des glaces éternelles, qui couronnent leurs Alpes.“ „Au contraire, à mesure que les habitans des communautés qui suivent, boivent l'eau plus éloigné de la neige, ayant déjà serpenté par des cailloux, des bois et des prairies, ayant déjà eu le temps de s'imprégner de l'air atmosphérique et de calorique, le goître commence. Ainsi les habitans de Modanne commencent à en avoir; en suite ceux de Frenai en ont de plus; ceux de St. André d'avantage etc. ³⁸¹⁾

β) Omnes fere fontes ac flumina a montibus deve-

379) *Marsden* Geschichte und Beschreibung von Sumatra, S. 64. und weiter. 380) *B. Wilmer* Cases and remarks in Surgery. London 1779. p. 257. 381) *Foderé* l. c. p. 37.

unt, exinde a nive soluta, hinc omnes, qui hac utuntur, deberent struma affici, quod non accidit.

γ) Grajis et Romanis in deliciis erat glacialis et ni-
vis unda, et glacies ipsa, attamen hac de causa non
orant struma epidemica.

δ) Aqua partibus calcareis impraegnata nunquam
strumae, testante *Foderé*, causa esse potest. E con-
trario talis aqua strumam sanaret, nisi morbi causa
remaneret. ³⁸²⁾

ε) Plurimas se invenisse strumas *Foderé* dicit in
regionibus, quarum aquae purissimae sunt; cum con-
trario istarum regionum aquae, quarum incolae strumis
non expositi sunt, selenite et terra calcarea abun-
dant. ³⁸³⁾ Observationes autem *Fr. Hoffmanni*, *Per-
ceval's*, *Watkin's* aliorumque celeberrimorum viro-
rum plane contrarium probant.

ζ) Aqua clara paucissimam tantummodo quanti-
tatem harum partium solutam continere potest, et ta-
quantitas tantos producere non potest effectus. vid.
Foderé l. l. p. 40.

Sufficiat haec qualiacunque in medium protulisse:
multo adhuc plura ad exuendam hanc sententiam attu-
lisset *Foderé*, quorum taediosa esset enumeratio. —

Non minus multi causam strumae principalem tri-
buerunt consuetudini quibusdam gentibus propriae,
pondera in capite gerendi, et *necessitati*,
in vallium incolae subjecti sunt, *omnia*
per montes altissimos portandi. ³⁸⁴⁾ Quae

³⁸²⁾ *Foderé* l. c. p. 36. ³⁸³⁾ Loc. laud. p. 38. ³⁸⁴⁾ Collum
in his functionibus auctore *Riolani* encheirid. anat. et pathol.
Lipsiae 1674. Lib. IV. cap. 7. multa certe patitur, et expira-
tio valde impeditur. Aër retentus uno alterove modo vias sibi
parat, quibus glandulam thyreoideam intret. Haec eo disten-
ditur; interstitiis exinde factis lymphæ coagulabilis extrava-
satur, quæ sensim incrassatur et magis accumulatur, sicque stru-
ma oritur vera ex tumore, qui antea exphysematosus tantum-

verò causa, si ad libellam veritatis expendatur, celeberrimo *Gautieri* l. c. p. 143. et 144. futilibus videtur innixa argumentis, cum his in locis usu non admodum veniat talis gestationis modus ob irregularitatem collium; imo penes nonnullos Tirolis oppidanos usus hic protinus deficiat. Praeterea generatim struma jam laborant, quamquam haec pondera supra caput non gestaverint. Contra Badobadenses feminae, quae pondera supra caput gerunt, procera eaque recta donantur corporis statura, et nullo morbo premuntur. Sic e. g. inter Austriae, praesertim inferioris, juvenes rusticos certamina sunt circa transportationem ponderum in capite; nonnulli quocirca horum, ut se fortiores ostendant, immanes ferunt mergites vel herbarum fascies, nihilominus strumam nondum innatam invenimus. Nihilo tamen perficere posse non renuam, cum musculorum colli et thoracis validior et constans appareat actio atque intentio, cum respiratio aliquando laedatur, et exin sanguis ad caput deferatur insigniter, prout ostendit faciei rubedo, diffluens undequaque sudor, et vasorum intumescentia.

Ad theoriam tandem pervenio a *Cl. Foderé, Barton, Saussure* et *Chavassieu d'Audebert* magna fidu-

modo fuit. Quae vero sententia quoad florem et incrementum tumoris maxime in controversiam adducitur a celeberr. *Iphofen* l. c. p. 26 — 29. §. 43 — 48. p. 31 — 35. §. 51 — 55. *Plenckius* l. c. p. 203. suam mentem clarius expressit his verbis: „Bronchocele est fere semper aliarum strumarum principium: vides enim aëri in glandulam thyreoideam irrumpenti parari possunt vel distensione ac divulsione membranae laryngis, vel canalibus a respirationis viis ad thyreoideam glandulam tendentibus. *Felix Platerus* prax. med. Tom. III. Basil. 1625. p. 238. primus fuisse videtur eorum, qui strumas ex hac causa ducebant, et multam opinionem ejus probarunt. Sic *L'Alouette* l. c. p. 169. sic denique *Hallerus* Elem. physiol. Tom. III. p. 398. et *Foderé* l. c. p. 25.

adsertam ³⁶⁵); quaeque brevibus verbis haec est: atmosphaerae earum regionum, quae strumarum or- favent, character proprius *humiditas* est, qua- *magnus* conjunctus est *calor*, a solarium ra- orum percussu ex saxis valles circumdantibus pro- us. Hinc talis atmosphaerae oritur constitutio, quae les eas balneis vaporis similes reddit. Talis autem mosphaera corpora debilitat, imprimisque eorum su- fficiem et partes externis impressionibus praecipue positas. Hisce partibus glandula thyreoidea etiam numeranda est. Nunquam autem glandula debilita- ita, ut non una intumescencia exinde producat; que facile intelligitur, quomodo struma oriri possit. am tamen ex hac causa nunquam tantus tumor, quan- na struma saepe adfert, produci possit, nisi debili- permagna adsit, quae et alias corporis partes infe- , adesse debent causae coëfficientes, immediatum in- ndulam thyreoideam effectum producentes. Hae in- ndulae thyreoideae debilitate, impotentia latere vi- utur, deliberandi se ab humore in ea parato ad la- gis lubricationem destinato. Causa hujus imbecil- utis etiam in aëre humido quaerenda est, cujus in- ratione canales laryngi mucum adducentes relaxan- . Hi tonum ac elasticitatem suam inde perdunt et- sim sensimque ita obstruuntur, ut excretio humo- ex glandula thyreoidea tandem plane cesset; aër- m humidus non satis magnam vim irritantem habet, organa haec stimulentur ad sese deliberanda. Sec- tio autem in glandula thyreoidea semper pergit, hu- re retinetur, et sensim incrassatur ob partium ejus

5) Foderé l. l. p. 53. sqq. — Barton l. c. p. 86. et 87. — Saussure Alpenreisen 2. Band. — Chavassien d'Audebert D. — Médecin de Paris etc. Des inondations d'hiver et d'été etc. Paris 1807. Non pigeat consulere Iphofen l. c. p. 38—50. 9. 60—76.

fluidarum resorptionem, sicque sensim magnus oritur et durus tumor. Glandulae arithaenoideae et epiglottidis iisdem aëris humidi impressionibus expositae sunt; quare eodem modo, ut glandula thyreoidea, intumescerent, nisi superior laryngis pars frequentioribus conatibus in exscreatione, tussi etc. exposita esset, quibus glandulae istae exonerare se muco coguntur. Quamquam vero non audeo hujus theoriae naturam dijudicare, tamen rationibus sufficientibus niti non videtur. Auctores enim hujus opinionis glandulam thyreoideam organon esse secernens arbitrantur; cum autem ingeniosissimi aetatis nostrae Physiologi et Anatomici de hac glandulae thyreoideae functione dubitent, haec quoque theoria nondum valere potest. — *Ackermannus* ³⁸⁶) dicit de strumis in genere, eas nihil aliud esse, quam glandulam thyreoideam abnormalem tumidam, *ab arteriis hujus glandulae nimie extensis* productam; respectu Cretinorum vertebrae colli antrosum curvatas tanquam causam praedisponentem considerat, quia his glandula antrosum premitur, arteriae igitur, puta thyreoidea superior et inferior, quae alias flexuosae ad hanc glandulam ascendant, nimis extenduntur et perdunt suas flexuras, atque sanguis ob vicinum cor majori cum vi in eas propellitur, quo vasa dilatantur. Haec tamen postrema definitio nodum non solvit, quia expresse dicit *Iphofenius* ³⁸⁷), se nunquam in Cretinis vertebrae colli antrosum curvatas invenisse; non igitur sufficit distinctio causae illius praedisponentis. Quod primam, cujus mentionem feci, *Ackermanni* attinet opinionem, dubia et levis manet haec hypothesis. — *Wichman-*

386) J. F. *Ackermann* über die Cretinen, eine besondere Menschenabart in den Alpen. Mit Kupfern. Gotha 1790. Seite 48. und 49. 387) l. l p. 21. §. 52.

is ³⁸⁸) et *Wenzelii* ³⁸⁹) *causis mechanicis* v. c. stui et adscensui montium ortum strumarum attri-
bunt; si vero haec ad producendas strumas suffice-
rent, omnes totius Helvetiae incolae strumis deformati
esse deberent, et omnes regionum montanarum habi-
tantes, quod tamen historia non testatur. — Alii de-
que strumae originem ex *congestionem sanguinis ad caput, glandulamque thyreoideam*,
qua dilatatio vasorum sanguiferorum et exinde repro-
ductio hujus partis major efficiatur, ducunt. — Jam
vero *Iphofenius* ³⁹⁰), vir elegantissimi ingenii, de ve-
ritate sententiarum illarum non convictus in hanc quo-
que arenam prodiit, rem aliquam natura sua difficilem,
sicuti utilem nullique percognitam curiose diligenter-
que excussurus, qua tandem via ad lucem aliquam fa-
cillioris rationis, per difficillimam hanc doctrinam pos-
set perveniri atque ita ad viscera causae penetrari: fa-
ciamus eum ipsum loquentem: „Opinio, aquam par-
tibus terreis gravidam ad producendas strumas con-
ferre posse, saepius quidem jam refutata est, persua-
sus autem de influxu ejus in strumas, cogor eandem
renewo urgere. Strumae, de quibus hic sermo est, non
inter eos, qui in verticibus montium habitant, inve-
niuntur, sed inter eos, qui pedibus montium versan-
tur. Aquae, quibus hi utuntur, sunt vel rivi vel fon-
tes; ad internum usum fontes plerumque praeferunt;
si ex solo, pede montium scatentes fontes, formantur
ex aquis inter strata atque rimas montium calcarearum
recurrentibus, dum hae aquae inter rimas montium
calcarearum descendunt, magnam ex lapide calcareo

³⁸⁸) *Wichmanni* Ideen zur Diagnostik. Hannover 1794. 1. Bd.

³⁸⁹) *J. et K. Wenzel* über den Cretinismus p. 104. ³⁹⁰)

Aug. Ernestus Iphofen de cretinismo, diss. inaug. pathol. Vi-
tebergae 1804. p. 36—38. In hocce libello auctor primum
mentem suam uberrime et acutissime, at breviter exprimebat,
hic primum *sensa animi* florem et incrementum acceperunt.

copiam acidi carbonici in se recipiunt, et valent nunc quantitatem partium terrearum solutam in se continere, non autem ab iis turpantur, sed semper quam maxime limpidae reperiuntur. Quanta sit vis partium terrearum, quas tales aquae solutas continent, patet ex massis stalacticis ex illis aquis se formantibus; simulac enim illud acidum carbonicum cum aëre atmosphaerico in contactum venit, se cum eo conjungit, et partes terreae, quas in concentrato statu solutas continere poterat, nunc praecipitantur. Eandem praecipitationem ex aquis, partibus terreis nimis impraegnatiss, etiam in corpore animali locum habere posse, neminem, qui propriam affinitatem acidi carbonici cum humoribus illius novit, fugiet. Hae partes terreae motu circûlari humorum in corpore distributae iis in vasibus eo spissiores se accumulanti, ubi in majori quantitate deponuntur, et respectu minoris vasorum reactionis propelluntur. (Vid. quae *Iphofenius ipse* in l. c. p. 115 — 115. §. 168 — 69. contra hanc suam sententiam egregie monuit.) Hoc in glandula thyreoidea praesertim ita se habere, docet ejus anatomia; copia enim sanguinis, quam haec glandula obtinet, major est eo ullius corporis organi; propterea fit, ut vasa ejus eo magis dilatata ac laxiora reddantur, praesertim dum etiam textura parenchymatosa glandulae expansioni vasorum resistere nequeat. Exinde tamen concludi non debet, me putare, totam colli intumescen-
tiam a partibus terreis produci, sed me eas tanquam causam considerare, qua excretio vasorum lymphaticorum eo potius supprimatur, quia viae excretoriae hujus organi ob suam subtilitatem distincte monstrari nondum adhuc potuerunt. Nonnulla ex experientia hausta documenta ad hanc sententiam confirmandam adducere operis pretium duco. Reperiuntur strumae et montes calcareae tophicaeque Bernae, Friburgi Helvetici, Lucernae ad Alam et Bexem in vallibus Sabau-

te, Pedemontii, Veltelinae, (Veltlin, Valtelin) apud
 esdam etc. Incolae Bernenses, Friburgenses et Lu-
 nenses strumis valde obnoxii sunt. Friburgi inco-
 maximam aquae partem ex fonte, qui in vicina
 cidina oritur et in rupe, ex qua scatet, multum
 ponit tophum, hauriunt. Canales, quae aquam in
 eos Bernenses ducunt, ab illo topho valde sunt in-
 statae, et vir fide dignus affirmavit *Coxio* ³⁹¹), se
 um colli intumescientiae obnoxium esse, quae intus-
 scentia praecipue hiemis tempore, ubi Bernae habi-
 et, augeretur, aestatis vero tempore, ubi aliis locis
 esaretur, quorum aquis non tanta insit tophi quan-
 s, diminueretur. Item narravit *Dux Pfeiffer*,
 nes aquas Lucernenses topho gravidas esse, unico
 cepto puteo, et quod habitantes circa hunc puteum
 ius strumis obnoxii essent, quam reliqui urbis in-
 ae; monstravit etiam ollam, in qua quotidie ad
 um usum aqua coquebatur, de qua simul referebat,
 a brevi tempore tanta incrustari tophi copia, quod
 per hebdomatem purgari deberet.“ Hoc etiam in
 troversiam adducitur ab *Iphofenio*, qui ita scriptum
 quit l. c. pag. 116 — 117. §. 172. „Wenn der Gene-
 Pfeiffer durch das Wasser in Freyburg kröpfig
 ed, so geschah' es also nicht darum, weil Kalktheile
 diesem Wasser in seinen Körper kamen, denn das
 te nicht seyn, weil er es vorher kochen liess;
 lern weil er es kochen liess, und weil es durch das
 hen seiner kohlensauren Luft verlustig und ein mat-
 Wasser wurde.“ Certior fit res relationibus cu-
 am chirurgi balneis Leuciae; hic refert: Se non
 particulas tophi ex strumis traxisse, et nonnullas
 ellas planas semii digiti magnitudinis ex struma
 urante. Porro eandem substantiam in ventriculis

) Briefe über den natürlichen, bürgerlichen und politischen
 Zustand der Schweiz. 3. Th. Zurich, 1792.

vaccinarum reperisse, item in strumis ulcerandis canum, qui istis in regionibus strumis etiam obnoxii sunt. Haec ille: plura non addo, cum reperiri possint in dissertatione modo citata.

Hic vero talis vir jam ex aliquot annis praeterlapsis omnes istas regiones, quarum incolae homalo praeprimis laborant, non solum peragravit, verum etiam hunc morbum accuratius et justo studio observavit, ejusque simul causas adhuc valde obscuras fusius et doctius explicavit: nec rediit re infecta sed multa divinitus expedivit, cum se totum daret a hocce negotium non supine perficiendum. Consilium quod tum ceperat, libri edendi, postea non abiecit: novam enim se paraturum esse editionem promissam quacum profundioris illius doctrinae thesauros augere et locupletaret. Quanta autem repetitis promissis *Iphofenii* expectatio, quanta spes inter doctos nostrae aetatis viros commota fuerit, ex multis operibus tunc editis, praecipue ex epistolis elucet. Denique re per plures annos protracta, ab *Iphofenio* excitata spe paene esset extincta. Postea tamen, anno millesimo octingentesimo decimo septimo, nescio quomodo id quod jam despererat, feliciter executus est, et reperi thesauri claros eruditione viros liberaliter participare fecit. Sententiis suis novam dedit formam, dissertationem, quam Vitebergae ediderat, basin fecit, multo misit, obscoeniora vel eiecit, vel interpolavit, rescissis aliis, aliis adjunctis, atque ita magnae molis opere felici successu exstruxit. Inter ipsas diversas opiniones illorum, qui de Cretinismo et de struma endemica nostris temporibus accuratiores notiones adferre conati sunt, veritas contradictionibus ab auctore obumbrata est, critice illas censuit, et partim docuit, unde singula acceperit. Verum audiamus *Iphofenium* ³⁹²⁾ nostrum

392) Der Cretinismus philosophisch und medicinisch untersucht

qui has difficultates, hanc opinionum ac monitorum varietatem et dissensionem conatus est diluere: verba ejus ipsa produco, cum non in omnium manibus sit eruditissimum opus, et plurimum inde lucis opusculo meo accedat:

„§. 69. Von dem Mangel an atmosphärisch - elektrischer Materie, als äussere Ursache endemisch herrschender Kröpfe.

In der Vorrede ist erklärt worden, dass Mangel an atmosphärisch - elektrischer Materie darum zu Entstehung epidemisch herrschender Krankheiten Veranlassung gäbe, weil eine Luft, die an elektrischer Materie sehr arm ist, nicht so viel reizende und stärkende Kräfte besitzt, als die Entwicklung und Fortdauer unseres Körpers und seiner Kräfte bedarf, und dass er daher in einen gelähmten und kraftlosen Zustand übergehe. Aus diesem ohnmächtigen Zustande in der thierischen Oeconomie entstehen aber nicht allein Stockungen und andere Regelwidrigkeiten. sondern auch Mangel an Reaction gegen schädliche Einflüsse etc.

Die Entstehung des Cretinismus ist aus Mangel an atmosphärisch - elektrischer Materie hergeleitet worden, theils, weil er, wie jene Uebel mit Lähmung beginnt, und in Lähmung und in Nichtentwicklung besteht; theils weil er auch wie jene in einer nicht elektrischen Luft herrschend ist.

Die entfernte Ursache endemisch - epidemisch herrschender Kröpfe ist ebenfalls Abspannung der Faser (siehe §. 51. und weiter), und die nächste Stockung der Flüssigkeiten; dass aber Mangel an atmosphärisch - elektrischer Materie, von diesen Stockungen und jener Abspannung eben sowohl die äussere Ursache sey, als wie die des Cretinismus, das ergibt sich nicht nur

daraus, dass sie da wirklich endemisch - epidemisch herrschen, wo es der Luft an dieser Materie fehlt, sondern auch aus dem Verschwinden derselben nach der Versetzung des Individuums in eine bessere Luft.

§. 70. Kröpfe und Cretinismus kommen mit einander in Verbindung vor.

Ueberall, wo die Kröpfe endemisch herrschen, da giebt es auch Cretinen, und mehr oder weniger, nachdem die Kröpfe mehr oder weniger herrschend sind. Darin stimmen die Nachrichten aller derjenigen überein, welche über den Cretinismus geschrieben haben, und ich überzeugte mich bey Untersuchung des Cretinismus sehr bald so sehr davon, dass ich später auf den Reisen, welche ich des Cretinismus wegen machte, in den Wohnsitzen zuerst meine Aufmerksamkeit auf die Häse richtete; sahe ich viel Kröpfe, so vermuthete ich auch Cretinen, und meine Nachsuhungen bestätigten meine Vermuthungen auch gewöhnlich.

§. 71. In einer jeden Atmosphäre, die an elektrischer Materie fortdauernd arm ist, sind die Kröpfe endemisch - herrschend.

Arm an elektrischer Materie ist jede eingeschlossene stockende Luft, wie z. B. in tiefen engen Thälern. Zweitens eine Luft, die mit mineralischen Dünsten geschwängert ist. Drittens die feuchte stockende Luft sumpfiger mit Waldung umgebener Gegenden und Wohnsitze.

§. 72. Dass die Kröpfe in tiefen engen Thälern ganz besonders endemisch - herrschend sind, ist früher schon angezeigt worden (siehe §. 5.) Mit mineralischen Dämpfen ist die Luft geschwängert: in der Halsbrücke bey Freyberg, bey dem Alaunwerke Schwembsal, in Neusol in Ungarn ³⁹³⁾, bey dem Schwefelbergwerke und

393) Reisebemerkungen über Ungarn. Von Samuel Bredetzky,

der Schmelze zu Grossarl³⁹⁴⁾ und in allen diesen Orten sind die Kröpfe endemisch - herrschend. Zwischen Waldungen herrschten endlich die Kröpfe zu Mannsbach in Thüringen³⁹⁵⁾ und in Lerbach am Harze.

§. 75. Berichtigung der in den Paragraphen 60. und weiter³⁹⁶⁾ gedachten Widersprüche.

Nicht darum also entwickeln sich in jenen Atmosphären die Kröpfe mit endemisch - epidemischem Charakter, weil die eine stockend, die andere mit mineralischen Dämpfen und die dritte mit Feuchtigkeit geschwängert ist, sondern weil es einer jeden dieser Luftarten an elektrischer Materie gebricht, und da eine jede dieser genannten Ursachen zureichend ist, eine Atmosphäre an elektrischer Materie arm zu machen, so können bey einer derselben Kröpfe herrschend seyn, ohne dass die zweite oder dritte hinzukomme.

Saussure konnte also mit Recht sagen, dass Feuchtigkeit nicht nöthig sey, um endemisch - herrschende Kröpfe hervorzubringen, und das Beispiel, welches er zum Beweis anführt: ville neuve d'Aosta, wo die Luft trocken sey, und die Kröpfe dennoch endemisch - herrschend wären³⁹⁷⁾, passt sehr gut hieher. Allein auch eine ungewöhnliche Hitze, wo *Saussure* glaubt, ist nicht nothwendig, um in einem Orte, wie ville neuve d'Aosta, die Kröpfe endemisch - herrschend zu machen, denn wo eine Luft so stockend ist, wie in dieser Gebirgsschlucht, da muss sie schon darum an elektrischer Materie höchst arm seyn, und da die Luft

evangelischen Superintendenten in beiden Gallizien etc. 394)
K. u. J. Wenzel der A. G. D. D. Abhandl. über den Cre-
 tinismus S. 97. 395) der Thüringer Wald besonders für
 Reisende geschildert von *K. E. H. v. Hoff*, Herzog. Sächs.
 Goth. Hofrath; zweite oder südl. Hälfte, 1. Heft S. 22. 396)
 Siehe des 2ten Bandes §. 8. 397) Siehe dessen Alpenreisen
 2. Bd. S. 480.

fast in einem jeden engen tiefen Thale stockend und deshalb an elektrischer Materie arm ist, darum sind die Kröpfe in den Thälern auch am meisten zu Hause.

§. 74. Unter den Dingen, unter deren Einfluss die elektrische Materie frey und wahrnehmbar zu seyn aufhört, sind im 72. Paragraphen auch feuchte Dünste genannt worden; gleichwohl sprechen *Barton* und *Marcard* von feuchten Gegenden, ohne daselbst Kröpfe zu finden, und daraus liesse sich folgern, dass feuchte Dünste einen solchen Einfluss auf die elektrische Materie entweder nicht haben, oder dass der Mangel dieser Materie die Ursache endemisch-herrschender Kröpfe nicht sey. Jenen Einfluss feuchter Dünste auf die elektrische Materie zeigt das Elektrometer, dagegen ist folglich nichts zu sagen, der zweite Widerspruch aber ist nur scheinbar, weil die Gegenden, welche zum Beweis genannt worden sind, nicht stockende sondern freie Luft haben, und weil sie nicht immer, sondern nur periodisch feucht sind. *Foderé* hat an seinem Orte schon den Gegenbeweis darüber geführt, er sagt: „Man kann mir den Einwurf machen, dass, wenn eine feuchte Luft die einzige wahre Ursache des Kropfs wäre, in allen feuchten Ländern Kröpfe existiren müssten, da man doch in denselben blos Geschwülste, Wassersuchten, kalte und anhaltende bössartige Fieber antrifft. In welchen Ländern wird man sagen, würde man so viele Kröpfe finden, als in jenen, wo Reis gebaut wird, wie in Vercellois und Ober-Novarrais u. s. w.“ Hierauf antworte ich, diese Länder sind Ebenen, wo der Wind von allen Seiten frey durchstreicht. Diejenigen, die den Reis bauen, sind entweder Bergbewohner, arbeiten hier einen, höchstens 2 Monate im Jahre, und empfinden während dieser Zeit den ganzen Einfluss der feuchten Luft auf ihren Körper; aber diese Zeit ist zur Hervorbringung eines vollkommenen Kropfes zu kurz, denn dazu wird

ein Aufenthalt in einem Lande, wo der Kropf endemisch ist, von 6 Monaten erfordert. Eine Geschwulst kann aber dennoch entstehen, die aber, sobald sie in ihr Vaterland zurückgekehrt sind, wo die Luft trockener ist, verschwindet. Auch für die Einheimischen dauert diese Feuchtigkeit nicht lange genug, um einen Kropf zu erzeugen, denn ausser dass der Wind allenthalben durchzieht, so bleibt nach der Reiserndte das Land offen, und wird geschwind durch die Winde und die starke Sonnenhitze getrocknet. In den Ländern aber, wo der Kropf endemisch herrscht, ist die Luft in den vier Jahreszeiten beständig feucht, ausgenommen, wenn ein kalter und trockner Wind eintritt. ³⁹⁸⁾

§. 75. *Barton* würde ohne Zweifel zum Aufschluss des Widerspruchs gekommen seyn, warum die Kröpfe in den Distrikten von Newyork endemisch herrschen, und nicht in den atlandischen Städten der Freystaaten, wenn er die Beschaffenheit der Luft und Gegend dieser letztern Städte untersucht, und mit der Beschaffenheit der Luft und Gegend in den Distrikten von Newyork hätte vergleichen können, wie es *Foderé* oben that. Neapel aber habe ich zwar nicht so feucht gefunden, als Newyork ³⁹⁹⁾; auch habe ich nicht gesehen, dass nur die Stockwerke vorzugsweise bewohnt wären; die Wintermonate hingegen, welche in nördlicher gelegenen Ländern, wegen der Kälte, die trocknesten sind, die müssen in Neapel im Durchschnitt die feuchtesten seyn, weil der Winter daselbst zum öftersten in einer anhaltenden Regenzeit besteht. Uebrigens hat Neapel auch Luftzug genug.

§. 76. Venedig und die Seeluft überhaupt ist auch schon einigemal genannt worden, um zu beweisen, dass eine feuchte Luft unschädlich sey, und dass endemisch-herrschende Kröpfe dadurch nicht hervorge-

398) Siehe 1. c. §. 63. 399) Siehe §. 62.

bracht werden könnten. Auf dem Wasser und auf den weitem Wasserflächen ist die Luft keineswegs in einem stockenden Zustande, stets ist daselbst Luftzug oder Wind; und unter diesen Umständen ist die Luft daselbst eben so reichhaltig an elektrischer Materie, als auf den Gebirgen. Wenn aber das Gegentheil eintritt, wenn die Seeluft durch Windstille, Nebel, anhaltendem Nebel oder warme Mittagswinde ihrer elektrischen Materie verlustig wird, so entstehen daselbst ungleich schneller als auf dem festen Lande die böartigsten Krankheiten mit dem Charakter der Entzündung und Auflösung. —

§. 77. Von Wassern, welche keine kohlen-saure Luft enthalten, als Ursache endemisch - herrschender Kröpfe.

Nicht überall, wo die Kröpfe endemisch - herrschend sind, ist die allgemeine Luft an elektrischer Materie so arm, als in jenen angezeigten Fällen, folglich mußte es noch eine zweite Ursache dieses Uebels geben. Nach den mühsamsten Nachsuchungen über diese zweite Ursache, bin ich endlich dabey stehn geblieben: sie in Mangel an Kohlensäure in den Wassern anzunehmen. Diese Idee ist nicht neu, allein sie hat bis jetzt mehr Widerspruch, als Beifall gefunden; indem ich sie also demnach wieder aufstelle, so geschieht es nicht ohne hinlängliche Gründe.

§. 78. Von kropferzeugenden Wässern überhaupt.

§. 80. Betrachtungen über die Ursachen, durch welche Wässer kropferzeugend werden.

Vorausgesetzt also, dass es kropferzeugende Wässer giebt, so fragt es sich nun; welche Wässer dies seyen, dann durch welche Beschaffenheit und Bestandtheile sie zu dieser Eigenschaft gelangen?

Ein berühmter Arzt sagt an seinem Orte, dass man die Ursache der Kröpfe ignorire; jedoch beschul-

dige man das Schnee- und Eiswasser, kropferzeugend zu seyn, *Hippocrates* habe ebenfalls von diesen Wässern schon so geurtheilt, weil sie durch den Frost der freien Luft verlustig würden; dieser Meinung entsprach ferner das endemische Herrschen der Kröpfe in den Alpen, wo es viel Schneewässer gebe, und noch mehr Wahrscheinlichkeit erlange sie durch die Relationen *Forster's*, indem bey der Reise um die Welt im Jahre 1775. der grösste Theil der Schiffsmannschaft kröpfig worden war, nachdem sie unter Anführung *Cook's* in das Eismeer gekommen und Eiswasser mehrere Wochen hindurch getrunken hätten.

§. 81. Diese Meinung von einer kropferzeugenden Eigenschaft der Schnee- und Eiswasser hat aber, wie ich schon bemerkte, sehr viele Widersacher gefunden, und die Einwendungen, welche ihr entgegen gestellt sind, haben sie bis jetzt noch durchaus zu keinem Credit gelangen lassen; um ihr also den Credit zu verschaffen, welchen sie doch zu verdienen scheint, ist es nöthig, mit Gründen und ausführlich von dem Gegenstande zu sprechen.

§. 82. In Freyberg, im sächsischen Erzgebirge, sind die Kröpfe endemisch-herrschend, gleichwohl lässt sich daselbst keine von den Ursachen auffinden, denen die Erzeugung dieses Uebels zugeschrieben worden ist, oder zugeschrieben werden konnte, denn diese Stadt liegt hoch, sie hat keine Sümpfe um sich herum, und ist weder mit Gebirgen noch mit nahen Waldungen umgeben u. s. w. Man sagt in Freyberg allgemein, das Wasser daselbst sey die Ursache dieser Kröpfe. Niemand konnte die Beschaffenheit dieses Wassers genauer kennen, als der Herr Professor *Lampadius*; und dieser sagte mir hierüber, „dass, wenn sehr reines Wasser kropferzeugend wäre, so müsse das Freiburger Wasser allerdings Kröpfe hervorbringen, denn bey Untersuchungen habe er es von erdigen, salzigen, metallischen und andern fremdartigen

Theilen so frey und so rein gefunden, dass er es wie destillirtes Wasser habe brauchen können.“

Auf eine Nachfrage über den Gehalt in kohlen-saurer Luft in derselben, erwiederte mir der Herr Professor, dass er mittelst Reagentien ebenfalls keine darin habe auffinden können. In Pirna verhält es sich mit den Kröpfen ohngefähr so wie in Freyberg, aber auch hier lässt sich keine von jenen früher gedachten Ursachen auffinden, um diese Kröpfe davon ableiten zu können; so frey ist die Situation der Stadt Pirna zwar nicht, wie jene der Stadt Freyberg, allein sie ist auch keineswegs so beengt, dass die Luft stockend seyn könnte. Von dem Wasser der Stadt Pirna sagte mir der Herr Apotheker *Abendroth* daselbst eben das, was der Herr Professor *Lampadius* von dem Wasser zu Freyberg gesagt hatte, es sey von fixen Theilen so frey, wie destillirtes Wasser, und auch an kohlen-saurer Luft sehr arm.“

§. 83. Dieser Mangel an kohlen-saurer Luft in den Wässern zu Freyberg und Pirna wäre also, jenen vorausgegangenen Bemerkungen nach, die einzige Ursache, wovon die in diesen zwei Städten endemisch-herrschenden Kröpfe herzuleiten wären. Est ist daher nothwendig zu untersuchen:

Erstens: ob die Kröpfe auch anderwärts, wo die Wässer nicht kohlen-sauer sind, endemisch herrschen?

Zweitens: ob es in den Gegenden keine Kröpfe gebe, wo die Wässer mit Kohlensäure hinlänglich gesättiget sind?

Drittens: wiefern der Mangel an Kohlensäure zu Entstehung der Kröpfe beytrage?

§. 84. Von den Ursachen, unter deren Einfluss Wässer an kohlen-saurer Luft arm sind.

Wenn man die Ursachen kennt, unter deren Einfluss ein Wasser an kohlen-saurer Luft arm ist, so kann

zu sich von seiner Beschaffenheit in dieser Hinsicht einen Begriff machen, ohne eine besondere Prüfung halb angestellt zu haben, und da dieses letztere selber möglich ist, so wird es hier an seinem Orte seyn, die Ursachen, so weit sie bekannt sind, erst zu nennen.

§. 85. An kohlensaurer Luft sind alle diejenigen Wasser arm, welche über und durch Gebirge und Ländern ihren Lauf nehmen, die von Granit, Gneuss, Mergel, manchen Schieferarten und Sandstein sind. Aber auch diejenigen, welche durch Erzlager, durch Manschiefer und Steinkohlenflötze dringen, so wie auch solche, die sich mit Stollénwässern vermischen, oder Eisentheilchen in Substanz mit sich führen, und endlich ein jedes Wasser, welches durch Frost in festen Zustand versetzt, oder mittelst Feuer erwärmt worden ist etc. etc. §. 86—92.

§. 93. Ob die Kröpfe da endemisch vorkommen, wo es den Wassern an kohlensaurer Luft gebricht?

Die Gebirgsart, nämlich der Boden um Freyberg herum, ist Gneuss, welchen hin und wieder mehr oder weniger mächtige Erzadern durchstreichen, das Wasser daselbst an kohlensaurer Luft wirklich sehr arm. Kröpfe herrschen mit endemischem Charakter daselbst. In mehreren Oertern des sächsischen Erzgebirges findet man dieselbe Gebirgsart in anderm Grade, das Wasser ist daselbst ebenfalls matt, und Kröpfe herrschen daselbst mit demselben endemischen Charakter, wie in und um Freyberg, unter diesen Oertern will ich insbesondere Schwarzenberg und Waldsassen nennen.

In dem Dorfe Halsbrück und anderen nahe gelegenen Ortschaften herrschen die Kröpfe ungleich allermehr als in Freyberg, diese Dorfschaften bringen aber weniger hier in Anschlag, weil ausser dem

Wasser auch die Beschaffenheit der Luft daselbst zu Kröpfen disponirt.

Um Pirna herum, wo es sich mit den Kröpfen verhält wie in Freyberg, und wo das Wasser an kohlen-saurer Luft ebenfalls arm ist, liegt Sandstein. Das Dorf Mund in Wallis liegt sehr hoch, in einem stockenden Zustande kann die Luft daselbst nicht kommen, und doch sieht man in diesem Dorfe viele Kröpfe, das Wasser daselbst ist an kohlen-saurer Luft wirklich arm, wie der Geschmack es sogleich zeigt, die Gebirgsart der Gegend ist Granit.

Herr Professor *Hacquet* sagt in den Beschreibungen seiner Reisen durch die Karpathen: „Wo Wässer über Granitfels, Porphyr, Quarz, Thonschiefer u. s. w. laufen, da sind Kröpfe und Cretinen einheimisch, nirgends wo die Wässer Kalkstein zum Lager haben.

Herr Dr. v. *Vest* in Klingenfurt hat mich mündlich und schriftlich versichert, dass er Cretinen und Kröpfe nur zwischen Granitgebirgen gefunden habe zum Beweis nannte er das Afritzerthal und das Levanththal.

Die ganzen langen Gebirgsstrecken, wie sie sich vom südlichen Fusse des Soemmerings bis Klagenfurt ausdehnen, sind von Granit, und zwischen ihnen herrschen die Kröpfe allgemein, hin und wieder giebt es daselbst auch Cretinen.

Die Steinart, woraus die Gebirgskette von Yvre an bis zur Stadt Aosta besteht, ist Schiefer, Gneus und Granit. Um die Stadt Aosta herum bestehen die Gebirge aus Granit, desgleichen auch diejenigen der kleinern Seitenthäler, dort überall sind Kröpfe mit dem Cretinismus einheimisch. Folgendes sagt *Foder* hierüber: „Ich habe in der Maurienne eine ziemlich Menge Wasser untersucht, dessen sich die Einwohner sowohl die kröpfigen, als die nichtkröpfigen, zum Trinken bedienen. Das Resultat davon ist folgendes: da

Wasser in der Stadt St. Jean, und in den Gemeinden Sulpice und St. Remi, wo man weit mehr Kröpfige Cretinen antrifft, als in den übrigen Theilen der Maurienne, ist weit reiner; das Alkali erzeugt in demselben weit weniger Bodensatz, und durch Abdämpfen bleibt weit weniger Residuum, als in dem Wasser der Maurienne, wo man keine Kröpfigen und Cretinen findet. Es konnte auch nicht anders seyn, denn der grösste Theil des Wassers, das die Erstern, die Kröpfig sind, trinken, haben sie entweder aus dem Saïsse Arc, oder aus Wasserquellen, die fast alle aus Granitfelsen entspringen, die ihr Land nahe umgeben.
400)

Pallas leitet die in dem Dorfe Motmor endemisch vorkommenden Kröpfe von dem dasigen Wasser her, welches mit Mergel und Eisentheilen angeschwängert sey.

Die Thäler von Aure und Bareges, in welchen Kröpfe und der Cretinismus endemisch herrschen, sind mit Granitfelsen umgeben. 401)

§. 94. Von den Wässern in und um Dresden. In Dresden und in den Dörfern des plauischen Landes sieht man so viele Kröpfe, dass man den Einfluss der örtlichen Ursache durchaus nicht verkennen kann.

Die Ringmauern der Stadt nebst den andern Festungswerken, wie sie noch vor wenig Jahren die Stadt umgaben, und die Lage der Stadt kann schon einigen Theil daran haben, denn von allen Seiten mit Gebirgen, oder wenigstens steigenden Anhöhen umgeben, hier der vollkommne freye Luftzug nicht Statt, sondern in einer freyen Fläche, oder auf einer freyen Höhe; jedoch sind die Gebirge, welche dieses Thal

40) l. c. §. 40. 401) *Ramond de Carbonières* Reise nach den höchsten französischen und spanischen Pyrenäen. Aus dem Französischen. Strasburg 1789. 5tes Capitel.

umgeben, nicht sehr hoch, und das Thal selbst ist keineswegs enge; die Luft kann daher hier wenig in einen stockenden Zustand gerathen, und um so weniger da durch den Elbstrom ein fortdauernder Luftzug durch dasselbe erhalten wird. Mehr aber als die Luft, kann der grössere Theil der hieher geleiteten und zum ökonomischen Bedarf dienenden Wasser auf die hier herrschenden Kröpfe Einfluss haben.

§. 95. Der grösste Theil des nach Dresden zur ökonomischen Bedarf geleiteten Wassers wird hinter dem Dorfe Plauen aus dem Weisseritzflusse gefasst. Dieser Fluss nimmt in Böhmen aus Urfelsen seinen Ursprung, und die Gebirgsart zwischen und über welcher er bis Plauen seinen Lauf nimmt, ist auch Urfels oder Granit. Bey Potschapel, Burg und Dehlen, Dörfern welche der Weisseritz zur Seite liegen, liegen mächtig Steinkohlen - Flötze, und Vitriolwerke sind daselbst ebenfalls im Gange, und verunreinigen das Weisseritz Wasser.

Hier vereinigen sich also mehrere Ursachen, unter deren Einfluss ein Wasser an kohlensaurer Luft arm ist und arm wird. Erstens nämlich entspringt die Weisseritz keineswegs aus einem Boden, aus welchem sie an kohlensaurer Luft reichhaltig hervorgehen kann. Zweitens nimmt sie ihren Lauf durch ein Bette, in welchem das Wasser der kohlensauren Luft verlustig wird wenn es ja welche enthält. Drittens, geschieht die Fassung dieses Wassers für die Stadt zu entfernt von seinen Quellen; denn ehe es bis zum Dorfe Plauen kömmt, hat es schon mehrere Meilen zu Tage gelauften, und zum Theil mit einem breiten Spiegel bey einer geringen Tiefe, und endlich vereinigen sich auch die Stollenwässer jener Steinkohlen - Gruben mit ihm. Theorie und Erfahrung zu Folge, muss das Weisseritz - Wasser, wie es in die Stadt kommt, an kohlensaurer Luft also nothwendig arm seyn, und bey eigent-

deswegen angestellten Versuchen habe ich es auch wirklich so gefunden.

§. 96. Von Deuben bis Tharand, früher also, als durch Wasser von den Vitriolwerken und Steinkohl-Gruben mit fremden Theilen geschwängert wird, räth es sich durch den Geschmack, als ein zwar saures, aber auch als ein weiches, mattes Wasser, und mittelst Reagentien entdecken sich ebenfalls wenig Bestandtheile darin, noch weniger aber flüchtige, dieser geringe Antheil an flüchtigen Bestandtheilen besteht vielmehr in hepatischer als in kohlensaurer. Später nachdem sich Wasser aus jenen Vitriolwerken und Steinkohlengruben in die Weisseritz ergossen haben, wird das Wasser an fremden Theilen reicherhaltiger, aber nicht besser. Vor einigen Jahren wurde der Herr Apotheker *Engelbrecht* veranlasst, Weisseritz-Wasser zu untersuchen, und das Resultat dieser Untersuchung bestätigt das Gesagte ⁴⁰²⁾ etc.

§. 102. Resultat aus dem Vorhergegangenen in Bezug auf die Kröpfe in Dresden selbst und den angränzenden Ortschaften. Wenn die hiesigen Wässer auf die hier herrschenden Kröpfe Einfluss haben, sofern sie an kohlensaurer mehr oder weniger arm sind, so müssen diese Kröpfe da vorzüglich herrschen, wo die Einwohner auf mattes Wasser beschränkt sind. Wie sich aus dem Vorhergegangenen ergibt, ist das Weisseritz-Wasser von den hiesigen Wassern dasjenige, welches am wenigsten Kohlensäure enthält. In den Dörfern des plauenischen Grundes sieht man so viele Kröpfe, dass man ohne Bedenken daselbst endemisch-herrschend nen-

⁴⁰²⁾ Siehe Anzeigen der Königl. Sächs. Leipziger öconomischen Societät. Von der Ostermesse 1809. Untersuchung und Bestimmung der Bestandtheile des Weisseritzwassers.

nen kann. Sehr viel Kröpfe, selbst bey den Kindern sieht man in Friedrichstadt, und mehr als in der übrigen Altstadt und Neustadt sieht man sie in der Wilsdruffer-Vorstadt. Die Wilsdruffer-Vorstadt, die Friedrichstadt und die Dörfer des planischen Grundes sind aber auch mehr als andere Distrikte der Stadt und andere nahe herumliegende Dörfer auf das Weisseritzer Wasser beschränkt.

§. 105. Von dem Leubnitzerwasser wird nur eine einzige, aber starke Röhre nach der Stadt geleitet, und das Wasser derselben bleibt nicht in einem Stadtviertel sondern wird hin und wieder einzeln vertheilt: hier also kann sein Einfluss auf den menschlichen Körper im Allgemeinen nicht wahrgenommen werden. Alle in den Dörfern Leubnitz, Strehle, Prohlis, Reik, Sedlitz, Lockwitz und mehr andern, wo das Wasser von derselben Qualität ist, als das des heiligen Brunnens, da findet man nirgends Kröpfe, und fragt man darnach so heisst es, „nein, Kröpfe giebt es hier nicht, wir haben hier keine Art.“

§. 104. In Sedlitz fragte ich einen Bauer, ob es in dem Dorfe kröpfige Menschen gebe? Nein, erwiederte er, die haben wir hier nicht, denn wir haben ein gutes Wasser, das von den Maxner Gebirgen ⁴⁰³⁾ her kommt, das lässt keine Kröpfe entstehen. Derselbe Bauer nannte mir jedoch als Seltenheit und Ausnahme ein Mädchen in dem Dorfe, welche Ansatz zu einem dicken Halse habe. Ich suchte dieses Mädchen auf, sie war ohngefähr 20 Jahr alt und keineswegs gebrechlich gewachsen, allein ihr äusserer Habitus war derjenige wie er zu Scrofeln disponirt, sie hatte schlaaffe Faserhaut war vollsaftig und hatte rothes Haar. Der Kropf dieses Mädchens war wenig sichtbar, wenn sie aber sprach

405) Diese Gebirge bestehen aus mächtigen Kalksteinflötzen.

trat die Schilddrüse mit der Grösse einer halben Falschennuss hervor. Auf meine Frage an die Mutter nach der Ursache des Kropfs ihrer Tochter, gab diese zur Antwort, dass das Mädchen von Kind an bis jetzt die üble Gewohnheit an sich habe, den Kopf bey jeder Gelegenheit als beym Schreien, Lachen, Singen u. s. w. rückwärts zu beugen, und dadurch sei ihr dicker Hals allmählig entstanden. In je- andern genannten Dörfern nannte er nur in einem dem andern eine alte Mutter als kröpfig.

§. 105. Die Dörfer des plauischen Grundes haben weniger freyen Luftzug, wie Strehle, Sedlitz, Prohnitz u. s. w., und diess kann allerdings als eine Beförderung der Kröpfe daselbst angesehen werden; allein Prohnitz liegt auch in einem Grunde, und zwischen Wohnhäusern sind soviel Bäume angepflanzt, dass die Kröpfe zwischen den letztern gleichsam verborgen seyn, und doch sieht man daselbst die Kröpfe keineswegs endemisch herrschen. Die Friedrichstadt wiederum liegt sehr frey, und doch giebt es da besonders viel Kröpfe. Aus den Beobachtungen, wie sie hier zwischen Kröpfen und Wässern gemacht werden, ergiebt sich also durchaus kein Widerspruch gegen die Meinung *Forster's*, *Frank's* und des *Hippocrates* u. s. w. dass Wasser, welche durch Steinkohlenflötze und Erdgas bedrungen, werden nach bekannten Gesetzen eben- so ihrer kohlensauren Luft verlustig.

§. 114. Ob die Kröpfe da weniger endemisch herrschen, wo die Wässer hinlänglich kohlensauer sind?

Diess ist die zweite zu einer genauen Prüfung im ersten Paragraph aufgeworfene Frage, wie aber im zweiten Paragraphen diejenigen Ursachen erst in Betrachtung gezogen worden sind, unter deren Einfluss Wasser an kohlensaurer Luft arm ist, so werde ich hier die Ursachen erst angeben, unter deren Einfluss ein Wasser an kohlensaurer Luft reichhaltig ist.

Der Beweggrund zu diesem Eingange ist derselbe, welcher dort aufgestellt worden ist, um nämlich von dem Daseyn dieser Ursachen auf das Daseyn kohlensaure Luft in den Wässern schliessen zu können, wenn man letztere nicht selbst untersuchen kann.

§. 115. Von den Ursachen, unter deren Einfluss Wässer mit kohlensaurer Luft sich schwängern.

Ich kann dieser Ursachen nur fünf nennen; vielleicht giebt es deren mehr, aber mir sind sie nicht bekannt.

Erstens: Kiese, welche ausser Schwefel und bisweilen auch andern mineralischen Theilen, Kalkstein oder vielmehr Kalkerde zur Basis haben.

Zweitens: Kalkstein selbst, wie er entweder als Gebirge dasteht, oder unterirdisch als Flotz liegt. Hierher gehört der Marmor, welcher ein feiner Kalkstein ist, so wie auch derjenige Alabaster, welcher Kohlensäure zum Bindemittel hat. Gyps hat ebenfalls Kalkerde zur Basis, da diese im Gypse aber nicht durch Kohlensäure, sondern durch Schwefelsäure gebunden ist, so gehört er nicht hieher.

Drittens: Kalkerde an sich.

Viertens: Kreidelager.

Fünftens: reine Dammerde, noch mehr aber Moorboden.

§. 116. Aus jenen ersten Stoffen, aus den Kiesen nämlich, resultiren die Mineralquellen, welche nach Verschiedenheit der Mischungsqualität dieser Kiese, auch ihren Bestandtheilen, ihrer Stärke und ihren Eigenschaften nach verschieden sind. Von dieser Art sind die Karlsbader, Töplitzer, Eger, Pyrmonter und ähnliche Mineralquellen. Dergleichen Quellen kommen im Allgemeinen nicht oft vor, und in Hinsicht ihrer Stärke und Eigenschaften werden sie als Arzneien, aber nicht zum ökonomischen Gebrauch verwendet.

Kalkstein, Kalkerde und die andern genannten

Dinge geben aber keine Mineralwässer, selbst nicht einmal Sauerlinge, sondern sie schwängern die Wässer nur mit einer solchen verhältnissmässigen Quantität kohlensaurer Luft, dass ein gutes Trinkwasser daraus wird. Dergleichen Wässer kommen ungleich öfterer und allgemeiner vor, und auf sie bezieht sich eigentlich, was in den folgenden Paragraphen gesagt wird. So prädominirt in der Provinz Lancaster ⁴⁰⁴) in Pennsylvanien Kalkerde, so in der Ober-Maurienne ⁴⁰⁵), so in Gallizien, so über Klagenfurt hinaus, so in Dresden in der Stadt selbst und den übrigen Vorstädten, und in keinem dieser Orte ist der Kropf gesehen worden.

§. 142. Welches können oder müssen aber die endlichen Folgen des täglichen Genusses eines matten Wassers für uns seyn?

Diese Folgen werden zwar verschieden seyn, nach Verschiedenheit des Wassers, des Individuums, des Maasses, in welchem das Wasser genossen wird, und der gleichzeitig einflussenden Nebenursachen. Die stärkere Faser des Mannes wird durch das Maass einer erschlaffenden Ursache noch nicht abgespannt, welchem die schwächere Faser des Weibes schon nachgiebt. Ferner derjenige, welcher seinen Durst mit gegohrnen Getränken befriedigt, ist den Nachtheilen eines weichen Wassers weniger ausgesetzt, als ein anderer, dessen tägliches Getränk ein solches Wasser ist.

Wer endlich in einer sehr elektrischen reizenden Luft lebt und reizende nahrhafte und leicht verdauliche Dinge zu seiner Kost hat, und nicht als Sklav der Nothwendigkeit und des Mangels unter stetem Drucke lebt, bey dem wird der Einfluss eines weichen Wassers ebenfalls langsamer und geringer wahrnehmbar

⁴⁰⁴) Siehe Barton l. c. S. 52. und 53. ⁴⁰⁵) Siehe Foderé l. c. §. 40.

seyn, als bey dem, der in einer stockenden Luft athmet, von einer schweren wenig nährenden Kost lebt und vom Drucke des Schicksals stets gebeugt ist.

§. 143. Wo der Einfluss eines weichen Wassers namhaft ist, und wo durch Nebendinge nicht ersetzt oder wieder verbessert wird, was ein solches Wasser verdirbt, da können die endlichen Resultate keine andern seyn, als unvollkommne Verdauung und Magenbeschwerden, fehlerhafte Se- und Excretionen, schlechte Hautfarbe, Hautübel, Drüsengeschwülste, Wechselfieber, Flüsse, gichtische Uebel, chronische Kopfschmerzen, Schwäche und Stumpfheit der Sinne. Diese Uebel lassen sich aber nicht allein aus dem Einfluss eines matten Wassers theoretischerweise ableiten, sondern sie herrschen mit den dadurch erzeugten Kröpfen auch wirklich gleichzeitig, wie früher an verschiedenen Orten schon bemerkt worden ist.

Diesen genannten Krankheiten liegen zwei Ursachen zum Grunde, manche von ihnen entstehen, weil eine andere vorausging, wie z. B. die Hautübel zuweilen aus fehlerhafter Hautausdünstung; den meisten aber geht Schwäche, Mangel an Contractibilitätsvermögen im Nervensysteme als wesentliche Ursache voraus, denn dieses System ist die Feder zu jeder Lebensäusserung des ganzen Körpers. Wenn es ihm an Energie gebricht, so kann auch keine Verrichtung der ganzen Maschine vollkommen oder normal geschehen, und hieraus entstehen von Stufe zu Stufe Abweichungen, aus welchen für das Ganze endlich namhafte Fehler und Mängel erfolgen.

§. 144. Alle jene genannten Uebel entstehen also nicht darum aus dem Genusse eines weichen nicht kohlensäuren Wassers, weil ein solches Wasser als eine wirkliche Krankheitsursache activ wirksam ist, sondern weil dasselbe die reizende, belebende und stärkende Kraft nicht hat, die es haben muss, wenn es

unserm Körper, seiner Gesundheit und seinen Kräften entsprechen soll, und folglich ist es passiverweise auf uns nachtheilig wirkend, und auf diese Weise entstehen unter dem Einflusse desselben auch Kröpfe.

§. 145. Früher ist bemerkt worden, dass die Gefässe der Schilddrüse, und zwar die Arterien, ihren normalen Durchmesser durch das Contractibilitätsvermögen der Nerven behaupten, welche in demselben kreisförmig sich verbreiten, die Venen aber durch eine ihnen eigenthümliche elastische Kraft. Wenn daher der Andrang vom Blute die Gefässe der genannten Drüse auszudehnen droht, so ist es diese elastische Kraft der Venen, und das Contractibilitätsvermögen der Arterien, durch welche beide Gefässe ihren normalen Durchmesser behaupten.

Einzelne Theile des Körpers können aber nicht normal belebt seyn, wenn es dem Körper im Allgemeinen an Energie fehlt, und Energie kann sich da nicht erhalten, wo der Ersatz der Kräfte dem ununterbrochenen Verluste davon nicht entspricht, wenn daher ein gutes Wasser für unsere Gesundheit und Kräfte ein eben so grosses Bedürfniss ist, als eine gute Luft, so kann derjenige an Energie sich nicht gleich bleiben, welcher von einem schlechten Wasser lebt: mit diesem Minus an allgemeiner Kraft tritt Schwäche mit Contractibilität und Elasticität in den Fasern zugleich ein, und dass hieraus für die Drüsen sehr bald nachtheilige Folgen entstehen müssen, das ergiebt sich aus der Betrachtung der Menge, der Feinheit und dem Gewebe der Gefässe, woraus die Drüsen bestehen. Da in die Schilddrüse aber besonders viel Blut dringt, und da dies wegen der Nähe des Herzens mit mehr Gewalt geschieht, als der Andrang desselben in andere Drüsen, so muss eine regelwidrige Vergrösserung oder kröpfige Anschwellung derselben auf den Genuss eines saden Wassers auch viel eher wahrnehmbar werden,

als andere regelwidrige Erscheinungen in dem übrigen Körper aus derselben Ursache.

Porro multa hic disputari possent, sed quis haec brevi commentario perstringeret, quae non nisi justo volumine explicari possunt? Paucula igitur haec ad doctrinam *Iphofenii* intelligendam ex magno et pleno acervo deprompsisse sufficiat. — Ut *Meyeri* denique sententiam huc facientem recenseam, dicit is in dissertatione inaug. med. de strumis etc. Hannoverae 1817. p. 11 — 19. „Quam primum in Buckovina commorari coëpi, haec duo tanquam praecipua alte animo meo inhaerebant. Primo, quod struma indigenas tantum affectos vidi, secundo, si inter alienigenas, sive, quod hic idem est, inter immigrantes Germanos aliqui ea correpti fuerunt, mulieres tantum, virilis vero sexus aut rarissime hoc malo affectus aut plane immunis mansit. Haec diversitas diu multumque cogitationes meas exagitabat, cum diversitas talis in aliis montanis observata a me non fuerit, hic mihi scintilla veritatis latere videbatur, nam ex inquisitionibus majoris acquirendae claritatis causa institutis, e. c. de diversa vivendi et vescendi ratione inter indigenas et alienigenas, de majore assuetudine priorum omnia ardua cujuscunque generis perferendi et caet. nulla major lux affulsit, nam immunitas virorum germanicae nationis a struma scopulus erat, in quem iterum iterumque impeggi.

Postremo omnem vestiendi modum utriusque gentis serio, assidue et diligentissime examinare coëpi, et haec fere sunt, in quae incidi. Omnes de plebe hujus regionis, praecipue vero, qui montuosam partem incolunt et quidem uterque sexus aut nullam aut nimis exilem fasciolam in collo gestant, quam praeterea, quotiescunque labori vel modice tantum vires adstringenti vacare incipiunt, religant et removent; viri insuper et foeminae integro anno, sive frigus sit brumale, sive

aestus caniculae, pellibus ovillis, nequaquam rhemonibus dicendis aut panno crasso laneo, usui proprio per familias texto, totum corpus et membra involvunt, collum et magnam pectoris partem nudam relinquentes, mulieres germanicae gentis in denudatione colli et pectoris a more indigenarum quoque non recedunt, aut levissime, dicis quasi causa, in horrida ob frigora regione pectus lautitia tantum quadam et quasi tela araneae levissime contegunt, viri vero aliter, sentientes ingrata frigora nec ullo more aut consuetudine prohibiti, eo magis fasciis et pannis collum caute et diligenter obtegunt, quo magis frigus augetur.

Attentio ad hanc diversitatem in vestiendo corpore reflexa seu potius in more nonnulla membra nudandi rationem sufficientem tandem suppeditavit ortum strumae cognoscendi, vix enim amplius dubius haesitavi, auram asperam nudatum collum afficientem solerter tecto ac vestito reliquo corpore momentum causae progeneratae strumae omnino esse, neutiquam vero aut solum aut unicum, cum in aliis locis servata plane eadem vestiendi ratione struma tamen non occurrat; mallem igitur hoc momentum causam occasionalem, ut loqui solemus, dicere.

Experientia multiplici et vix non quotidiana abunde docemur, quae et quanta nocumenta hoc vestiendi et simul nudandi more corpori inferantur, nempe post refrigerationem colli protinus aut catarrhi et hi subinde periculosissimi ac exitiales, cynanche, nec non diversae aliae colli inflammationes subsequuntur, et his enumeratis morborum malis potissimum indigenas utriusque sexus nec non mulieres e germanorum gente correptas observavi et mecum complures alii, qui alienum a se non putarunt morborum grassationes attentius pensitare. Non potui itaque non inducere, quod nec obreptionis nec temeritatis vitio adnumerandum spero eo plane modo, ut paullo altius de aliis morbis

dixi, ab hac refrigeratione colli strumam quoque ortum suum habere, cui perversa vestiendi ratio januam quasi aperit. Opinioni huic eo firmitus inhaerere coepi, non ex coeco amore erga foetum proprium, sed quia tot aliis observationibus suffultam cognovi et bis ejus veritatem extra omnem dubitationis aleam positam vidi.

Puella juvenis ex Dorna angina tonsillari tam vehementer se correptam sensit, ut ei periculum suffocationis immineret; cum summa anxietate ad ferendam medelam arcessitus fluctuationem in tonsillis manifesto observavi et ideo sine omni haesitatione incisionem institui, qua peracta omne periculum minax quasi evanuit. Nihilominus querebatur tamen post felicem anginae sanationem de dolore ei antehac ignoto, et eo quidem non acuto, molesto tamen et per vices intermittente, qui profundius supra sternum tamen et utramque claviculam sedem suam in collo fixerat; epithemata rite et sedulo adhibita desiderato et sperato effectu carebant et paullo post dolore semper perdurante intumescencia in latere sinistro glandulae thyreoideae apparuit, quae sensim aucta strumam prodidit.

Alia mulier ex Gura-Homora, desiderans a dolore per longius tempus ei in collo molesto, etsi non admodum gravi, quam primum liberari, opem petiit, dictitans omnia remedia empirica, quam diligentissime adhibita, nequicquam profuisse; ex praesentia quorundam phaenomenorum et indiciorum syphilim latere suspicabar ac juxta leges artis congruis remediis malum latens eradicare conabar, verum medicamina hujus generis eo minus prodesse poterant, cum nullus morbus venerereus adfuerit, sed struma incipiens, quae paullo post manifestius apparuit.

Utrobique aëgris confitentibus refrigeratio praecesserat, prior, nempe puella ex Dorna, post saltationem aestuans ac nonnisi levissimo vestitu tecta ves-

pertinis horis in rēditu domum, altera mulier, videlicet ex Gura-Homora, in deambulatione usque ad seram vesperam protracta, refrigerationem perpessae sunt.

Persuasus de fonte, ex quo malum detestabile strumae pullulat, rite detecto solertissime sciscitabar ex his, qui struma a longiore tempore vexabantur, quas noxas brevius accusarent, cognovi ex consonis assertis dolorem colli et eum quidem diuturniorem et, si ad modicum tempus remisisset, semper iterum redeuntem praecessisse et hunc omnino effectum refrigerationis fuisse nemo negabit, quamquam perperam erysipelas esse crederetur.

Ex his signis autem, quod dolor iste profundius in collo sedem suam fixerit et deglutationem, spirationem ac loquelam parum tantum impediverit, concludere oportebat in glandula thyreoidea inflammationem adesse, cujus causa nulla alia quam refrigeratio esse possit.

Ne quis dubiam hanc opinionem reddi putet, quod refrigeratio colli non ubique eundem effectum sortiatur sed praecipue tantum in his vallibus Buckovinensibus, scio bene etiam in hac ipsa regione, ubi plana est, inflammationes thyreoideae, strumam antecedentes, vix unquam existere, sed difficultates omnes disparebunt, pensitatis tempestatis mutationibus vix non subitaneis et varia aëris temperie. Nempe aura maxima ex parte per totum annum frigida, humida, pluviosa et nebulosa reperitur, ad initium aestatis quidem subinde gratissima et valde amoena, sed procedente aestate calor in his vallibus sive per repercussionem radiorum solis ab altorum montium parietibus, sive per celerem calorigi processu chemici explicationem in tantum tamque torrentem aestum augetur, ut non tantum multo major et intolerabilior, quam in hac ipsa regione ubi plana est, sentiatur, sed vel minimus motus corporis sudoris pro-

fusionem excitet. Jam vero aestus intolerabilis, verba sunt celeb. *Ackermann* ⁴⁰⁶), in his vallibus causa est, quae plurimum ad morbos endemios harum vallium facit. Eidem opinioni adstipulatur celeberr. *Haller* ⁴⁰⁷) adjiciendo hanc adhuc observationem, praeter summum aestum non tantum vaporibus plurimis atmosphaeram impraegnari, sed etiam densis nebulis, pelluciditate carentibus, valles repleri.

Post solis occasum oritur revera in vallibus Buckovinensibus flatus venti vehemens et frigidus, qui regionibus tam calidioribus quam frigidioribus communis quidem esse solet, verum tamen in vallibus multo vehementior, frigidior quam alibi deprehenditur, eum namque aër in sylvarum umbris et montium cacuminibus subtilior et vel ideo etiam frigidior calorico exuit, fluminum et annium decursus auget, ut in angustia vallium coarctus majore cum impetu ruat.

Imo mutatio temperiei subitanea est et saepius tanta, ut in media aestate plantae teneriores marcidæ langueant, aliae arescant, homines vero incauti variis ex refrigeratione ortum ducentibus malis exagitentur.

Glandula thyreoidea ob situm profundiorē infra colli superficiem et ob paucitatem nervorum ei se inserentium, nonnisi fortioribus incitamentis irritatur; hinc fit, ut in regione plana, quia subitae et vehementes temperiei mutationes absunt et vesperi gratus tantum et amoenus favonius et zephyrus aestui diei succedunt, et si collum denudatum sit, tamen ei nullum grave nocumentum accidat.

Per flatum venti vero in his montuosis regionibus glandulam thyreoideam noxie excitari et affici, facile sibi persuadebit, quisquis attendit eam saepius per ra-

406) *Ackermann* von den Cretinen pag. 94. 407) *Haller* de vento rupensi in comment. nov. Tom. I. pag. 213.

am arteriae cum musculo cutaneo colli cohaerere; et
e ego aliquoties in demortuis ex angina glandulam
thyroideam magis minusve inflammatione correptam
prehendi.

Confirmat porro opinionem major copia strumati-
um in vallibus ab oriente versus occidentem proten-
sae, partim ob earum situm, partim ob radios solis a
montibus repressos, partim denique ob flatum ven-
tum nullo modo impeditorum et ideo totam vallem
perime permeantium. Celeb. *Saussure* ⁴⁰⁸) refert
observationes, ob tanti viri merita omnino auctoritate
valentes, quae meae opinioni mirum quantum favent;
sit nempe: ad Rhodanum fluvium, cujus utraque ripa
solis gaudet, Cretinismus ⁴⁰⁹) ad ripam australem
multo frequentior quam ad septentrionalem conspici-
tur; causam vero in radiis solis perpendiculariter de-
scendentibus et in eorundem percussione a montium
pedibus repetendam esse, autumat.

Calor autem et is quidem humidus vim praecipuam
in corpora animalium cumprimis in vasa omnis gene-
ris exercit, circulationem tum sanguinis tum aliorum
humorum accelerat, vasa ipsa autem extendit et dila-
ta ut pro ratione aucti caloris humores secernendi
maiori copia affluant. Frigus vero oppositos effectus
in corpore animali producit, circulationem humorum
retardat et minuit, excretionem vero reddit parviores.

Dum autem corpus post calorem subito frigore ad-
ducitur, vasa spastice constringuntur, omnis circulatio

38) *Saussure* l. c. Dans les Valoïs par exemple le village de
Bramson, situé vis-à-vis de Martigny, a infiniment plus de
Cretins, parcequ'il est exposé au midi, au pied d'un roc et par
cela même sujet à de beaucoup plus grands chaleurs. 409) Quia
struma, ubi Cretini reperiuntur, frequens est, non absurdam
inductionem putaverim etiam Cretinismum ab aerae mutationi-
bus derivandum esse.

humorum impeditur et excretiones fere cessant, utpote suppressae.

Quam primum igitur vasa glandulae thyreoideae, quibus eam singulariter abundare, ex anatomia comprobatum habemus, in magno calore extenduntur, postea succedente subito et nimio frigore eo magis constringuntur, irritatio in hac glandula eo major succedet, quo magis et liberius ei frigus nocere poterat, arteriae ad motum et actionem celeriores concitatae et ideo copiosiore sanguine repletae, cum in irritatam glandulam thyreoideam devehunt, exinde congestio sanguinis, auctus calor et inflammatio, qua sanguis vitatur, dum fluidior redditur, sequuntur.

Praeterea aucta arteriarum oscillatio humores versus ostiola vasorum exhalantium fortius propellit, haec perinde solito magis dilatata, non halitum tantum et fluida aeriformia, Gaz dicere amamus, verum etiam lympham et materiam fibrosam ultro et quidem abundanter egerunt, cui avehendae vasa absorbentia nequaquam sufficiunt.

Glandula thyreoidea ipsa, dum materiae hae et humores per cellulas illius diffunduntur, necessario tumescit, et quoniam in omnibus corporibus mollioribus ac spongiosis, dum resolutio peragitur, lymphae secreta non resorbentur sed coagulatur et cum tela cellulosa coalescit, duriusculus tumor superstes manet in glandula thyreoidea, quem strumam dicimus ⁴¹⁰).

Eadem spongiosa textura glandulae thyreoideae modicam duntaxat inflammationem admittit, quam etiam nonnisi exiguus colli dolor praedit et vel ideo subsequens tumor etiam ab initio et longiore tempore parvus tantum existit; quoniam vero glandula haec ex duabus ope telae cellulosae invicem junctis partibus componitur, quae per vasa nequaquam cohaerent, saepius

410) *Reil's Fieberlehre* 2ter Band pag. 262.

or in uno tantum latere et non in utroque, s. par-
tantum conspicitur.

Non tantum primigenia intumescencia sed multo
adhuc ejus diuturnitas reddit glandulam thyreoideam
mirum quantum irritabilem et morbosam, ut
avis succedens et posterior nocens potentia et maxi-
mum irritationem efficiat et novas atque iteratas in-
flammationes gignat, cum vero cum his conjunctam et
phlegma et materiae fibrosae effusionem ex altius asser-
uiamus, facile persuademur, quod hoc modo sub-
glandula thyreoidea in molem grandem et ingen-
tius crescat et individuo ea affecto non tantum ob de-
formitatem turpis et ob onus molestissima, sed ob con-
stantem pressionem in partes vicinas ipsi vitae pericu-
lo evadat. Haec rudi et crassa minerva exposuisse
sufficiat. — Sequitur, ut mentem meam aperiā. —
Si strumae causas occasionales, quae a praestanti-
ssimis auctoribus maxime accusantur, serius perpen-
dit, sicuti in aëris indole ponuntur, in eo fine con-
stituit, quod respirationis vias aliquo, licet incognito
modo, aggrediantur. Liceat hic consistamus paullulum.
Quid enim, si glandulae thyreoideae cum larynge per
arteriarum nervorum ramulos nexum ejusque cum
respiratorio apparatu isto ipso nexu fundatum consensum
habemus, nos procul dubio praedisponentem strumae
causam invenisse, quae una cum aëris indole ende-
re valet morbum producere. In tumore strumoso
arteriosa aneurysmatice dilatata, venosa varicose
multiplicata inventa sunt, materia variae indolis exsu-
munt, nimirum vasorum ope effecta apparuit. Sic la-
rynx apparatus nervosus aëris propria indole aliquo
modo specifico, ni verbum laedit, irritatus, acceptam
irritationem secundum legem consensus in glandulam
thyreoideam transponit, quo fit, ut ejus vasa praedi-
cti modo transmutentur. Neque id sine exemplo est:
amaurosi v. g. a causis, quae nimia in oculum

actione solam retinam irritare potuerunt, coorta, non semel varicosa et tumida chorioideae vasa inventa sunt. Nonne simili et ut videtur, probabili ratione laryngis glandulosi corporis intumescencia illustrari potest. Obijciat aliquis, laryngis functionem struma minime turbare, cum in oculo chorioideae vitio amaurosis efficiatur; larynx vero neque tam subtili, qua oculus, organisatione gaudet, ut effectus iste tantopere in oculo incidat, neque strumae in laryngem ubique abest effectus. Vox nimirum saepissime rauca, strepens, garula, tenuisque redditur, quod vitium haud soli strumae volumini tribuendum esse censeo. Ceteras causas, ut alimenta, vitae genus rel. praedisponentem istam causam, cum corpori omnino infensa sint, idque debilitare possint, magis provocare et conflare posse, revera inter strumae causas occasionales ⁴¹¹⁾ recensere debere, extra omnem dubitationem est positum. Ad non etiam consensus iste longius procedat, ita ut vaginam in abdomine distributio respicienda sit, quo fiat, ut alio etiam, quam praedicto modo alimenta et reliqua agant? hoc vero nimis hypotheseos speciem praefert. Id certe confidenter spero, hypothesein de glandulae thyreoideae officio physiologico et de strumae causa praedisponente propositam minime cum natura pugnare. Multa etiam, quae de struma in genere et de ejus causis auctores protulerunt, cum praedictis congruunt. —

Quod sporadicas, quales in nostris regionibus observantur, strumas attinet, causae quidem minus latent, neque tamen plane distinctae semper sunt. Generaliter huc referri debent, quaecunque sanguinem ad

411) Videtur proin eodem tempore, quo debilitas viscerum chylipoeticorum habetur, determinari majori quantitate humorum ad caput, ut neque absurdum sit opinari, strumam ipsam promoveri posse. *Gautieri* l. c. p. 110.

riora congerere possunt, inprimis si plethora acci-
t, hinc nexus et labores quicunque in attollendis
portandis ponderibus, inprimis si capiti imposita
gressu erecto gestantur; porro labores sub partu-
ne, quare in nuptiis frequentiores sunt quam in
mibus: deinde vomitus vehemens et frequens prae-
e gravidarum; strangulatoria compressio, tussis
ns, vociferatio, sternutatio, cachinnatio, ejula-
Videtur in his casibus ut plurimum subito ex hu-
um accumulatione in glandula, vasis cujusdam
lymphatici disruptio et liquidi fieri extravasatio,
quidem uti Girard l. c. opinatur, tam in telam cel-
am, quae circa laryngem jacet, quam potius in
extum ipsius glandulae, interdum vero etiam in
tantum ipsis humores accumuluntur et sensim
m glandulae augment; quare vero morbus hic in
minis multo frequentior sit quam in viris, non qui-
plane ex causis solis, quae in graviditate occur-
t, explicari potest. Caetera repetantur ex §. 48. —
Ex his nunc recensitis opinionibus apparet, origi-
hujus mali non unicam agnoscere causam, sed
es potius concurrere debere causas occasionales et
disponentes. Quae diversitas opinionum ex in-
glandulae thyreoideae usu certe provenire debuit
ue semper, donec anatomicorum et physiologorum
a de glandulae thyreoideae usu et functione majus
usque intercedere lumen fecerint.

CAPUT III.

P r o g n o s i s.

Quo robustior est mali natura, eo gravior ac velocior ruina subsequitur.

HEDENUS.

A. De morborum glandulae thyreoideae decursu et exitu.

§. 50.

Vitia glandulae thyreoideae organica, quamdiu non ad ingentem increverint gradum, vitam hominis non admodum periclitantur. Cum vero volumine augmentur, et laryngem comprimunt, vel aliae causae occasionales supervenerint, suffocationis metum saepe incutunt, *periculo non carent*. Sic inflammatione glandulae thyreoideae ullo modo excitata partes adjacentes larynx, trachea glandulaeque colli corripuntur, ita quidem, ut mors suffocatoria procreari possit. Quasi si inflammatio abit in suppurationem, apparent phae-nomena, de quibus jam mentionem feci. Non minus glandula morbo affecta alia quoque organa in consensum trahit. Harmoniam inter strumam et menstruationem jam supra memoravi, et Gladbach ⁴¹²⁾ exemplum consensus inter bronchocelen et hydrocelen non

⁴¹²⁾ *Wichmann's Ideen* l. c. p. 119. et 120.

u dignum narrat, quinimo ob laesos aut compressos
 evos in sensibus oritur defectus, ut aegri vel diffi-
 ter audiant, vel gustus aut olfactus vis imminuatur,
 alia quaedam sensuum obtingat aberratio, unde
 te *Paracelsus* affectum hunc stolidis saepius accidere
 stavit. Sic *Vallesiae Sabaudiae*que incolae magnis
 mediti strumis amentes stupidique plerumque inve-
 untur, et *Cooper* ⁴¹³⁾ in canibus, quorum glandulas
 yreoides exstirpavit, fatuitatem animadvertit.

15) Cfr. *B. Rush*, l. c. p. 549. — *Rivinus* aliquando canem
 dissecuit, qui ob strumam colli anticae parti adnatam vix la-
 queo suffocari potuit, et in illo quidem glandulas thyreoideas
 inferiori laryngis regioni adstantes induratas maxime et tumen-
 tes reperit, ita ut ingens externa etiam specie apparuerit stru-
 ma, quod eo magis notari meretur, cum in canibus rarissime
 observetur hic affectus. Cfr. *Joannes Mittermayer* diss. cit.
 de strumis ac scropholis Bünsgensium pag. 8.

B. De strumae decursu et exitu.

§. 51.

Nullas fere noxas strumam afferre videmus praeter deformitatem interdum valde molestam, hominesque ea affecti saepe maximam sine ullo incommodo aetatem attingunt. Sin autem illa in casu graviore ad enormem magnitudinem inflata vicinas partes comprimit, si tracheae aut sub sternum se praecipitans pulmonibus infesta redditur, recte ea ab *Hippocrate*⁴¹⁴⁾ ad pessimum colli morborum genus refertur, et verissime ait *Celsus*⁴¹⁵⁾, eam medicos fatigare solere. Sic *Hallerus*⁴¹⁶⁾ ab impressione atque expansione strumae in venas jugulares apoplexiam oriri videbat. Strumae ponderemusculos sternohyoides et sternothyreoides, nulla vix trabecula carnea possint cognosci, omnino consumptos animadversum est⁴¹⁷⁾. Asperam arteriam struma nimis premente omnino compressam annulosque illius cartilagineos quasi fractos vidit Cl. *Soemmering*⁴¹⁸⁾, quod quoque *Aepli* affirmabat⁴¹⁹⁾. Confessum etiam *Theod. Kerkring* Observ. anat. 74., qui observavit a struma subito increscente et asperam arteriam colli vertebrae adprimente monialem quandam suffocantam, quod et de puella *Tulpius* lib. I. Obs. 46. animadvertit. Maxime autem in hoc morbo oesophagus pa-

414) In lib. de Gland. I. c. 415) I. V. c. 28. §. 7. 416) Opusc. pathol. observ. VI. 417) Repetantur haec ex §. 37. 418) Ibid. annot. ad Baillie in vernac. vers. Berlin 1794. pag. 49. 419) Ibid. med. chir. Zeitung. Salzburg 1790. Bd. 1. p. 399. 419)

titur, ita quidem, ut in eo causa deglutitionis difficilis sit quaerenda. Struma vero carotidibus vel venis jugularibus aut cavae superiori ⁴²⁰), in quam istae sese exonerant, incumbens cordis et magnorum vasorum ⁴²¹)

420) v. *Swieten* Tom. III. p. 273. et *Platerus* lib. I. Obs. p. 175.

421) *Hopfengärtner* pathologisch-anatomische Beobachtungen, bekannt gemacht von *Harles* im Journal der praktischen Heilkunde von *Hufeland* und *Harles*, Berlin 1817. VI. Stück *Junius*, 4te Beobachtung pag. 26. Beobachtung eines Kropfes mit organischen Veränderungen der grossen Gefässe und des Herzens. Die hier in Rede stehende Frau litt seit einer langen Reihe von Jahren an einem bedeutend grossen Kropfe, und starb endlich an den heftigsten asthmatischen Zufällen. Bei der Section fand man die Schildarterien sehr ausgedehnt, die Carotiden auf beiden Seiten durch die Geschwulst zusammengedrückt; die sämtlichen Gefässe des Halses von Blut entleert. Die linke Lunge war durch eine am Bogen der Aorta befindliche grosse Geschwulst in die Höhe gedrückt, und hier und da mit dem Rippenfelle verwachsen. Die linke Lunge hing überall mit demselben mittelst einer sehr festen Haut zusammen; diese sowohl, als beide Lungen selbst waren mit ausgetretenem schwarzen Blute angefüllt. Der Herzbeutel enthielt einige Unzen röthliches Wasser. Der rechte Vorhof des Herzens war sehr ausgedehnt, voll Blut. Die innere Fläche desselben, die der rechten Herzkammer und die halbmondförmigen Klappen hatten eine dunkelrothe Farbe. Auf der linken Seite des Herzens beobachtete man nichts Aehnliches. Auf beiden Seiten ging die Kopf- und Schlüsselbeinarterie in einem gemeinschaftlichen Stamme von der Aorta ab; zwischen beiden war der Bogen der letzteren in einen anevrismatischen Sack von der Grösse einer Mannsfaust ausgedehnt. Die ausgedehnten Häute der Arterie hatten die gewöhnliche Dicke u. s. w. Die Lungenarterie war bei ihrem Austritte aus dem Herzen etwas erweitert, kam aber bald auf den gewöhnlichen Durchmesser zurück. — Das Wichtigste von der Critik eines *Harles* über diesen Fall: „Durch den Druck der Geschwulst der Schilddrüse auf die Carotiden musste der Fortgang des Blutes durch dieselben verhindert werden. Darans mögen in früheren Perioden manche Anomalien in dem Befinden der Verstorbenen entstanden seyn, die kein Gegenstand der ärztlichen Beobach-

morbos tam sinceros quam fucatos ⁴²²), insultus asthmaticos, suffocationem, et apoplexiam lethalem comprimendo vasa illa majora producere potest. Raro tamen strumia, nisi causis provocatur externis, in inflammationem abit et suppurationem. Curatio in totum observatur difficilis et aliquando casu, quam studio chirurgico strumae felicius fuerunt abactae, quod simul praebet indicium, non semper de curatione penitus esse desperandum. Sponte vero morbum istum jam grandiore evanescere raro tantummodo est observatum; fit tamen interdum. Fluxu menstruo incipiente aut ex irregulari in ordinem redacto strumam saepe evanescere jam supra dictum est. Strumam in graviditate ortam proxima graviditate iterum disparere, *Petit* observavit ⁴²³); strumam mediocrem in foeminis, diabete et diarrhoea vehementi oborta evanuisse *Gi-*

tung und Behandlung geworden sind. Die längere Fortdauer des Druckes auf die Gefäße veranlasste die anevrismatische Ausdehnung der Aorta. Die unmittelbare Gefahr, welche dieser Zustand veranlasst hatte, wurde durch die Anlage der faserigten Substanz entfernt, aber der Raum der Brusthöhle so sehr verengt, dass die Lungen nicht mehr gehörig ausgedehnt werden konnten, der Umlauf des Blutes durch dieselben wurde erschwert, und auf diese Weise müssen die asthmatischen Zufälle erklärt werden, welche allmählig in jenen permanenten Zustand übergingen. Praeclaram etiam *Parentis nostri* observationem haud pigeat consulere im Journal der Chirurgie und Augenheilkunde von *Graefe* u. *Ph. v. Walther*. Berlin 1821. 2ter Bd. 2tes Heft pag. 257 — 261. 422) *Friedr. Ludw. Kreyssig*, die Krankheiten des Herzens u. s. w. Berlin 1814. 1ster Theil pag. 306. Der Verfasser dieses trefflichen Werkes sah in Folge eines Kropfes Herzklopfen, Beengung um das Herz und Angst, besonders nach Tische, und nach starkem Gehen und nach seiner gewiegten Ansicht kann man leicht in Gefahr kommen, diese Zufälle für Folgen eines Fehlers an dem Herzen oder an der Aorta zu halten. So beobachtete er auch ein perpetuirliches Klopfen am Halse; er heilte den Kranken durch Calomel, Schierling und gebrannten Schwamm. — 423) *L.*

rard ⁴²⁴) et *Gilibert* ⁴²⁵) referunt; struma endemia saepe regionis mutatione plane sanatur ⁴²⁶). Plerumque tamen strumam suppuratione vel sponte nata ⁴²⁷) vel tumoris irritatione accidentali prolata sanata esse legimus ⁴²⁸). Quamquam autem talem suppurationem laetissimus saepe secutus est eventus, saepe tamen tristissimos etiam habuit effectus; facile enim pessimum oritur ulcus et fistulae remanent omni curationi repugnantes; nec observationes deficiunt, aegrotos in presenti suppuratione vita privatos esse ⁴²⁹). Rarissime strumae, si unquam, scirrhosae ac cancrisae fiunt; interim *Hoin* (*Memoires de Dijon* T. I. p. 295.) *Heister* Chirurgie cap. 103. §. 1. *P. de Walther* l. c. p. 15.

c. Tom. I. p. 209. 424) *Loupiologie* p. 429. 425) *Joan. Emanuel Gilibert* adversaria medico-practica prima seu annotationes clinicae etc. Lyon 1791. Siehe medic. chir. Zeitung von *Hartenkeil* und *Mezler*, 1ster Bd 1792. Salzburg p. 439. Des Verfassers Gemahlin hatte einen Kropf; auf einmal entstanden heftige Colikschmerzen, eine Diarrhoe kam dazu, die ein Pfund pituita vitrea ausleerte, und weg war der Kropf. 426) *Fallopius* l. c. p. 288. multique adhuc alii. 427) *Willius* l. c. pag. 412. — *Mauchart*. Eph. Nat. Cur. 1712. Cent. 1. Obs. 17. 428) *Verduc* patholog. de Chir. p. 145. — *Assalini* Essai sur les vaisseaux lymphatiques etc. à Turin 1787. 12mo. Aus dem Franz. Dresden 1792. p. 58. Siehe auch Sammlung auserl. Abhandl. zum Gebrauche prakt. Aerzte, 15ter Bd. 1stes Stück. Lipsiae 1792. p. 144. „Einer meiner Freunde,“ sagt der Verfasser, „hat mir ein besonderes Beispiel von der Heilung eines Kropfes mitgetheilt. Eine Köchin, die einen sehr grossen Kropf hatte, gerieth mit einer andern Frauensperson in Streit, der so heftig wurde, dass sie dieser ein Küchengeschirr am Kopf warf. Dieses ergriff einen Bratspiess und durchstach damit den Kropf der Köchin. Es entstand eine starke Entzündung und Vereiterung, nach welcher sich der Kropf in kurzer Zeit verlor.“ Dictionnaire raison. etc. Tom. VII. p. 730. 429) *F. Hildani* Observ. et epist. chirurg. med. Argent. 1717. P. II. p. 397. — *Bonealli* l. c. p. 229.

effectum hunc observasse testantur; plane vero negat scirrhum et carcinoma glandulae thyreoideae strumosaе *Samuel Cooper* (ejusd. Handbuch der Chirurgie in alphabetischer Ordnung durchgesehen und mit einer Vorrede versehen von *L. F. v. Froriep*. 1ste Lieferung p. 299. Weimar 1819.) sic etiam *Graefius*, *Parens noster* multique adhuc alii nunquam observarunt istam mutationem valde periculosam.

PARS POSTERIOR

de strumae cura.

C A P U T I.

De strumae cura, quae cum superstitione
quadam conjuncta est.

*Saepius utendum istis fortunae muneribus, at non
semper fidendum.*

HEDENUS.

§. 52.

Curationem strumae olim *superstitiosis reme-*
diis maxime persequebantur. Sola enim imagina-
tione curari posse strumas affirmant Historici quidam
de curatione Regia Gallica et Anglica agentes, quam,
ne quidpiam ad curationem hanc strumarum pertinens
videatur omissum, breviter nunc exhibebimus ⁴³⁰). Die

⁴³⁰) Viri cacterum eruditi, medici imo de hac re non dubita-
bant: sic *Andreas Laurentius* de mirabili strumae sanandi vi
solis Galliae regibus christianissimis divinitus concessa. Paris
1609. in opp. omn. Paris 1628. 4. — *J. Brown* de glandulis
et strumis. — *S. P. Hilscher* Progr. de cura strumarum con-
tactu regio facta. Jenae 1730.

Pentecostes Rex Galliarum pridie hora vespertina prima Deo reconciliatus et sacra usus synaxi in aede D. Francisco sacra homines morbosos ab Archiatro regio ejusque Collegis in duos ordines ab utroque latere ita collocatos, ut spatio intermedio personae quatuor juxta se invicem una vice transire queant, insimul quoque exploratos, num ex avaritia et studio captandi doni aut dolo et malitia ex aliorum hostium instinctu Regem instrumento quodam aut armis hac ratione insidiose et clanculum laedendi aut occidendi se aegros simulent, satellitibus aliaque cohorte militari stipatus, capite nudatus et facie manibusque singularem prae se ferens pietatem accedit. Adventante vero rege homines morbosus manibus in coelum sublatis in genua devote procumbunt, quos deinde medici a tergis eorum stantes capillis placideprehendunt et versus regem declinant, qui brachio dextro aliquantum exserto et manu in formam crucis posita singulorum frontes tangit, hisce simul prolatis verbis: „Rex tangit te, Deus sanat te, in nomine Patris, Filii et Spiritus sancti.“ Quibus peractis Regis accedentes Eleemosynarii unicuique exhibent munusculum et unum post alium per atrii fores dimittunt. Regi vero exhibetur aqua pro abluendis manibus et actus hic ceremoniis hisce finitur. — In Anglia cura haec sequenti more peragitur: Archiater regius cunctos ad se vocat morbosos, ex quibus reprobe explorata strumis seu malo Regio laborantibus certum denominat conclave aut templum, in quo congregentur, ut Regem accederent, qui finita concione cathedrae insidens, a dextris Secretarium tot Angelototos seu nummos aureos vinculo sericeo albo dependentes, quot adstant aegri, manu tenentem, a sinistris vero strumosos admittit, ab Archiatro sufficienter instructos, quomodo terna capitis incurvatione Regiae majestati sint approximaturi. Tum Ecclesiastes versiculum quendam praelegit ex Bibliis ad ceremonias

istas aptum, v. g. ex Marco Cap. 16. v. 18. ubi Christus Apostolis suis promittit aegros ab impositione manuum eorum sanatum iri. Medicus cum quovis strumoso separatim regem accedit, et cum illis procidit in genua. Rex vero manu sua dextra malam aegri sinistram et sinistra dextram tangit, et simul concionator priorem versiculi lectionem repetit ad quemvis actum, Medico non prius surgente, quam aegri cuncti fuerint tacti, quibus peractis Ecclesiastes priores sex versiculos Capitis primi Evangelii S. Johannis praelegit, et si quidam nondum plane fuerint curati, eorum unus post alium denuo ad Regem ducitur, qui ipsemet unius cujusque collo Angelottum appendit, eosque a se dimittit: ubi Regi pro ablutione manuum aqua porrigitur et recitatis precatione Dominica cum collectis actus hicce clauditur. Quidquid vero alii de re hacce sentiant, Regibus hisce molis donum hoc peculiare tribuentes, mihi in imaginatione aegrorum curatio haec, si quae fuit, potissimum consistere videtur, cum et comites Habsburgenses eos a strumis liberasse dicantur, qui potum aquae ab eorum manibus acceperint. Imo quandoque etiam a privatis hominibus strumas, scrophulas atque alios etiam morbos per contactum ablatos fuisse, experientia testatur. Prodigiousum ejusmodi exemplum curationis morborum per contactum recenset *Pechlin* in observat. physico-medice l. 3. obs. 51. pag. 476. quod merito horribile secretum et rem stupendam nominat, cum ompino inauditum quid sit et dignum admiratione. Nobilis nempe quispiam Ilybernus, *Valentin Geatrakes* dictus, solius manus impositione plurimos homines variis morbis laborantes restituebat. In doloribus pertinacibus frictiones iteratas adhibebat, quo modo eos de loco ad locum et tandem ad ipsa corporis extrema derivabat. Vitia oculorum, aurium, coecitatem, surditatem, epilepsiam, febres omnis generis, ischiadicos, paralyticos, hydropem, arthritidem, dolorem

capitis, *strumam*, scrophulas, ulcera inveterata intra duo vel tria horae minuta auferebat. Tumores obstinaces et maturationem detrectantes ad puris naturam adnota manu deducebat, ut postea facile consolidarentur. Ipse vero homo ingenuus, pius, familiaris et ab omni furore et fallacia alienus fuit, qui dotes illas pro dono Dei habebat et temperamenti singularis ingenio adscribebat. Fatigavit autem omnino modus hicce extraordinarius strumas et scrophulas, imo etiam alios morbos curandi per contactum ingenia Medicorum, ut, quid de re tam obscura, quae plurima caligine est obvoluta, dicendum sit, ignorent. Multi ad calorem manus et effluvia ejus balsamica confugiunt; alii effluviis medicatis et salutaribus e regum corporibus temperatis manantibus effectum tribuunt, alii alio modo rei obscurae lucem affundere laborant. Sunt etiam, qui septimo filio matris, quae filiam antea non peperit, hanc virtutem tribuunt, ut solo contactu strumas possit resolvere, si sua saliva eas una humectet, quod tamen, quia naturali praesidio destituitur, merito negligimus, omnes potius hos effectus, si quidem res ex sententia cedit et aegri restituuntur, unice ab imaginatione aegri deducimus et pro effectu animae habemus, quae humorum motum vitiosum quandoque sine medicamentis corrigit et emendat, in illis potissimum, in quibus fortior imaginandi vis est. Haec enim naturales corporis excretiones moderatur et medicamentorum effectus immutat, ut emeticum loco sudoriferi assumptum quandoque sudorem pellat, ut anodynum ventrem solvat, imaginatione effectum determinante. Nobilis autem Hyberni methodus medendi miraculo propinquior naturae vires omnino superare videtur. — Maxime etiam celebris est curatio strumarum per contactum et frictionem manus cadaveris phthisi praesertim defuncti, quo pacto flaccidas reddi strumas et paulatim evanescere notarunt medici fide

gnissimi. Plurima exempla, et quomodo id fiat, expressa sunt in *Ephem. Germ.* ao l. Dec. 2. obs. XL. et ss. 140. Decur. 2. anni 2. p. 509. *Ledel* in auserl. handl. der Römisch-Kaiserl. Acad. der Naturforscher. XII. Bd. 141. Beobacht.

Sed ad remedia magis adhuc fastidiosa aufugiebant. bant enim umbilicum infantis torrefactum, secunda humana, urinam ⁴³¹⁾, foedum mulierum pro-
vium etc. ⁴³²⁾. Sic occurrit hic *Petr. Joh. Fabri* specificum, quod panchym. Lib. V. S. 1. c. 14. de natura apri ita describit: „Cura strumarum pendet ex scrophulis porcorum, quae calcinari possunt, aspergi unguenta inde parari, quae multum prosunt ad curam horum tumorum, eaque unguenta possunt roborari ol. destill. axung. porci vel ol. stillat. scrophularum porcinarum, quod oleum specificum est contra huius morbi ferociam.“ *Philippus Grünlingius* med. obs. 2. obs. 25. pro praestantissimo remedio habet, aeger bibat ex cranio humano sepulti mediante coctuari facta ex stipite hederæ arborescentis, et quae *h. Agricola* Chirurg. parv. tr. 5. commendat: „Bibe cotidie ex cranio hominis, et inde struma evanescit.“ *Jeronymus Mercurialis* L. I. cap. 5. dicit, experientia comprobatum esse oleum cucum. asinini, si auri intellitur, qua parte est struma, maxime valere ad eam excutiendam vel dissolvendam. *Apulejus* cap. 8. tit. herbam sceleratam commendat tusam et subactam

431) *Lentilii* Miscell. med. pract. Ulmae 1698. Tom. I. p. 245. — *Turmann* l. c. 432) *Cajus Plinius Secundus* in histor. natural. lib. XXVIII. c. 7. Sect. 23. p. 458. ex edit. *Joannis Harduini* hoc ipsum tradit his verbis: Multi inesse etiam remedia tanto malo ajunt: leniuntur enim strumae tractatu earum mulierum, quae profluvio tali laborant, et quarum adspectu speculorum fulgor hebetatur,“ ut dictum est lib. VII. Sect. 13. reddi eundem, si eas postea speculi partem aversam contuerentur, credidit *Bythius Dyrrachenus*.

cum fimo porcino, quae strumis imposita intra paucas horas istos tumores discutit. *Plinio* auctore ⁴³³⁾ sylvestris xyris ad strumas sanandas summo cum fructu est adhibenda; praecipitur autem, ut sinistra manu ad hos usus eruatur, colligentesque dicant, cujus hominis utique causa eximant. Scelus herbariorum aperietur in hac mentione: partem ejus servant et quarundam aliarum herbarum sicut plantaginis, et si parum mercedis se tulisse arbitrantur, rursusque opus quaerunt, partem eam, quam servavere, eodem loco infodiunt; credo, ut strumas, quas sanaverint, faciant rebellare. Veteres cochleae ⁴³⁴⁾ cum testa sua tusae illinuntur, maxime quae fructectis adhaerent. Item cinis ⁴³⁵⁾ aspidum cum sevo taurino imponitur. Anguinus adeps ⁴³⁶⁾ mixtus oleo, item anguim cinis ex oleo illitus vel cum cera. Edisse quoque angues ⁴³⁷⁾, abscissis utrinque extremis artubus, adversus strumas prodest: vel cinerem bibisse in novo fictili ita crematorum, efficacius multo inter duas orbitas occisorum. Et gryllum illinire cum sua terra effossum suadent, item fimum columbarem ⁴³⁸⁾ per se, vel cum farina hordeacea aut avenacea ex aceto. Talpae cinerem ⁴³⁹⁾ ex melle illinire, alii jecur ejusdem contritum inter manus illinunt et triduo non ablunt, dextrum quoque pedem ejus remedio esse strumis affirmant, alii

433) Lib. XXI. Sect. 83. cap. 20. p. 257. *Dioscorides* Lib. IV. cap. 22. 434) *C. Plinius* lib. XXX. cap. V. Sect. 12. p. 527. *Plinius Valerius* lib. III. cap. 29. Strumis profligandis. Cochleae cum suis textis tusae ad hoc faciunt optime quae salicibus adhaerent. 435) *C. Plin.* l. c. *Plinius Valer.* loc. cit. 436) *C. Pl.* l. c. *Plin. Valer.* l. c. 437) *C. Pl.* l. c. *Plinius Valer.* l. c. 438) *C. Plin.* l. c. idem medicamentum et ad parotidas adhibitum est. Sic quoque *Plinius Valer.* lib. III. cap. 29. 439) *C. Pl.* l. c. *Sextus Platonius* cap. 22. de talpa tit. 2. — *Marcellus Empir.* ad verbum cap. 15. pag. 109. et *Plinius Va-*

lerius l. c. 440) *Plinius Valerius* l. c. et *Marcellus* Cap. 15.
 p. 108. 441) *C. Pl.* l. c. Hoc remedium ad scabiem pruritu-
 que retulit *Q. Serenus* cap. 7. p. 128. 442) Vid. edit. *Henrici*
Stephani de medicae artis principibus post *Hippocratem* et *Ga-*
lenum, Anno 1567. Vol. II. cap. X. Sect. XXXXVI. p. 825.
 443) De medicament. liber. in ead. edit. cap. XV. pag. 308.

lerius l. c. 440) *Plinius Valerius* l. c. et *Marcellus* Cap. 15.
 p. 108. 441) *C. Pl.* l. c. Hoc remedium ad scabiem pruritu-
 que retulit *Q. Serenus* cap. 7. p. 128. 442) Vid. edit. *Henrici*
Stephani de medicae artis principibus post *Hippocratem* et *Ga-*
lenum, Anno 1567. Vol. II. cap. X. Sect. XXXXVI. p. 825.
 443) De medicament. liber. in ead. edit. cap. XV. pag. 308.

dulae sorores, una glandula soror, novem fiunt glandulae, octo fiunt glandulae, septem fiunt glandulae, quatuor fiunt glandulae, tres fiunt glandulae, duae fiunt glandulae, una fit glandula, nulla fit glandula.“

Recensenda sunt quoque *Amuleta* a practicis laudata, ne aliquid omisisse videamur, licet nimium iisdem non tribuamus. Talia sunt radix scrophulariae recens luna decrescente effossa et nodis imparibus praedita, ac mediante filo de collo suspensa, quam efficacissimam *Wedelius* celebrat. Alii radicem plantaginis, verbenae, eryngii, agrimoniae, item acetosae de collo suspendunt, alii primulam veris ac fabariam ventri tantum imponunt; alii ranulam viridem pridie novilunio occisam et laceratam vel saltem cor eorum de collo suspendunt. Alii ranam vivam strumis superimponunt, usque moriatur, mortuum deinde foco suspendunt et siccant, ubi strumae etiam dicuntur siccassere. *Cardanus* saltem pedes rubetae, ab eadem vivente, luna vacua, dum ad conjunctionem properat, abscisos, et de collo suspensos laudat. Auctore *Patre Capuccino Gallo* bufo per 40. dies caseo putrido et olea olivarum nutritus et in unguentum redactus optime conducit tunicis illitus. Alii summis encomiis extollunt funiculum, quo quidam suspensus fuit, et globulum plumbeum, quo cervus ictus et occisus est, si e collo suspendantur et loco pentaculi gerantur. Multa alia de amuletis habet *C. Plinius*, quae in hocce capitulo sunt enumeranda: sideritis ⁴⁴⁴) lata folia clavo sinistra manu circumfossa adalligantur, custodienda sanatis, ne rursus sata diro herbariorum scelere rebellet, quod in his, quos artemisia sanaverit, praedici reperio: item in his, quos plantago ⁴⁴⁵), Condurdum ⁴⁴⁶),

444) *C. Plin.* lib. XXVI. c. 5. sect. 12. p. 593. 445) l. c. In iride quoque, ut monuit idem lib. XXI. Sect. 83. sic etiam in ranunculo. 446) *C. Plin.* lib. XXVI. cap. 5. Sect. 14. p. 594.

herba solstitialis flore rubro, suspensa in collo compri-
tere dicitur strumas. Item verbenaca ⁴⁴⁷⁾. Lacertus
viridis adalligatur, et post dies triginta oportet alium
adalligari. Quidam cor ⁴⁴⁸⁾ ejus in argenteo vasculo
servant ad foeminarum strumas. Alii vermes terre-
os ⁴⁴⁹⁾ totidem, quot sint strumae, adalligant, par-
esque cum his arescunt. Aliqui ⁴⁵⁰⁾ circumligant vi-
peras lino, quo praeligata infra caput vipera pepen-
derit, donec exanimaretur. *Nicolao Myrepso* ⁴⁵¹⁾ au-
tore radicem asphodeli lanæ involutam appendito,
valeriter enim strumas sanat: item ciclamini ⁴⁵²⁾ radix
collo appensa aegrotantis. *Marcellus* ⁴⁵³⁾ malvae lau-
dat radicem lino vel lycio trajectam aut arnoglossae, id
et plantaginis, radicem similiter collo circumdatam;
et strumis optime medetur radix verbenae ⁴⁵⁴⁾, si
eius transversam reseces extremamque ejus partem
laborantis collo subnectas, priorem autem partem in
summo suspendas. Arescente enim ea strumae quoque
rescabunt, et omnis earum humor arescet. Quum sa-
nus fuerit, quem curaris, si tibi ingratus exstiterit,

Herbariis ad hunc diem haud liquet, quid condurdum sit, ac
nihilomagis compertum, eane sit solstitialis herba, cujus memi-
nit in Pseudolo *Plautus* act. I. sc. 1. vers. 36.

Quasi solstitialis herba, paulisper fui,

Repente exortus sum, repentino occidi.

⁴⁴⁷⁾ *Apulejus* cap. 3. tit. 2. de verbenaca ad strumas: herbae
verbenacae radix in collo ligata summe juvat. De plantagine
idem *Dioscorides* affirmat lib. 2. cap. 153. ⁴⁴⁸⁾ *C. Plin.* lib.
XXX. cap. V. Sect. 12. p. 527. — *Marcellus Empir.* cap. 15.
pag. 107. Contra strumas et foeminis et maribus utilissimum
est, si cor lacertae viridis lupino argenteo clausum in collo
suspensum semper habeant. ⁴⁴⁹⁾ l. c. *Plin. Valer.* lib. III.
cap. 29. ad verbum. ⁴⁵⁰⁾ l. c. *Plin.* loc. cit. totidem verbis:
Et huc pertinet, quod habet *Marcellus Empir.* cap. XV. p. 108.
⁴⁵¹⁾ Edit. *Henr. Stephan.* cit. cap. CLXXIII. sect. XXXVII.
p. 773. Vol. II. ⁴⁵²⁾ cap. VII. sect. 46. pag. 824. Vol. II.
⁴⁵³⁾ l. c. p. 305. cap. XV. Vol. I. ⁴⁵⁴⁾ eod. loc. p. 307. A. B.

utramque partem in aquam conjicito, strumae renascentur. *Scribonio Largo* ⁴⁵⁵) auctore melius quam radix cucumeris faciunt ad strumas sanandas marini lepores oleo vetere necati in plumbea pyxide inclusi, quam diebus quadraginta diligenter alligatam oportet habere, postea ex ea pinna oblinendae sunt strumae, superque eas pellis lanata non nimium tonsa tegendi gratia imponenda est. — Horum tamen omnium efficaciam noudum exploravimus, qui nobis persuadere non possumus, ut multa ab iis exspectemus, cum internorum vires potiores agnoscamus et externa, quod concernit, fore saltem in emollientibus et discutientibus acquiescamus. Posse tamen quandoque haec quoque externa facere officium non omnino negamus, si aeger magnam spem ponat in remedium et qui antea in moerore versabatur propter labem, animum spe valetudinis lactet et ab omni cura liber vitam transigat. Animo enim existente libero, humores corporis nostri naturalem motuum typum exactius repetunt, quod optime novērunt, qui, quantum animae jus sit in corpus nostrum, probe intelligunt.

σὺ δὲ

Τὰ μηδὲν ὀφελοῦντα μὴ πόνει μάτην.

(AESCHYLUS in PROMETH.)

455) de compos. med. lib. cap. 20. pag. 206. B. C.

CAPUT II.

De strumae cura prophylactica.

*viore medicina est imminens adhuc restinguenda
li vis: vehementius contra inveterata pugnandum
est.*

(SENECA I. ad MARCIAM.)

§. 53.

ura prophylactica ab evitatione omnium earum cau-
am pendet, quae morbo occasionem praebere va-
... Eam fere unice ad strumam endemiam applicari
se, facile quisque videbit. *Clar.* quidem *Foderé*
c scribit ⁴⁵⁶): „A quibusdam inde annis et strumo-
um numerus ac eorum, qui Crétins vocantur, apud
mirum sane in modum imminutus est. Si diligen-
investigamus causam, natura ipsa ad res nos ducet,

5) l. c. p. 190. sqq. The American medical Recorder, conducted
by several respectable Physicians of Philadelphia Vol. I. S. 604.
1819. Siehe Hallesche allgemeine Litteraturzeitung No. 292. pag.
586. 1820. Unter no. 2. Beobachtung über den Kropf von Ja-
mes Mease M. D. Das Resultat der Untersuchungen des Ver-
fassers ist, dass das Uebel hauptsächlich durch die Beschaffen-
heit der Luft begründet werde, und wenigstens in America
erhältnissmässig mit dem stärkern Aufbau des Landes abnehme.

quae arete cum causa strumae a me prolata conjuncta sunt. Valles nostrae aquae undique irruenti receptaculo inserviunt, unde plures, quam alibi, palude oriri debent; flumina aggere non cincta alveumque transgredientia undique easdem efficiebant, domicilia et cubicula parva et humida viaeque publicae semper sordidae erant etc. A quo autem tempore paludes exsiccatae, flumina aggere cincta, sylvae densae, quarum arbores aërem pessimis rebus impraegnabant, amputatae; publicae viae et domicilia meliora redditae sunt, clima nostrum valde est emendatum et mortuisti quam maxime imminuti; qui, si hoc modo pergatur, plane tandem extirpari possint. Cum quibus tamen meliorem infantum educationem conjungere necesse est. Omnes in montibus educari, ibique ad octavum usque annum saltem remanere debent. Vestitus eorum sit mundus ac siccus, praecipue caute instituitur nutritio. Vinum in juventute iis non detur, quia sanguinis motus excitat, vasaque relaxat, simulac tempus, quo vinum vim suam exhibet, praeteriit; idoneae corporis motioni prospiciendum, sive frictionibus cum panno balsamato consulendum: balneis frigidis saepe utendum, alimenta admodum nutrientia praebenda; iidem desuescendi ab oneribus vires eorum superantibus, mature portandis; nec ad matrimonium celeriter admittendi nec conjungendi Crétins et strumosi cum foeminis iisdem morbis laborantibus, tandem ingenium eorum utili cognitione informandum atque augendum. Alii vero ad strumam dispositi, aut initium tumoris jam sentientes caveant a clamoribus, a risu ingenti, cantando etc. ⁴⁵⁷⁾ *Meyero* ⁴⁵⁸⁾ auctore prima sit sollicitudo, collum debite fovere, ne fortasse frigore novico iterato inflammetur; hinc obdu-

⁴⁵⁷⁾ *Brouzet*. l. c. p. 276. ⁴⁵⁸⁾ *Diss. cit.* p. 20.

catur collum salubriter panno laneo, hoc modo non tantum debito calore gaudebit collum, verum etiam per modicum lanae irritamentum et levem frictionem in cute resorptio lymphae promovebitur; caveat autem aeger quam solertissime a flatu venti semper valde pernicioso, hic vero inter montes adhibita etiam omni diligentia vix ac ne vix quidem vitabitur; hinc consultissimum est, ut aegri potius solum mutent et in platiem descendant. Quod si glandula thyreoidea adhuc inflammata esset, cognoscitur hoc ex dolore obtuso, hirudines et quidem ad locum, in quo est sensus doloris, aptissime applicentur, nam his inflammatio tam cito quam fieri potest, abigitur et diffusio lymphae in telam cellulosa impeditur. Struma adhuc plane recens disparet nonnunquam, postquam inflammatio aptis curata est remediis et quidem ita, ut nec infrictione cujuspiam linimenti volatilis opus sit. Hucusque ille. — Postremo adhuc loco expositionem ab *Iphofenio* perbelle factam apponam, qui ita scriptum reliquit:

§. 176. Prophylactisches Verfahren gegen endemisch - herrschende Kröpfe.

In dem vorausgegangenen Theile sind theils weiche Wässer, theils eine nicht gut und electrische Luft, theils auch beide Dinge zugleich die Ursache dieses Uebels genannt worden. Wenn also gegen dasselbe an seinem Orte prophylactisch verfahren werden soll, so hat man erst zu untersuchen, welche von den genannten Ursachen die herrschende sey.

Wenn es weiche Wässer sind, so ist den daraus entstehenden Kröpfen am leichtesten zu begegnen, denn es giebt gewiss höchst wenig Gegenden und Plätze; wo man auf ein einziges Wasser beschränkt ist; wenn man aber das bessere nicht so nahe hat, als das schlechte, so darf wohl nicht erst die Frage seyn: ob es besser sey, dieses letztere mit einigen Kosten und Mühe

herbeizuschaffen, oder ob man die Uebel und Beschwerden des erstern lieber ertragen möchte?

Wo aber eine ganze Gegend durchgehends kein gutes Wasser hat, da muss der Mensch das schlechtere verbessern. Dies geschieht auf zweierlei Weise, entweder im Kleinen nach *Bergmann's* ⁴⁵⁹⁾ Anweisung, oder im Grössern mittelst rohen Kalksteins.

§. 177) Von der Verbesserung eines weichen Wassers mittelst Kalkstein.

Die Verbesserung eines weichen Wassers ist auf mannigfaltige Weise schon versucht worden; theils durch Aufkochen, theils durch Zumischung verschiedener Ingredienzien, als Wein, Brandtwein, Zucker, bitterer Dinge, und endlich auch mittelst Filtriren durch Kohlenstaub oder Kiesel. Keines dieser Dinge kann ein weiches Wasser verbessern, denn zu diesem Behufe muss man es mit Kohlensäure schwängern, dies geschieht aber durch keine der genannten Dinge, und am wenigsten durch Aufkochen desselben, denn dadurch wird es des geringern Antheils, den es an dieser Säure haben kann, selbst verlustig. Dieser Rath ist also der thörigste.

Einfach ist die Weise, und allgemein genug sind die Materialien verbreitet, durch welche die Natur die Wässer mit Kohlensäure schwängert, die ganze Anstalt besteht darin, dass die Wässer mit solchen Körpern in Berührung kommen, welche Kohlensäure oder kohlensaure Luft enthalten; auf diese Weise werden die Quellen, welche aus Dammerde entspringen, kohlengesäuert, und andere Wasser werden kohlensauer, indem sie mit Kalkkiesen, Kalksteinflötzen oder andern Steinen und Erden, welche Kohlensäure enthalten, in Berührung kommen. Diese Betrachtungen führen auf

⁴⁵⁹⁾ Dessen kleine phys. chem. Werke, 1r Band 2te Abth. S. 325.

die Idee, durch Menschenhände die Ursachen mit einander zu vereinigen, welche anderwärts die Natur selbst vereinigt, um ebenfalls zu den Zwecken zu gelangen, zu welchen sie durch jene Vereinigung gelangt, und diese Ideen veranlassten mich zu folgenden Versuchen.

Erster Versuch.

Eine gläserne Kannenflasche ward mit bläulichem, festem, gröblich gestossenem Kalkstein angefüllt, und so viel destillirtes Wasser hinzugethan, als die Zwischenräume aufnahmen; auf diese Weise kommen 44 Unzen Kalkstein und 8 Unzen Wasser mit einander in Verbindung. Nachdem dieses Gemenge 24 Stunden gestanden, und binnen dieser Zeit mehreremale geschüttelt worden war, so ward das Wasser untersucht. Nach gehöriger Decandation war das Wasser vollkommen helle, der Geruch war erdig und kalksteinartig, eben so auch der Geschmack, welcher aber übrigens mehr erfrischend als fade war.

Untersuchung mit Reagentien.

Das Chamäleon ward davon zwar nicht gleich, jedoch sehr bald und höher roth, als vom Leubnitzer Wasser, mit welchem das Chamäleon geschwinder roth ward, aber doch mehr violetten Schein behielt. Ferner ward die Farbe des Chamäleon durch jenes Wasser auch weit eher gänzlich zerstört, als durch das Leubnitzer Wasser, Kalkwasser ward dadurch sehr wenig getrübt, von dem Leubnitzer Wasser hingegen sehr stark. Jener Versuch mit dem Chamäleon zeigte deutlich, dass das auf Kalkstein gestandene Wasser innerlich geworden war; der Versuch mit dem Kalkwasser bewies aber, dass es weniger Kohlensäure enthielt, als das Leubnitzer Wasser; die höhere Röthe, welche es dem Chamäleon ertheilte, musste also durch

eine Mineralsäure oder durch hepatisches Gas bewirkt worden seyn. Vom hepatischen Gas war das Wasser frey, das bewiess der Geruch, und dies zeigten die Reagentien; aber es enthielt Schwefelsäure, denn mit einer verdünnten Auflösung der Schwererde in Salpetersäure ward es sogleich trüber als das Leubnitzer Wasser.

Zweiter Versuch.

Mit den Resultaten dieses erstern Versuchs nicht zufrieden, wurden nochmals 44 Unzen gröblich zerstoßener Kalkstein mit 8 Unzen destillirten Wassers digerirt, und zwar diesmal 48 Stunden, aber auch dieser Versuch liess die Erwartungen unbefriedigt.

Dritter Versuch.

Um noch zweckmässiger und mit der Natur übereinstimmender zu verfahren, liess ich das Wasser in dem fließenden Zustande auf den Kalkstein wirken. Ein Glas-Cylinder, welcher 26 Zoll in der Länge und einen halben Zoll im Durchmesser hatte, ward mit etwas feinem zerstoßenen Kalkstein angefüllt. Die eine Oeffnung des Cylinders ward mit doppelter feiner Leinwand verbunden, die andere blieb zum Aufgiessen des destillirten Wassers offen; dieser Theil des Cylinders blieb der obere, jener der untere. Das oben aufgegossene Wasser musste auf diese Weise durch den ganzen Gehalt des Cylinders sich hindurch filtriren, ehe es am Ende durch die Leinwand hervordrang. Diese Filtration ging sehr langsam von Statten, sechs Stunden Zeit brauchte es, ehe sich eine Unze Wasser sammelte. Das auf diese bezeichnete Weise erlangte Wasser ward bald hinlänglich klar, seiner Farbe nach hatte es einen gelblichen Schein; der Geruch war kalksteinartig, eben so auch der Geschmack, der übrigens aber auch sehr deutlich säuerlich erfrischend war. Bei der

Prüfung mit Reagentien verhielt sich dieses Wasser wie jenes des ersten Versuchs, jedoch war es noch reichhaltiger an Säure, welche aber ebenfalls mehr in Schwefelsäure als in Kohlensäure bestand. Bei länger fortgesetzter Filtration ward dieses Wasser an Farbe und Geschmack aber immer reiner, an Kohlensäure aber immer reichhaltiger, an Schwefelsäure hingegen immer ärmer.

§. 178. Aus obigen Ursachen folgt, dass durch eine mittelst Menschenhänden veranstaltete Vereinigung matter Wässer mit Kalkstein eben die Zwecke erreicht werden, welche die Natur auf demselben Wege bewirkt, dass sie nämlich kohlengesäuert werden, wie ein zum diätetischen Bedarf dienendes Wasser es seyn muss. Ferner dass ein auf obige Weise mit Kohlensäure geschwängertes Wasser an seinen übrigen Qualitäten von dem gar nicht verschieden ist, wie es in der Natur unter ähnlichen Verhältnissen sich bildet; denn jene gelbliche Farbe, der erdige Geruch, Geschmack und die vorstechende Schwefelsäure, alle diese nicht entsprechenden Erscheinungen verschwanden, als die Filtration des Wassers durch denselben Stein einige Tage hintereinander fortgesetzt wurde. Jene Versuche zeigen aber auch, dass es nicht genug sey, ein mattes Wasser mit Kalkstein in Berührung zu bringen, und es mit Kohlensäure zu schwängern; die Weise, wie dieses geschieht, muss derjenigen möglichst gleich seyn, durch welche die Natur zu diesem Zwecke gelangt: das Wasser muss nämlich als ein lebendiges Wasser den Kalkstein durchdringen, und muss lange genug mit ihm in Berührung seyn. Ein Brunnenwasser wird also unvollkommener zu verbessern seyn, als ein Röhrenwasser, und von diesem letzteren dasjenige am vollkommensten, zu dessen Verbesserung die vorausgesetzten Bedingungen am vollkommensten sich vereinigen. Wie jene Vereinigung matter Wässer mit

Kalkstein im Grossen am zweckmässigsten zu bewerkstelligen sey, ob mittelst der Röhrenlager, oder ob mittelst Trögen von Kalkstein und mit diesem Steine angefüllt, oder wie sonst, darüber rathe die Technik. Auf Schiffen, wo der Mangel an gutem Wasser so oft eintritt, und eben so oft mit so mannigfaltigen bösen Folgen für die ganze Equipage begleitet ist, da bedarf es zu Abstellung dieses Mangels weiter nichts, als dass ein Schiff, wenn es unter Segel geht, einige oder mehrere Tonnen guten rohen Kalkstein mit sich nehme, im Fall der Noth diesen in kleine Stücke zerschlage, eine leere Tonne damit anfülle, und in eine zweite untergesetzte Tonne das durch die obere geläuterte Wasser laufen lasse. Wo die erste Verbesserung eines weichen Wassers im Grossen nicht ausführbar ist, da ist eine Läuterung wie diese, selbst für eine Haushaltung zureichend.

§. 179. *Bergmann's Methode Wasser mit Kohlensäure zu schwängern.*

Gepülverte Kreide wird mit Wasser vermischt, und in diese Mischung verdünnte Schwefelsäure allmählich gegossen. Die Luft, welche sich bei dieser Vereinigung entwickelt, wird dann mittelst einer Röhre in das Wasser geleitet, welches man damit schwängern will. Auf diese Weise lehrte *Bergmann* stark kohlensäuernte Wässer bereiten, aber man kann auf dieselbe Weise auch weiche Wässer in gewöhnlich kohlensäure verwandeln.

§. 180. Von gegohrnen Getränken.

Ueberall, wo das Wasser weich ist, da ist es besser, Bier, Halbbier und was sonst Aehnlichkeit hat, Cider u. dergl. zum gewöhnlichen Getränke zu wählen, anstatt des weichen Wassers, und das für das Kind und Frauenzimmer eben so wohl als für den Mann: denn diese Dinge enthalten Kohlensäure, welche dem Wasser fehlt, und die übrigen Bestandtheile

derselben, als Zucker, Weingeist und Schleim sind für den Menschen ebenfalls nicht schädlich, nur in Hinsicht der Stärke dieser Getränke muss man auf das Alter, das Geschlecht und die körperliche Constitution des Individuums Rücksicht nehmen.

§. 181. Welches Wasser zum Kochen den Vorzug verdiene?

Destillirtes Wasser hat keine freie Luftsäure in sich; auch wenn es vorher welche enthielte, so wird es derselben während der Destillation doch verlustig. Hieraus kann man schliessen, dass, sofern ein Wasser zum Kochen bestimmt ist, es gleichgültig sey, ob es kohlen saure Luft enthalte oder nicht. Berücksichtigt man aber, dass Fleisch, welches in kohlen saurem Wasser gekocht wird, eine röthliche Farbe bekommt, in weichem Wasser hingegen nicht; dass Hülsenfrüchte in dem ersten Wasser sich weniger weich kochen als in dem letztern, und dass verschiedene Dinge, als Bier, Caffee und mehrere in ihrer Qualität verschieden ausfallen, nach Verschiedenheit des Wassers und zwar besser, wenn sie mit kohlen saurem Wasser bereitet worden sind, so wird man doch bewogen zu glauben, dass die Kohlensäure eines Wassers Verwandtschaft halber auf die Dinge übergehe, und mit denselben sich binde, welche mit einem kohlen sauren Wasser in Vermischung kommen und damit gekocht werden. Dass Schwefelsäure eines Wassers die Ursache eines verschiedenen Verhaltens seyn könne, würde darum öfters höchst unwahrscheinlich seyn, weil man den Gehalt an dieser Säure in den kohlen sauren Wässern so oft höchst geringe findet.

Nach diesen angeführten Gründen wäre es also nicht einerlei, ob die Speisen und Getränke mit kohlen sauren oder mit weichen Wässern bereitet werden, sondern das erstere ist dem zweiten auch in diesen Fällen vorzuziehen.

§. 182. Nicht so leicht als in dem erst besprochenen Falle ist endemisch-herrschenden Kröpfen vorzubeugen, wenn die Luft sie hervorbringt, denn des Genusses eines weichen Wassers können wir uns enthalten, des Athmens einer Luft aber nicht, welche uns umgiebt. Wenn man sich aus einer stockenden nicht genug electrischen Luft also nicht entfernen kann; so muss man erstens alles beseitigen, was eine solche Luft noch schlechter machen kann, zweitens, alles thun, wodurch der Kö per in den Stand gesetzt wird, den nachtheiligen Wirkungen einer solchen Luft zu widerstehen. Das Erstere geschieht, indem man trockne, geräumige und helle Häuser bewohnt; das Zweite, indem man nahrhafte, leicht verdauliche Speisen genießt, bei jeder Gelegenheit sich kohlen-saurer Wässer bedient, und den Hals stets bedeckt trägt.

§. 183. Von der äussern Bedeckung des Halses.

Die Bedeckung des Halses ist in dreifacher Hinsicht als ein prophylactisches Mittel gegen endemisch-herrschende Kröpfe zu betrachten. Erstens weil der Hals dadurch ausser unmittelbarer Berührung mit einer erschlaffenden Luft gesetzt wird. Zweitens durch eine gelinde Friction, welche sie machen, befördern sie mittelst Hautreiz die Entwicklung derjenigen Ursache, durch welche Contractibilität in der Faser besteht, nämlich die thierisch - electrische Materie. Drittens dienen sie zwischen unsrer uns eigenthümlich umgebenden Luft auch als Isolatorien. Zur Erreichung dieser verschiedenen Zwecke ist es aber nicht gleichgültig von und womit der Hals bedeckt sey. Wenn über den Hals ein Tuch leicht hinhängt, wie z. B. bei den Frauenzimmern, so ist die Hautfläche dadurch sehr unvollkommen mit der äussern Luft ausser Berührung gesetzt; eine solche Bedeckung erzeugt mittelst Friction auch keinen Hautreiz, wirkt zwischen

thierisch - electrischen Materie und der äussern eben so wenig isolatorisch. Zu diesen Zwecken ist der Hals mit einem zusammengelegten Tuche spiralisch umwunden seyn; dieses Tuch muss aus Seide, thierischer Wolle oder wenigstens aus Baumwolle bestehen, denn linnene Tücher frottiren weniger und reizen nicht, sondern sind leitend. Endlich muss die Bedeckung nicht im Knaben- oder Mannesalter beginnen, sondern von zarter Kindheit an.

§. 184. Wo eine stockende Luft und weiches Wasser mit einander in Verbindung zugegen sind, und Kröpfe allgemein herrschend machen, da herrschen Kröpfe nicht nur mit einem besondern Character gemeiner und grösser, sondern auch andere Gebrechen des Körpers und der Gesundheit entstehen mit ihnen zugleich daraus. Um diesem wie jenem Uebel zu vorbeugen, ist es in diesen Fällen daher nicht genug, seine Sorgfalt auf Wohnung und Lebensweise zu richten, oder auf das Wasser allein, sondern die Gegenstände müssen daselbst nach den gegebenen Vorschriften beachtet und geordnet werden.

Ausser diesen vorgeschlagenen Dingen giebt es noch ein Mittel, welches, wenn es ausser der Wanderung ein specifisches Prophylacticum gegen gemisch-herrschende Kröpfe und andere damit in Verbindung vorkommende Uebel giebt, dasselbe giebt, nämlich stark kohlengesäuerte Wässer. Die Kohlensäure, wie sie mittelst Wassers genossen wird, ist sich nicht nur in ihrer Wirkungsweise als das trefflichste Ergänzungsmittel einer schlechten Luft eines weichen Wassers, sondern auch in Hinsicht der Bestandtheile scheint sie dieses recht eigentlich seyn, denn die Basis der Kohlensäure und der kohlensauren Luft schadet nicht weniger electrische Materie zu seyn, als wie sie es mit grösster Wahrscheinlichkeit von dem Sauerstoffgas oder der Lebensluft ist,

wie also diese in der Vorrede eine durch Wasser modificirte electricische Materie genannt worden ist, so kann jene eine durch Kohlenstoff modificirte electricische Materie genannt werden: denn die ätherische Flüssigkeit welche die höhern Lufträume einnimmt, und vielleicht grösstentheils electricische Materie ist, auch diese Flüssigkeit hat man kohlsauer gefunden; vulcanische Explosionen sind mit electricischen Erscheinungen begleitet, und mit denen der kohlsaueren Luft nicht weniger. Das Blut, die Milch, so wie auch der Urin der lebenden thierischen Körpers sind mit thierisch-electrischer Materie durchdrungen, und untersucht man die von diesen Flüssigkeiten ausströmenden Theilchen, so findet man sie kohlsauer. Das grössere Gewicht, welches die kohlsauere Luft hat, wie wir sie kennen, kommt wahrscheinlich nicht von dem eigentlichen kohlsaueren Stoffe her, sondern von andern aufgenommenen Theilchen; denn die ätherische Flüssigkeit der höhern Regionen ist kohlsauer, und doch noch leichter als die eigentlich atmosphärische Luft. Wiefern die Kohlsäure ihres Wesens und ihrer Wirkungsweise nach, in Verbindung mit Wasser genossen, recht eigentlich das wahre Ergänzungsmitel einer nicht electricischen Luft und eines weichen Wassers ist, sofern sind stark kohlsengesäuerte Wässer auch als das zuverlässigste Prophylacticum gegen jene Kröpfe und die andern Uebel vorzuschlagen.

CAPUT III.

de strumae cura medica.

§. 54.

Ingeniosissimi Vatis aureus vere est versiculus:

Principiis obsta, sero medicina paratur,

Cum mala per longas invaluere moras.

enim mali natura est, ut inveteratum fiat robu-
s, eoque in incunabulis et in ortu resecandum, ne
longius serpat et pars sincera trahatur.

HEDENUS.

ratio strumae therapeutica vel methodica est vel
empirica. Illa instituitur, ubi strumae causae apertae
sunt, in eoque consistit, quod hae, si effectum suum in
morbum adhuc exercere possint⁴⁶⁰), removeantur. Ita
et coeli mutatione solummodo struma endemica
curatur; struma vero ex morbo scrofuloso, ex vitiiis
menstrui, ex infarctibus aut obstructionibus
venae portarum, ex diaeta prava cet. orta
curatur viro scrofuloso extincto, menstruis in ordinem
reductis, obstructionibus resolutis, diaeta ameliorata.

Ubi autem morbi causa vel detegi non potest, vel
immodi est, ut non amplius vim in morbum exserere
possit, remediis utimur experientia probatis, quae

⁴⁶⁰) Deidier. l. c. p. 231.

tam interne quam externe applicantur. Quem ad finem ingens medicamentorum copia semper laudata est, quam consulere non pigeat. Priusquam autem ad enumerationem illorum transeamus, cautiones quasdam praemittere oportet, quas remediorum contraindicationum usus requirit:

1) Optimum diaetae regimen, sic ut in aliis affectibus ita in hocce praesenti cum magno aegrorum instituitur emolumento. Quemadmodum enim commissi in diaeta errores saepe affectuum origo sunt, ita optima victus ratio ut plurimum in curatione magnam habet ab utilitate commendationem. Aër ergo sit optimus aethere, serenus, purus, fugiatur pluviosus, crassus nebulosus, palustris, victus sit eupeptus et attenuans et quidem parcissimus, nam inedia et abstinencia multum ad curandas strumas facit, angue pejus fugiantur cibi crudi et flatulenti ⁴⁶¹⁾, fumo indurati, legumina brassica et alia digestu difficilia. Nocet et nimia repletio. Assa alimenta potius conducunt, quam frixa omnia aromatica et aperientia vulgo ita dicta conveniunt. Potus sit vinum medicatum, cerevisia bene cocta, et probe fermentata, aut potus Theae, vel potus aquarum mineralium, quae inprimis in thermis inveniuntur, ut sunt Embsenses, potissimum vero recepta ibidem aqua mineralis in puteo peculiari exsiliens. Conducunt et thermae Wisbadenses et Badenses in Helvetia.

Carolinae in Bohemia ac potissimum Pollyanae ⁴⁶²⁾

461) *Antonius Chalmeteus* encheirid. Chir. c. 12. p. 68. — *Musianus* l. c. p. 37. — *Figierus* l. c. pag. 94. — *Arn. de Vitanova* l. c. p. 1190. 462) *Joseph Wächter*, Abhandlung über den Gebrauch der vorzüglichsten Bäder und Trinkwässer etc. Wien 1818. p. 116. „Diess eisenhaltige Wasser kommt aus zwei Quellen, ist zwar immer etwas trübe, schmeckt jedoch angenehm-säuerlich. Die Einwohner von Pollyan loben es sehr zur Zertheilung und Heilung der Kröpfe. Zu diesem Zweck

Transylvania. Vitandae vero sunt aquae ob strumam generandas celebres vel suspectae. Motus et quies nimis excedant, motus enim nimis nocet, nec non ratio super caput maximorum onerum, item motus conatus nimis in partu laborioso. Animi motus superentur justo rationis freno, omni studio ablegentur tristitia et moeror. Vitetur et locutio plurima et vis immoderatus, ne distendendo vasa et muscoli magis dilatentur. Alvus quotidie suo officio respondet; in reliquis omnis excessus prudenter est evitandus.

2) Auxilium mature ferendum, donec tumor sit recens, mollis et parvus, nec aegrotus aetate admodum proventus; struma enim inveterata, permagna et dura rarissime curatur. ⁴⁶³⁾ Jam *Arn. Villanovus* affirmat e botio laborantibus maxime curari juvenes 25. annorum, vel infra; reliquos vero difficulter liberari: Et *Girard* ⁴⁶⁴⁾, *Prosser* ⁴⁶⁵⁾, *Lentin* ⁴⁶⁶⁾ et alii eo consentiunt. Sed et curatio, optima suscepta, saepissime fallit. ⁴⁶⁷⁾

5) Ad remediorum vim augendam multi suadent rationem vomitoriis ac purgantibus incipere ⁴⁶⁸⁾. Sed neque magis esse videtur, imo necessarium, evacuatio interdum remediis contra strumam interponere, quibus materia sensim soluta evacuari possit. ⁴⁶⁹⁾

4) Multi medici tam veteres quam recentiores observasse se dicunt, remedia contra strumam Luna de-

muss es nicht blos getrunken, sondern auch sein Bodensatz in Gestalt eines Breyumschlags auf die Kropfgeschwulst aufgelegt werden.“ ⁴⁶³⁾ *Selle* l. c. p. 467. ⁴⁶⁴⁾ l. c. p. 419. ⁴⁶⁵⁾ l. c. p. 43. ⁴⁶⁶⁾ *L. F. B. Lentin* memorabilia circa aërem, vitae genus, sanitatem et morbos Clausthaliensium Götting. 1779. 4. p. 127. ⁴⁶⁷⁾ *Noël* l. c. p. 102. — *B. Goöch* med. and chir. observations. London p. 154. ⁴⁶⁸⁾ *Astruc* l. c. p. 192. ⁴⁶⁹⁾ *Guard* l. c. p. 422. — *Foderé* l. c. p. p. 65.

crescente maiorem exserere vim. Quare hoc tempus non spernendum. ⁴⁷⁰⁾

5) Teneat aegrotus omnia medicamenta sub lingua, donec liquescant, tuncque paullatim ea deglutiat ⁴⁷¹⁾. Experientia enim probavit, strumam multo facilius sanari remediis non subito, sed sensim sensimque deglutitis. Credunt enim, ea vasis resorbentibus ex oesophago statim in glandulam thyreoideam inferri. — Remedia contra strumam laudata praecipua haec sunt: *Spongia marina combusta* ⁴⁷²⁾ jam inde ab antiquissimis quibusque temporibus commendata, cui multi adeo specifici nomen tribuunt. ⁴⁷³⁾ Primum *Galenici* hujus medicaminis usum asseruerunt, et *Arn. Villanovanus* ⁴⁷⁴⁾ primus fuisse videtur, qui publicam ejus mentionem fecit: compositio illius remedii, licet mutata, hucusque in officinis sub nomine *pulv. contra strumas offic.* extat, et optimo saepe successu adhibetur ⁴⁷⁵⁾. In ingenti quidem formularum contra strumam copia praecipuum fere ingrediens *spongia marina* usque reperitur. Remedio hoc solo uti possunt aegroti a 3j. ad 3ß. bis de die vel pulveris vel boli vel electuarii forma. Cum autem hoc modo ventriculum debilitari videatur, aro-

470) *J. B. v. Helmont* Tartarus non in potu; vid. *Ej. Ort. Medic.* Amst. 1652. 4. p. 202. — *Foderé* l. c. p. 65. 471) *Foderé* l. c. p. 65. — *Brambilla* Reglement für die K. K. Feldchirurgen I. Th. Wien 1789. p. 113. 472) *Aug. Fürchtegott Uhle* diss. pharmacologico-medica de spongia marina. Lips. 1819. 473) *Thilenius* med. und chir. Bemerk. Frankf. 1789. p. 291. Gegen den Kropf hat mich ein mit spong. marin. comb. versetztes Pulver noch nie verlassen, wenn er nicht schon ein halbes Saeculum gedauert hatte. 474) *Breviar. Lib. II. cap. 4. in op. omn.* Basil. 1785. p. 1190. 475) *Lentin.* l. c. p. 127. „Qui trigesimum suae aetatis annum nondum sunt emensi, infallibili experimento liberabuntur, ubi ter in die minutum cochleare hujus pulveris per mensem adsumserunt etc.“

quoddam e. g. Cinnamomum, Eleosacharum Anisi
i addere convenit. ⁴⁷⁶)

Galenici varias spongiae marinae concinnarunt
ulas, quarum unam tantummodo in medium ad-
cum non videam, quid inde luminis huic capiti
eat, si omnes recenseam. Contenti simus sequenti
eratione:

R². Conserv. majoran.

— — rosar. sing. $\mathfrak{Z}\text{vj}$.

Cort. citr. condit. $\mathfrak{Z}\beta$.

pulv. rad. scrophular. $\mathfrak{Z}\text{iiij}$.

— spongiae combust. $\mathfrak{Z}\text{vj}$.

oss. sepiae $\mathfrak{Z}\text{j}$.

cinnamom. $\mathfrak{Z}\text{ij}$.

Zingib.

sem. sinap sing. $\mathfrak{Z}\beta$.

l. cum s. q. syrup. heder. terrestr., redigantur
mam Electuarii, de quo singulis vespertinis et
inis horis $\mathfrak{Z}\text{ij}$. assumantur.

Paracelsus ejusque asseclae adducunt propter si-
ram spongiam marinam ejusque lapides, it. lapi-
micis et quamcunque spongiam arboribus adhae-
na. — *Joh. Agricola* lib. citat. cap. de strum.
spongiam marinam betulae vino vel infunden-
el incoquendam, ut deinde vinum aegrotus quo-
ibat, et promittit brevi temporis spatio struma-
absorptionem. — *Helmontius* ad strumam abi-
m deprædicat cum aliis pulverem ex spongiis
is vel fungo cynosbati in olla combustis, vel se-
em magis compositam cum triplo sacchari pau-
liquati miscendum, et tempore lunae decrescen-

Th. Lane. — *Duncan's* med. Commentaries. Dec. II. Vol.
p. 86. Samml. auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII. Bd. p. 541.
Brambilla l. c. p. 115. — *Foderé* l. c. p. 65. — *Quarin*
advera. pract. in div. morb. Vienn. 1786. p. 116.

tis ad $\mathfrak{z}\beta$. abhibendum, quo unius mensis spatio strumas liquari promittit, et una cum praefocatione ab illa illata fugari.

\mathfrak{R} . spong. marin. in carbonem combust. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$
 oss. sep. ust.
 Piper. long.
 Zingib.
 gallar.
 pyrethri
 sal. gemm.
 calc. test. ovor. sing. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$

M. cum aq. stillat. ex praefatis spongiis, et paulatim exsicceatur. Hic vero etiam ex spongia combusta pila marina tosta, osse sepiae, pipere longo et nigro, Zingibere, cinamomo, sale gemmae, pyrethro, gallis et lapide spongiae conficitur, uti *Zwelferus* in animadv. ad pharmac. Aug. p. 164. eum describit. *Arnoldus de Villanova* pulvis ad strumas:

\mathfrak{R} . ciner. spong. mar. et pilae mar.
 oss. sepi.
 piper. long.
 — nigr.
 Zingiberis
 cinnamomi
 salis gemmae
 pyrethri
 nucum cupressi
 gallarum quercus
 rosarum sing. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ M. f. pulvis.

In pharmacopoea, quae Augustae Vindelicorum edita est, pulvis *Arn. Villonovani* ita est mutatus:

℞. spongiae combust.
 pilae marinae tostae
 ossis seipiae
 piper. long.
 — nigr.
 Zingiberis
 cinnamomi
 salis gemmae
 pyrethri
 gallarum
 lapid. spongiae sing. ʒj. pulverisentur et
 misceantur.

Willisius curationem strumarum pulvere strumali
 greditur, cujus sequens esse potest formula:

℞. spong. combust. ʒiij.
 pit. marin. combust.
 ciner. lign. junip. sing. ʒj.
 lapid. pumic.
 — calam. sing. ʒβ.
 — spongiae ʒiij.
 visc. pyror.
 pip. long.
 Zingib.
 sal. gemm. sing. ʒij.
 sem. lapp. min.
 cinnamom. sing. ʒβ.

M. f. pulv. dimidia sacchari candi pulverisati por-
 tione miscendus, et ad ʒjβ. pondere quovis mane luna
 crescente assumendus.

Sylvius eadem plane tractat ratione strumas, non-
 nunquam fortioribus quibusdam intermistis et saliva-
 nem promoventibus. — *Cartesiani* eadem etiam ad-
 dunt remedia in strumis. — *Dolaeus* laudat sequen-
 ti formulam:

R̄. pulv. contra strumas Quercet. ʒj.

Arcan. duplic. ʒj. Misce f. pulv.

Dosis quantum capit cuspis cultri bis de die luna decrescente. Vel:

R̄. pulv. ad strumas August. ʒiij.

Arcan. duplic. Myns. ʒjβ.

Magist. spin. viper. ʒj. M. f. pulv.

ad ʒj. exhibendus Luna decrescente.

Sequens etiam euporiston est remedium *Lossii*, quo Empiricus quidam se innumeros curasse gloriatur:

R̄. spong. marin. combust.

lap. spong. sing. ʒj.

floccor. ex panno laneo rubr. disciss.

mandib. luc. sing. ʒjβ.

panis tost.

lap. specular. sing. ʒiij.

Comburantur omnia simul in olla clausa. F. Pulv. exquisitiss. trit. add. sacch. ʒj. Dosis ʒj. decrescente luna. Sequens etiam laudibus suis non est destitutum:

R̄. spong. combust.

oss. sepiae

pip. long.

— nigr.

Zingib.

arcan. duplic.

lap. spong. sing. ʒjβ.

Viper. ppt.

sem. plantag.

Nuc. cupress.

— moschat.

Turbith. sing. ʒij.

Sacchar. q. s. M. F. Pulv.

His addi merentur, quae in *Franc. Osw. Grembs* Arbor. integr. et ruin. l. 2. c. 1. leguntur: „Hanc strumam abolere faciet usus pulveris spongiarum mar.,

decescente luna quantitate cuspidis cultri cum aqua
 annamomi deglutatur, spongia non omnino combu-
 ritur, tum enim vis seminalis destruitur.“

Magnam famam collegit remedium, quod *Coven-*
vendebatur, cujus autem compositio tanquam ar-
 tum reticebatur. Auctor ejus Dr. *Bate* est, et se-
 cuti modo paratur: ⁴⁷⁷⁾ R \bar{x} . spongiae mar. cort. lign.
 aeris: Lapid. pumicis singulorum partes aequales.
 combust. f. pulv. Drachma dimidia hujus pulveris misc.
 in saccharo, et f. cum Conserva aut syrupo quodam
 viscoso, quem aegrotus cubitum iturus sub lingua te-
 neat, donec liquescat. Die lunam plenam sequente ae-
 grotus vomitorium sumat, et postridie purgans; tunc
 singulis septem sequentibus diebus bolo isto utatur,
 cum conjungat pulverem ex rad. gentian. herb. cen-
 turiae min. Flor. chamomillae sing. gr. V., quem quo-
 tidie matutino tempore sumat. Octavo die purgans
 utatur. Proxima lunae mutatione omnia haec rei-
 nitur, et nisi tumor disparuerit, tertia vice conti-
 nitur. Idem remedium *Musitanus* jam commen-
 dat. ⁴⁷⁸⁾

Dn. Faure tanquam specificum, omnibus strumo-
 sae convenienti remedium laudat ⁴⁷⁹⁾, quod pro aetatis
 ratione, ex sapon. alicant. gr. XV. ad 5j. spong. calc.
 R \bar{x} — 5j β pulv. utriusque scroful. limat. Chalyb. sing.
 VI — 5j. componitur, et cum syr. de quinque rad.
 bolum formatum alternis diebus mane cum infuso
 mit. rorism. aqua calcis facto assumitur, alvo in-
 tra aliquoties cum confect. Hamech aut manna pur-

Prosser adversus strumas, quae puellas Darbien-
 se foedare solent, remedium laudat, quod ex Cin-

) *R. James* medical Diction. Lond. 1743. Tom. I. Art. Bron-
 chocele. — *Wilmer* l. c. p. 251. ⁴⁷⁸⁾ De tumor. pr. natur.
 . 87. ⁴⁷⁹⁾ vid. *Prix de l'acad. de Chir.* l. c. p. 39. seq.

nab. antim. optime laevig. ℥j. milleped. ppt. et spong marin. calcin. sing. gr. XV. componitur. Quali dos utendum tempore matutino ac vespertino per 2. ad 3 septimanas; quo tempore peracto intermissio 14. dierum facienda; tunc vero harum pilularum connubio medicina repetenda: ℞. mass. pil. mercurial Pharm. nov. ℥β. f. pil. nr. 48. aequales; quarum duae vel tres aegrotus sumat lectum iturus. ⁴⁸⁰⁾

In eundem usum *Nicolai* etiam sequentes pulveres multa aliorum experientia comprobatos adnotavit ⁴⁸¹⁾:

℞. ossis sepiae
lap. pumicis
— specularis
— haemat.
boli Armenae
rad. pyrethri
spongiae ustae sing. ℥ij.
cinnamomi ℥j.
sacchari candi ℥vj.

M. F. pulv., de quo singulis vespertinis et matutinis horis gr. XX. assumantur.

℞. spongiae ustae
lap. spongiae
pumic. candid.
ossis sepiae sing. ℥j.
pip. longi
— albi
rad. hellebori nigri sing. ℥β.

M. F. Pulv. ad gr. XX. exhibendus luna decrescente

480) *Prosser*. l. c. p. 44. Post vigesimum septimum aetatis annum nihil contra morbum valere asserit auctor, Vid. *Richter* Bibl. chir. Vol. I. P. I. p. 108. 481) *Ernst Anton Nicola* Recepte und Curarten etc. Jena 1789. 2ter Bd. p. 185 — 86.

Vogleri ⁴⁸²) pulvis strumalis:

℞. lap. spongiarum
spongiarum marin. ust. sing. ℥ij.

F. pulvis.

Mead ⁴⁸³) pulvis ad strumas:

℞. spong. marin. ust. ℥j.
nitri depurati
corallinae
sacchar. alb. sing. ℥β.

F. pulv. in usum adhibeatur bis in die.

Ill. Frank ⁴⁸⁴) sequens commendat decoctum: ℞.
spongiae officin. in frustula scissae, Lapillorum in iis
arteriorum sing. ℥jv. pilarum marinarum ℥j. In vase
lino ignis ope comburantur in cinerem. Postea ℞.
us cineris ℥j. coque cum aquae fontanae ℥ij. ad re-

22) *Joh. Phil. Vogler* pharmacia selecta. Leipzig und Frankfurt
1799. p. 107. „Für jüngere Personen sind aus diesem Pulver
12, für ältere aber 9 gleiche Theile zu machen, und ein Theil
davon zweimal des Tages früh und Abends vor dem Essen, und
zwar bei abnehmendem Monde zu nehmen. Alle 3 oder 4 Wo-
chen kann der Gebrauch dieses Pulvers wiederholt werden, so
lange bis es die verlangte Wirkung gethan hat.“ 483) *Mead*
versichert in seinen *Monitis et praeceptis medicis*, dass er in
Kröpfen von diesem Pulver oft gute Wirkung verspüret. Er
liess allemal 3 oder 4 Gläser von der aqua calcis minus com-
posita darauf trinken. War der Kranke sehr ausgezehrt, so
wurde das Kalkwasser zu gleichen Theilen mit Milch vermischt.
Siehe *Nicolai* l. c. pag. 191 — 192. 484) *Phil. Jacob. Pideritii*
Pharmacia/rationalis, Casellis 1791. p. 346. *Freybergae Her-*
mundurorum 1806. p. 271. Hic vero res et tempus me monet,
ut aliud adhuc decoctum contra strumas subjungam, quod a
Corvino commendatur atque magnam habet cum *Frankii* medi-
camine similitudinem: ℞. spongiae marin. in fragment. lapid.
spong. sing. ℥jv. pil. marin. ℥j. ingerantur haec in cubicu-
lum, ut fiat sub igne cinis. Cujus pulveris ℥j. coque cum aq.
font. ℥ij. ad col. ℥j. adde syrupi cinnam. tinct. absynthii
compos. sing. ℥j. D. S. Ter in die cochlear unum.

manentiam dimidiae partis. Tandem cola et adde syrupi corticum aurantiorum 3j. Detur bis terve in die ad cochlearia duo. *Pideritius* pharmaciae rationali, quam evulgavit, praeparationem istam apposuit, et hancce de ea protulit sententiam: „Communicavit medicamen hocce nobiscum illustris *Frankius*, Transalpinus jam celebris Doctor, et maximam contra strumas nobis testatus est efficaciam, quam etiam toties quoties in praxi nostra ita fundatam invenimus, ut etiam in strumis admodum insignibus adhuc profuisset.“ Quibus verbis quid potest esse illustrius? *Foderé* electuario ex spongia marina primae calcinationis cum cortice cinnamomi et melle parato, terque de die magnitudine nucis avellanae adhibito, saepe strumam post duodecim dies evanescere vidit. Durante vero electuarii usu singulis octo diebus praeterlapsis alvum laxari, et quamlibet electuarii dosin una vice sumendam non statim deglutiri, sed potius sensim sensimque in ore solvi jussit. Varia quoque vidit idem auctor, quae periodum lunae decrescentis in cura haud neglegendam esse monstrarunt. Sic etiam *Foderé* ⁴⁸⁵⁾ et *Astruc* ⁴⁸⁶⁾ ex decocto spong. marin. non combustae magnam expectant contra strumam vim.

In corpore debili, sensibiliore periculosum quandoque fieri spongiae marinae usum observatum est ab *Ill. Hufeland* ⁴⁸⁷⁾, ita nempe irritando, ut haemoptysin apparere, et statum hecticum verendum esse viderit. Quare ut incommodum istud avertat, pulverem spongiae ad 3j. cum melle et aromate (ut cinnamomo) mixtum, aut inprimis lixivium spongiae pulmoni minus infestum exhibet vir celeberrimus. Omnibus autem caeteris hanc praefert praeparationem: R. spongiae concisae, non ustae, sed tostae 3j. ebulliat

485) l. c. p. 64. 486) l. c. p. 184. 487) Ueber die Skrofelkrankheit.

um aquae libra una: digere per duodecim horas et co-
cturae adde tantillum aquae alicujus aromaticae. Hu-
us mixturae exhibe omni trihorio cochlear unum.
L. Loder simile decoctum spongiae tostae per plu-
rum annorum seriem in usum vocavit, maximamque
struma utilitatem inde observavit. In corporibus ad-
modum laxis aut irritabilioribus extractum quassiae
mixturae admixtum aut myrrhae et hyosciami, aut
udanum liquidum Sydenhami saepe optime condu-
ere aegrotis vidit *Cel. Hufeland*. Unam saltem obser-
vationem hujus viri ⁴⁸⁸⁾ adhuc hic proferre liceat:
Saepe, inquit, strumam cum infarctibus aut obstru-
tionibus systematis venae portarum tam arcte conue-
iam vidi, ut omnem respuere curam videretur, ante-
quam haec resoluta fuerint; et quum spongiam tostam,
quae demum contra strumam commendata fuerint
remedia, frustra adhibuissem, tandem additioni sapo-
is antimonialis gummosi *Kaempfi* et usui extracto-
um resolventium sub copiosa materiae viscidae excre-
one cito cessit malum. "Non igitur, ut vides ex ob-
ervatione Celeberr. viri, negligenda est causa strumae,
quamvis toties ignorata, et nunquam decet artis pe-
tatum confundere empyricam methodum, qua nihil est
mutabilius, cum rationali, qua et in rebus incertis ali-
quam tamen certitudinem conjectura assequimur.
Himly ⁴⁸⁹⁾ laudat formulam sequentem: R. spongiae
stae ʒij. pulv. g. arab. ʒij. pulv. cinnamomi ʒβ. syrup.
mpl. q. s. ut fiant trochisc. XXIV. Detur bis terve in
ie trochisc. I.

Medicus Petropolitanus, illustris *Wylie* ⁴⁹⁰⁾, sequenti

488) Ueber die salzsaure Schwererde. 489) Medic. chir. Zeitung
von *Hartenkeil*. 2ter Bd. 1803. pag. 29. Salzburg. Anzeige
des physico. medic. Journals von *Bradley*, *Willich* und *C. G.*
Kühn. 1800 — 1802. 1ter bis 3ter Jahrgang. 5ter Jahrg. April.
490) *Hufeland's* und *Himly's* Journal der pr. Heilk. 1stes St.
Januar. p. 118 — 20. Berlin 1809.

modo feliciter instituit curam. ℞. mercurii dulcis gr. j. flor. salis ammon. martial. gr. iij. rad. rhei gr. IV. spongiae ustae ʒβ cort. cinnam. gr. ij. M. F. pulv. subtiliss. disp. tal. dos. No. 12. S. bis per hebdomadem aegrotus cubitum iturus pulverem I. cum syrupo aliquo assumat. Vel sequens, quod multa etiam cel. viri experientia comprobatum est: ℞. spongiae ustae ʒj. mimosae ʒj. cort. cinnam. gr. XV. syrup. cort. aurant. q. s. ut fiat massa longa lentaque trituratione, addito sensim sensimque syrupo subigenda, ex qua formentur trochisci viginti quatuor super patinam oleo illitam siccandi. D. S. Quovis mane de iis assumatur trochisc. I. atque sub lingua teneatur, donec liquescat. — *Hausleutner* auctore sequens remedium raro te fallit:

℞. spong. marin.
tart. crud. sing. ʒiv.
alum. crud.
Lapid. spong.
Corii Russ. sing. ʒij.

M. Calcin. vas. fictil. bene claus. per horae Quadrantem, ut f. pulv. niger. S. Pulvis strumalis. Postea ℞. hujus pulveris strumalis ʒvj. coque cum aq. font. q. s. Colat. ʒiv. admisce. aqu. cinnam. syrug. fl. aurant. sing. ʒβ. D. S. Tempore matutino ac vespertino cochlear majus. vid. *Horns Archiv für pr. Med. und Klinik. Bd. II. Heft 1. Jahrgang 1810. Nr. 1.*

Illustris Graefius, quo praeside Aesculapio arae semper calebunt, in clinico chirurgico sequentem adhibere jubet compositionem:

℞. tart. tartaris.
spongiae tost.
sacch. alb. sing. ʒβ.
ammon. muriat.
rad. Imperat.
cinnamom sing. ʒij.

. sulphur. stib. aurant. ʒj.

Piper. long. ʒj.

M. f. pulv. subtiliss. D. S. Ad ʒj. pondere quovis mane assumendus.

*Peritissimus Rustius*⁴⁹¹⁾ ad discutiendam strumam non parum subsidii allaturum sperat sequens praeparatum:

℞. pulv. fol. digit. purp. gr. IV. usque ad VIII. spongiae marin. combust. ʒβ.

elaeosacch. foeniculi seu cinnamoni ʒjj.

M. F. pulv. divide in XII. part. aequ. D. S. bis terve in die pulv. I. Sequentia a *Demiani*, medico quondam Presdensi proposita, experientia etiam *Parentis nostri* saepe sunt comprobata:

℞. pulv. spong. tost. ʒj.

hepat. sulph. ʒij.

piperis albi. ʒj.

M. D. S. Tempore matutino ac vespertino cochlear unum.

℞. pulv. spong. tost. ʒj.

sacch. alb. ʒβ.

fl. sulph.

alcali miner.

piperis alb. sing. ʒij.

ol. dest. lign. sassafras ʒβ.

M. D. S. Ter in die cochlear minus.

℞. pulv. spong. combust.

lapid. spong. sing. ʒj.

aethiop. miner. ʒij.

Kerm. miner. ʒj.

Ol. destill. lign. sassafras ʒβ-ʒj.

M. f. pulv. D. S. Bis in die ad ʒj. pondere.

⁴⁹¹⁾ Joh. Nepom. Rust. Hekologie, Wien 1811. 1ster Bd. p. 261.

Sequenti etiam remedio maximo cum fructu usus est celeb. *Demiani*:

℞. pulv. spongiae combust.
 lapid. spong. sing. ʒj.
 gallar. turcic.
 piperis longi et nigri
 Zingiberis alb.
 Sal. ammon. sing. ʒij.
 pil. marin. combust.
 rad. pyrethri sing. ʒβ.

M. f. pulv. D. S. ut supra.

Evacuantia interdum interponenda esse censet illustris auctor, quibus materia sensim resoluta removeri possit.

A Fischero, qui Dresdae praxi extensiore celebris residet, maxime aestimatur sequens:

℞. spong. tost. pus. ʒv.
 gumm. ammon. ʒij.
 sulphur. antim. aur. ʒj.
 extr. conii macul.
 — taraxici sing. ʒij.

M. exacte, ut f. pilul. pond. gr. jj. consperg. pulv. cinnam. D. S. Ter quotidie VI. pil.

Parens noster sequentes adhibet formulas:

℞. spong. marin. ust. ʒij.
 lb. cicutae ʒij.
 Ostreocoderm. pp. ʒj.
 Cinnabaris factit. ʒβ.

M. F. Pulvis D. S. Tempore matutino ac vespertino cochlear parvulum.

℞. pulv. spong. marin. tost. ʒvj.
 pulv. rhei optim. ʒiβ.
 pulv. cort. cinnamomi ʒj.
 sacch. canariens. ʒβ.

M. D. S. quater in die cochlear minus.

℞. rad. Zingiberis

Turpethi gummosi

Spong. marin. non ablut. et sicc.

Sacch alb. sing. 3β.

M. F. Pulv.: N. 8 D. S. ut supra.

℞. spong. marin. ust. 5β.

Coffeae tost. 5ijβ.

rad. jalapp. 5ijβ.

Cort. cinnamomi 5β.

Gummi guttae 5j.

Elaeosacchar. citr. 5iij.

M. F pulv. D. S. ut supra.

℞. spong. marin. combust. 3ij.

extr. fumariae

g: ammon.

flor. sulph. sing. 3j.

antim. crudi. 3j.

M. F. pil. gr. 5. D. S. Ter in die IV. usque ad VI.
pilul.

℞. extr. cicutae vel digital. purp. 5j.

vel belladonnae. 5β.

Saponis venet. 3j.

Kermes. miner. gr. IV. M. f. pilul.

gr. 2. S. Quater in die IV. pil.

Alias similes compositiones laudant *Girard* l. c.
p. 452. *Bertrandi* l. c. p. 391. alique.

Praeterea nullus est singularis compositionis auctor
insignis. —

Inter terrestria medicamenta magnam auctoritatem
habent testae ovorum calcinatae. Sic M. *Dapeyron*
de Cheyssiol ⁴⁹²⁾ strumam magnitudine pugni mero

492) Journal de Médecine, Chirurgie et Pharmac. par M. Roux,
Paris 1770. Mars. p. 264. Sammlung auserlesener Abhandlun-
gen für practische Aerzte. I. Bd. p. 111.

testarum ovi calcinatarum usu penitus resolvisse asserit. Testas nempe tam diu igni subicit, donec colorem naturalem amittant, fuscumque accipiant, quo facto in subtilissimum pulverem illas conterit. Ex hoc pulvere sumere debet aegrotus bis de die (matutino et vespertino tempore) scrupulos duos cum pauxillo vini alicujus generosi adstringentis, et aliquot horas antea ab omni abstinere debet alimento tam solido quam fluido. Quum diuresin valde promovere illi visae sint ovorum testae, semper aegrotum diuretico et laxativo praeparat, ut vias urinarias permeabiles atque ad effectum medicamenti salubrem paratiores reddat. Plerumque spatio triginta dierum sanitas aegri restituitur. Una sumserunt aegroti Decoctum lupuli et rubiae tinctorum. Nec virtutes hujus remedii *Arn. Villanovano*⁴⁹³⁾ et *Helmontio*⁴⁹⁴⁾ ignotae erant. — *Langenbeckii* experientia sequens compositio a *Mehlis* proposita aliis palmam praeripit: ℞. spong. marin. ust. ʒβ. testarum ovorum calcinat. ʒij. Sal. ammon. ʒβ. Elaeosacchar. anisi ʒij. M. F. Pulv. D. S. Ter quotidie cochlear minus. — *Parrens noster* etiam sequenti utitur compositione:

℞. pulv. spong. tost. ʒj.
 test. ovor. calcinat.
 milleped. ppt. sing. ʒβ.
 Cort. cinnamoni.
 piperis alb. sing. ʒj.

M. F. Pulvis. Ter in die cochlear minus.

Greg. Mensurati auctore sequens conducet medicamen, quo saepissime contra strumas Carinthiorum et Stiriorum est usus:

℞. nihili albi ʒiv.
 ossium seipiae.
 putam. ovor. sing. ʒij.
 panni scarlatini ʒβ.

493) l. c. addit. p. 1195. 494) l. c. p. 205. *Schelhammer* l. c. p. 49.

Mista vase clauso comburantur, rediganturque in pulverem. Dosis est pro adulto gr. XVIII. bis de die, ea quidem lege, ut ipso in plenilunio purgans phlegmagogum sumatur, et sequentibus sex diebus 12 pulveres assumantur, dum interea loca tumida probe fricentur.

Communicavit medicamen hocce vir illustris cum celeb. *de Haen*, qui maximam etiam remedii illius testatus est efficaciam in *Rat. Medendi* Tom. II. p. 157. Postea *Kaempfius* praedicavit singularis hujus compositionis vires; vid. ejusdem *medizinisches Handbuch* etc., aus dem Lateinischen übersetzt von *Johann Christoph Friedrich Bährens*, Dortmund und Leipzig 1760. pp. 416.

Borax veneta, Alumen, Sal gemmae similiaque remedia, quae lympha viscidam reddere possunt tenuiorem, a multis commendantur⁴⁹⁵). Ab aluminis tamen vi adstringente contrarium effici posse credo. — Aquae marinae viribus multum confidit *Lieutaud*, cujus cyathum aegrotum per aliquot menses quolibet matutino tempore vult assumere⁴⁹⁶), quam ipsam jam *Fallopious*⁴⁹⁷) exhibuit. — Saponem venetum aut salis tartari solutionem quidam quam maxime laudant⁴⁹⁸), nec radicis saponariae officinalis vires contemnendas esse dicunt.⁴⁹⁹)

Extracto cicutae magnam sanatam esse strumam *Stoerk* refert.⁵⁰⁰) Adhibuit vero succum recens expressum et inspissatum, dosi unius ad quatuor grana bis quotidie; sensim augebat dosin, ita ut tandem drachmam I. aegrotus sumeret quoque die. Nec non

495) *Manget* l. c. p. 259. 496) *Inbegriff der ganz. med. Prax.* IV. Th. *Bertrandi* l. c. p. 393. 497) l. c. p. 298. 498) *Roncalli* l. c. p. 230. *Noël* l. c. p. 102. 499) *Coste's* und *Willemet's* Versuche mit einheimischen Pflanzen aus dem Franz. Leipzig 1792. p. 98. 500) *A. Störk* libellus de cicuta. Viadob. 1761.

Dünclerus ⁵⁰¹⁾ et *Willich* ⁵⁰²⁾ hoc remedio felici utebantur successu.

Extracto Aconiti tumores strumosos duros sanavit *Greding* ⁵⁰³⁾. *Stollius* hocce extractum cum aliis adhuc conjunxit medicaminibus: Ex. gr.

℞. Antimon. crud. alcal. 5vj.

Resin. Guajaci 5β.

Extract. Aconiti 5j.

Sacchar. alb. 5X.

Mucilag. gumm. Tragacanth. q. s. ut. f.

Rotulae XV—XX. D. S. Quater in die rotula una.

Idoneam virium resolventium ac diureticarum conjunctionem in digitalis purpureae herba invenimus. Extractum ejus saepe bono eventu dosi gr. j. aliquoties quotidie exhibitum est ⁵⁰⁴⁾. Augeri tamen sensim potest dosis usque ad gr. Xij. *Ill. Osiander* ⁵⁰⁵⁾ et *perit. Rustius* ⁵⁰⁶⁾ pulverem hb. digitalis purpureae etiam summo cum fructu adhibuerunt. *Osiander* sequentem formulam commendat experientia comprobata:

℞. crystall. tart. 5β.

pulv. hb. digitalis purp. gr. Viiij.

usque ad XVI. et XXIV. camphorae gr. Viiij.

M. f. pulv. div. in 8 part. aequal. D. S. Bis quotidie pulv. i.

Quod si vires ventriculi valde sunt debilitatae, tunc grana aliquot pulveris nucis noschatae unicuique dosi sunt

501) Sammlung auserlesener Abhandlungen für praktische Aerzte. VII. Bd. p. 589. 502) *Reichards* medic. Wochenblatt 1781. 12. St. 503) *J. E. Gredings* sämtliche medic. Schriften. Greitz 1790. I. Th. p. 229. 504) *Murray* Apparat. Medic. Tom. I. p. 490. *Quarin.* l. c. p. 119. 505) *Friedr. Benjamin Osianders* neue Denkwürdigkeiten für Aerzte und Geburtshelfer. Göttingen 1797. No. XIII. Siehe med. chir. Zeitung von *Hartenkeil* 2ter Bd. p. 48. Salzburg 1793. 506) l. c.

Idenda. — Radix squillae eodem fere modo agere videtur, et optimum saepe praestitit effectum.⁵⁰⁷⁾

Praestantissimum vero effectum Terra ponderosa strumata pollicetur, medicamentum omnibus iis viribus ornatum, quibus remedium imbutum esse debet, quo strumae curatio perfici possit. Conjungit enim vim irritandi, lymphaticas obstructions resolvendi, cum vi — et excretionem augendi; alvum quandoque movet, praecipue autem perspirationem cutaneam et urinae excretionem auget. Strumae admodum magnae hoc remedio sanatae sunt. Ex solutione terrae ponderosae salitae 3β. in aquae fontanae destillatae 5j. infanti guttul. 10 ad 20., adulto guttul. 40 ad 60 dari possunt ter quaterve in die, dosisque sensim augeri. Aegroti anxietas, nausea, vomitus, vertigo etc. dosin praegrandem fuisse eddicant.⁵⁰⁸⁾

Aromata, ut piper longum, nigrum, Zingiber, cortex cinnamomi etc. a pluribus commendata ob vim irritantem stagnationes et obstructions non admodum veteratas resolvere possunt.

Ex drasticorum usu optimos sibi polliciti sunt Alectus *Deidier*⁵⁰⁹⁾, *Vigierus*⁵¹⁰⁾, *Roncalli*⁵¹¹⁾, *d'Ailhaut*⁵¹²⁾, *Chopart* et *Desault*⁵¹³⁾ multique alii in primis veteres medici⁵¹⁴⁾. Utebantur hunc in finem Theriace Turpethi et Hellebori, Scammoneo, Elateo, Colocynthide, cet. Quamquam vero strumam saepe talibus remediis sanatam esse non dubito, usum tamen eorum continuum non sine oeconomiae humanae detrimento esse posse arbitror. Maxima inmoda, imo mortem ex tali curatione observavit

507) *Roncalli* l. c. p. 230. 508) *C. W. Hufeland* über die Salzsaure Schwererde. Erfurt 1792. p. 13. *J. S. Görling* diss. sist. Observ. quasdam de terr. pond. salit. Erford. 1792. p. 16. 509) *Des tumeurs*, p. 233. 510) l. c. p. 94. 511) l. c. p. 354. 512) *J. G. d'Ailhaut traité de la vraie cause des maladies* etc. Strasb. 1777. p. 246. 513) l. c. p. 249. 514) *Fallopianus* l. c. p. 289.

Girard.⁵¹⁵⁾ Purgantia vero leniora multum ad strumae sanationem contribuunt, haecque nunquam negligenda.

Emetica saepius repetita quandoque praestantissimum habuerunt effectum in prodigiosae magnitudinis strumas, ubi medicaminum effectus vix poterant sperari.⁵¹⁷⁾

Salivationem masticatoriis excitatam *Fallop*ius suadet⁵¹⁸⁾, et *Prosser* historiam juvenis masticatione herbae nicotianae sanati narrat.⁵¹⁹⁾ *Salmon* imo salivationem mercurialem caute institutam commendat.⁵²⁰⁾ Mercurialia ipsa felici successu multi adhibuerunt⁵²¹⁾; commendantur praecipue Mercurius dulcis, et Aethiops mineralis antimonialis *Huxham*. — Ab aqua aëre fixo impraegnata initio morbi aliquid sperandum esse *Selle* putat, ubi nempe morbus ex potu aquae nivalis ducendus est.⁵²²⁾ Sulphure antiqui jam medici ita utebantur, ut cum aliis remediis alcali continentibus e. g. spong. mar. La-

515) l. c. p. 423. 516) *M. Lombard* sur l'utilité des évacuans dans la cure des tumeurs, Strasbourg, 1783. p. 120. 517) *Weickard* in Nov. act. Nat. Cur. Tom. V. p. 146. *H. F. A. de Roussel* de variis herpetum speciebus. Cadomi 1779. p. 141. Not. a). 518) l. c. p. 289. 519) l. c. p. 47. 520) *A Compendium of the theory and practice of Chirurgery*. By *W. Salmon* London 1699. p. 639. 521) *Assalini* l. c. p. 56. — *Klaunig* in neuen Schriften d. Kais. Acad. d. Naturforscher. II. Bd. vido *Weinrich's* Ausgabe I. Th. p. 122. — *E. G. Baldinger*. historia mercurii et mercurialium medica. Lib. I. Gotting. 1785. p. 47. Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften, Abhandlung. aus der Naturlehre etc. aus dem Schwedischen übersetzt von *Abraham Gotthelf Kästner*, 30 ster Bd. 1768. Vid. *Richters* chir. Bibl. 1 ster Bd. p. 95. — *The London medical Repository* etc. By *G. M. Burrows* and *A. T. Thomson* vol. V. 1816. March, April. 1 ster Theil. *W. Newham* mercurium dulcem cum spongia marin. ust. conjunctum maximo cum fructu saepius adhibuit. Vid. med.-chir. Zeitung, fortgesetzt von *Joh. Nepom. Ehrhardt*, 2ter Bd. 1817. No. 28. 7ter April 1817. 522) *Medic. clin.* p. 467. — *Iphofen* l. c. p. 143. §. 208.

id. spong. cet. combureretur, unde hepar sulphuris
 alcalinum proferebatur. Magna cum laude hoc reme-
 dium nominant *Girard*⁵²³), *Selle*⁵²⁴), et *Foderé*⁵²⁵).
 Sic quoque die 50 grana hepatis sulphuris in sufficiente
 quae quantitate soluta exhibet, indeque magnas se sa-
 sse strumas adfirmat. Kerm. miner. non edulc. in
 eundem finem proponit *Selle*.

*Celeb. Armstrong*⁵²⁶) ammonium laudat carboni-
 um sequenti modo adhibendum:

Rx. infus. Gentian. compos. ʒviijβ.

Ammon. Carbonnat. ʒβ.

tinct. Gentianae ʒβ.

M. Delur usui.

Jam vero aures mihi praeberi a vobis, qua possum
 mihi deimissione, peto. Quid mihi? imo vero veritati,
 quam non sileri, non dissimulari patiar, longiusque in
 profundo Democriti puteo demersam latitare, sed in au-
 ss eductam omnibus eam undique conspiciendam pro-
 nam. *Coindetio* enim, Medico Gebennensi, viro omni-
 terarum genere eminentissimo, servatum erat, ut fon-
 singularis effectus, quo spongia marina jam inde
 antiquissimis quibusque temporibus ad strumas amo-
 ndas polluit, e tenebris protraheret eoque incremento
 litterariam fortunaret: *iodinam* nempe, quae
 si auctore in spongia marina tecte et obscure tantum-
 modo reperitur, mente et cogitatione separando ad
 cutiendas strumas adhibuit, hujusque medicaminis

523) l. c. p. 426. 524) l. c. p. 467. 525) l. c. p. 65. 526) *Hu-
 feland's und Himly's Journal der praktischen Heilkunde. Ber-
 lin 1814. IV. Kurze Nachrichten und Auszüge p. 106. Kinder
 können hiervon von einer halben Unze zu anderthalb täglich
 3 mal steigen. Bei Erwachsenen vermehrt er die Menge des
 Ammon. carb. zu ʒj. auf 8 ʒ Mixtur. Dazwischen werden Mer-
 curial-Laxanzen gereicht, welchen *Hufeland* so wie den damit
 verbundenen tonischen Mitteln die günstige Wirkung vorzüglich
 zuschreibt.*

usum continuavit longum per tempus, donec finis opus praeclarum coronavit. Primus igitur est *Coindetius* inventor et auctor *iocinae* tanquam tutissimi et efficacissimi medicaminis ad strumas abigendas. Quod primum hic admirer aut praedicem, si exspectatis, Lectores, idem mihi plane accidere in hoc argumento ingenue ac libere fateor, quod iis evenire solet, qui, cum in aedes superbe ac magnifice exstructas deducti sunt, si atria hinc inde et coenacula tapetis et aulaeis insignita et pretiosa suppellectile condecorata intueri detur ac speculari, tam varia undique eos rerum subit admiratio, et ad quaevis ita obsupescunt, ut, unde potissimum in tanta tamque opulenta ac superba aedium nitela laudum suarum initium faciant, non constet. Quid enim? An in facto laudando non finis potissimum spectandus est, non causa? Ecqua vero justior, ecqua major esse potest ea, quae hominum, hominum, inquam, salutem spectat? Quid vero dictis opus est, ubi facta ipsa jam loqui quodammodo videntur? ego praestantiam ipsius tacitus admirari malo, quam et infantiam meam prodere et laudes ipsius ingenii culpa delerere: sed ex ungue leonem. Nonne mecum exclamabis?

*Coindet excelso animo maxima et
inaccessa tentavit, absolvit!*

Et sine dubio thesaurus ille repertus, quem solius *Coindetii* studio debemus, doctis vel parum cognitus vel plane ignotus longum adhuc per tempus restitisset, nisi bona fortuna illustrem *Formeyum* duxisset Gebenham. Qui cum alia tam Veterum quam Neotericorum monumenta perlustraret, in hunc quoque thesaurum incidit eumque statim recepit ac paullo post libellum⁵²⁷⁾ in forma octona ea de re edidit. Sed ut exactius amoe-

527) Bemerkungen über den Kropf und Nachricht über ein dagegen neu entdecktes wirksames Mittel, von Dr. L. Formey. Berlin 1820. 24 Seiten.

issimam hanc doctrinam explicem, operae pretium me facturum arbitror, si *Formeyum ipsum* faciam loquentem, ut non solum subtiliter sentiatur et judicetur, quae vera sit lectio, sed etiam, quae mens cujusque sci, quis tenor dicti, quae denique sententiarum veritas. Scribit autem p. 15-22. sequentia:

„Dasjenige Heilmittel, welches sich am bewährtesten gegen den Kropf gezeigt hat, ist der calcinirte Seeschwamm (*Spongia marina usta*) und die Schwammkugel. Man hat dies Mittel rein empirisch angewendet, und die Art seiner Wirksamkeit nicht zu erklären vermocht.

Als der scharfsinnige und gelehrte Dr. *Coindet* in Genf in Erfahrung gebracht hatte, dass Herr *Fife*²²⁸⁾ in Edinburgh die Gegenwart der *Jodine*²²⁹⁾ in diesem Schwamme nachgewiesen, kam er auf die Vermuthung,

228) Die Abhandlung des Herrn *Fife* befindet sich im Edinb. phil. Journal 1819, 2. Quartal; in den Annales de Chimie et de Phys. Decbr. 1819, ist davon eine französische, und in *Gilbert's Annalen der Physic* etc. Novbr. 1820. S. 241 eine deutsche Uebersetzung mitgetheilt. — In demselben Stücke der *Gilbertschen Annalen*, S. 249 findet sich auch ein Aufsatz des Herrn Dr. *Staub* in *Hofwyl*: „Bemerkungen über Quellen und Anwendung der Jodine“, aus dem wissenschaftlichen Anzeiger der allgemeinen Schweizergesellschaft vom 1sten Februar, No. 8., J. 1820, übergetragen. Er macht darin bekannt, dass er nicht nur aus der Schwammkohle (*spongia usta*), sondern auch aus dem Torfe seiner Gegend Jodine erhalten habe, und stellt es als wahrscheinlich auf, dass in dem officinellen Schwamme die Jodine der wirksame Bestandtheil sey. Es hat daher auch Herr Dr. *Staub* gleich nach Vorlesung obigen Aufsatzes von *Coindet*, in der Gesellschaft, mit Verweisung auf diese seine frühere Mittheilung, für sich zuerst die Empfehlung der Jodine als Kropfmittel in Anspruch genommen. (S. den Bericht von der Sitzung der allgemeinen Schweizer-Gesellschaft für Naturwissenschaft zu Genf, vom 25sten bis 28sten Juli 1820, in *Gilbert's Annalen* 1821. 1. St. S. 97.)

229) Französische Synonyme sind: *Jode*, minder gebräuchlich

dass diese Substanz das Wirksame in jenem Medikamente seyn könne, und begann ganz in der Stille einige Jahre hindurch Versuche damit anzustellen, welche das günstigste Resultat hatten. Die Jodine⁵³⁰⁾ ist eine noch unbekannte Substanz. In der Asche des Seetangs ist sie reichlich enthalten, und scheint am häufigsten im *fucus vesiculosus* vorhanden zu seyn.⁵³¹⁾

Jone, Varc, (*Varech, Vareck*, französische Benennung des Seetangs) wornach die Deutschen: (die) *Jode*, *Jodine*, (das) *Jod*, *Joed*, *Jodin*, *Jon*, (der) *Varechstoff*, so wie die Lateinischen: *Jodium*, *Jonum*, *Varecum* gebildet worden sind. Allmählich scheint von diesen verschiedenen Benennungen die: *Jodine* die angenommenste zu werden. 530) *H. Davy* über einen neuentdeckten Stoff: (In *I. S. C. Schweigger's Journal für Chemie und Physik*, 11. 68.) *Vauquelin* über die Jodine: (In *L. W. Gilbert's Annalen der Physik*, 48, 305). — *Gay-Lussac* sur l'iode: (In *Annales de chimie, ou recueil de memoires concernant la chimie et les arts, qui en dependent et specialement la pharmacie*, 91, 5.) — siehe ausserdem noch: *Courtois* (In *Ann. de Chimie* 88. 394 und 311. — *Gay-Lussac* in *ann. de chimie* 88. 519. —) *Orfila*, traité des poisons, à Paris 1814.; *Accum, Fischer, Gordon, Davy, Clement und Desormes* und *Gay-Lussac* (in *Gilbert's Annalen* 48. 1 — 39.), *Gilbert, Thomson, Colin und Gaultier de Claubry* (in *Gilbert's Annalen* 48, 275.) und *Clement und Desormes* (in *Gilb.* 48, 367.) Ganz neuerdings: Pharmaceutische Erfahrungen über das neue Mittel gegen den Kropf, von *Aug. Le Royer*, Apotheker zu Genf, und *J. A. Dumas*. Frei übersetzt nach Herrn *Caventon* von *Gaertner*, Hofapotheker in Hanau: in *Gilbert's Annalen der Physik etc.* Jahrgang 1821. St. 7. p. 241 — 249. — Ferner *Schweigger's* neues Journal für Chemie und Physik, vorzüglich im 15ten Band, S. 382 — Hedenus.

531) Der *Fucus vesiculosus* ist schon längst als Arzneimittel angewendet worden. Die Kamtschadalen wenden die Abkochung desselben gegen den Durchfall an. *Russel* empfiehlt ihn gegen Drüsenverhärtungen, sowohl innerlich als äusserlich. Unter dem Namen von *Aethiops vegetabilis* ist die Asche desselben gegen den Kropf mit Nutzen gebraucht worden. Der Geschmack dieses Pulvers ist widrig, der Geruch schwefelartig. Diese Wirkungen sind ohne Zweifel der damals unbekannten Jodine, welche

Sie wurde im Jahre 1815 von dem Salpeterfabrikant *Tourtois* in der Normandie entdeckt. Die Art diesen Stoff zu gewinnen ist folgende: Auf den von der Auskugung des Natrons darin bleibenden unauflöslichen Theil der Seetangasche wird concentrirte Schwefelsäure gegossen. Es entstehet Erhitzung, und der neue Stoff erscheint in Gesalt eines violetten Dampfes, der sich in krystallinischen Lamellen an die Wände des Gefäßes ansetzt. Seinen Namen hat ihm *Gay-Lussac* wegen der veilchenblauen Farbe der aufsteigenden Dämpfe gegeben. Die abgewaschene und getrocknete *Jodine* hat ein metallisches, dem Eisen ähnliches Ansehen oder krystallinische Structur, einen schwefelartigen, der *Chlore* ähnlichen Geruch, einen scharfen, bittrigen Geschmack. Sie färbt die damit in Berührung gebrachten thierischen und vegetabilischen Substanzen gelb, welche Färbung nach einiger Zeit schwindet. In der warmen Luft verfliegt sie, selbst wenn sie mit Wasser bedeckt ist. Sie ist nicht brennbar, sondern vielmehr selbst verbrennend, und verbindet sich unter Mitwirkung der Wärme mit allen brennbaren Substanzen, womit sie theils saure, theils salzige Zusammensetzungen bildet. Mit *Oxygen* verbunden, erscheint sie als *Jodin-Säure* (*acidum jodicum*) und mit *Hydrogen* als *Hydriodin-Säure* (*acidum hydriodicum*). In Wasser wird sie sehr langsam und nur zu einem geringern Theile aufgelöst. Dagegen erfolgt eine vollständige Auflösung derselben in Alkohol. (Eine Unze *Alcohol* von 0, 82 löst 40 Grad *Jodine* auf.) Die *Curma-Tinctur* wird davon hochroth und die der Veil-

er enthält, zuzuschreiben und die man für Eisentheile hielt. Dieser *aethiops vegetabilis* erregt ebenfalls Ueblichkeiten und Erbrechen. *Van Geuns* hat mit diesem Mittel eine durch Anschwellung der Drüsen des *Oesophagus* bewirkte Verhinderung des Schlingens geheilt. *Murray* appar. medicam. Vol. V. p. 557.

Ceh. Rath Formey.

chen orangenroth gefärbt. Mit Terpentinöl gemischt entsteht sofort eine heftige Entzündung mit Explosion. Schwefel - ³³²⁾ und Salpetersäure wirken nicht auf die *Jodine*, aber die Salzsäure wird davon rothbraun gefärbt. Die Essig- und Bernsteinsäure lösen sie auf, und erzeugen damit tief - orangenrothe Flüssigkeiten.

Die *Jodine* lässt sich sowohl mit Kalk als mit *Natrum* verbinden. Dieses geschieht, indem man die hydriodinische Säure damit sättiget, und die Flüssigkeit bis zur Krysallisation verdunsten lässt. Noch einfacher ist es, zwei Theile der *Jodine* in einer saturirten Auflösung von *Kali* oder von *Natrum* zu bringen, und die Mischung wohl umzurühren. Bleibt diese Flüssigkeit braun gefärbt, so setzt man so viel von der alkalischen Basis hinzu, als erforderlich ist, um derselben eine citronengelbe Farbe zu geben. Diese Mischung, wenn

532) In *Leopold Gmelin's* Handbuch der theoretischen Chemie 1ster Bd. p. 244—245. Frankfurt am Main, 1817, lese ich in Bezug auf die Verbindung der *Jodine* mit dem Schwefel und seiner Säure folgendes: „a) *Jodschwefel*. Die Verbindung erfolgt nur bei Erhitzung und nicht mit der Lebhaftigkeit wie die Verbindung mit Phosphor; sie lässt sich auch unter Wasser bewerkstelligen. Schwarzgraue, strahlige, glänzende, dem rohen Spiessglanz ähnliche Masse, unter 60 Grad schmelzbar, im Wasser unauflöslich. In etwas höherer Temperatur wird die Verbindung zersetzt, indem das Jod sich verflüchtigt. b) *Schwefelsaures Jod*. Das Jod löst sich in verdünnter heisser Schwefelsäure ein wenig auf; beim Erkalten der Flüssigkeit schießt es daraus in Nadeln an. — Siehe auch *Ludwig Wilhelm Gilbert's* Annalen der Physic etc. Jahrgang 1821. Stück 7. „*Jodine-Schwefel-Wasserstoffsäure*, aufgefunden bei der Bereitung der *Jodine-Wasserstoffsäure* nach *Gay-Lussac's* Verfahren, von *Choulant* in Freyberg: pag. 250 - 52.“ ferner in dens. Annalen: „Ueber die Verbindungen des ersten und zweyten Phosphor-Wasserstoffgas mit dem *Jodine-Wasserstoffgas*; von *Houton Labillardière* in Paris, frei bearbeitet von *Gilbert*, pag. 253—259. Hedenus.

ie 24 Stunden in Ruhe bleibt, setzt in ihrer Verbindung mit *Kali* ein weisses Präcipitat ab, welches jodinsaures *Kali* ist (*Jodate de potasse*). In der Verbindung mit *Natrum* entsteht langsam eine blättrige Krystallisation, das jodinsaure *Natrum* (*Jodate de soude*).

Die *Hydriodaten* bleiben in beiden Mischungen zurück, und sie erscheinen als Krystalle bei langsamer Evaporation der Feuchtigkeiten. Diese beiden Arten von Krystallen unterscheiden sich dadurch, dass die *Jodaten* auf brennenden Kohlen schmelzen, in *Alkohol* von 0, 82 unauflösbar sind, viel Wasser zu ihrer Auflösung bedürfen, von Schwefel- und Salpetersäure nur bei einem gewissen Wärmegrad decomponirt werden; die *Hydriodaten* sich dagegen schnell im Wasser auflösen, und durch Schwefel und Salpetersäure leicht zersetzt werden. Diese genannten *Hydriodaten*, welche aus einer Verbindung des *acid. hydriodici* mit *Kali* oder *Natrum* bestehen, sind es, welche Dr. Boindet als Heilmittel gegen den Kropf und zwar beide mit gleich gutem Erfolge angewendet hat. Doch hat er deswegen häufiger das *hydrodin*-saure *Kali* im Gebrauch gezogen, weil es im Wasser leichter auflöslich ist; er hat 48 Gran dieses Salzes in einer Unze destillirten Wassers aufgelöst, und davon des Morgens nüchtern Vormittags um 10 Uhr und gegen Abend jedesmal 10 gtt. in einer Tasse mit Zucker versüßtem Wasser dem am Kropf Leidenden nehmen lassen. Nach einem achttägigen Gebrauche hat er statt zehn, fünfzehn Tropfen und noch einige Tage später 20 gtt. jedesmal verordnet. Da jedoch diese Salze nur durch eine sorgfältige Präparation in den Apotheken zu erhalten sind, so hat er an ihrer Stelle eine Auflösung der *Jodine* in Weingeist angewendet, und diese aus 48 Gran dieser Substanz in einer Unze *Alkohol* von 55° bereiten lassen. Dieses unter dem Namen der *tinctura jodinae* von ihm empfohlene, in jeder Apotheke leicht zu bereiten-

de Heilmittel hat er eben so, wie die vorige Auflösung, verordnet, und glaubt sie von noch besserer Wirkung gefunden zu haben. Das einzige, was bei ihrer Anwendung zu bemerken ist, besteht darin, dass sie nicht lange zuvor bereitet seyn darf, weil bei ihrer längern Aufbewahrung sich dieselbe zersetzt und *Jodin*-Krystalle darin anschliessen, wodurch das Mittel leicht eine heftigere Wirkung äussern dürfte.⁵²³⁾ Mehr als 20 Tropfen dieses Medicaments, dreimal des Tages gereicht, hat der Entdecker nur selten angewendet. Diese Gaben reichen nach seiner Versicherung aus, die stärksten Kropfe völlig zu schmelzen, insofern diese lediglich von einer Auftreibung der Substanz der Schilddrüse herrühren, und noch keine Desorganisation des Gebildes statt findet.

Etwa acht Tage nach der angefangenen Cur erscheint die äussere Haut über dem Kropf weniger gespannt, seine Substanz fühlt sich weicher an, ohne dass jedoch dann schon die Auftreibung abnähme. Die einzelnen Theile der Drüse werden deutlicher, weichen auseinander, sind weniger hart, nun erfolgt allmählig erst ihre Verminderung. Die etwa daran befindlichen desorganisirten Stellen fühlen sich alsdann härter an, stehen freier hervor und lassen in den Fällen, wo eine chirurgische Operation nöthig seyn sollte, diese leichter zu.

In einigen Fällen bleibt das Zellgewebe über dem verschwundenen Kropf einige Zeit locker und teigig. Auch geschieht es, dass der Kropf nicht vollständig

523) Bei den erwähnten Gaben bemerkt man keine Veränderung an irgend einer Function, noch sonst ein davon herrührendes Symptom. Einige sehr reizbare Kranke wollen etwas erhöhte Temperatur der Haut wahrgenommen haben. Eine kaum merkliche Beschleunigung der Pulsschläge ist zuweilen wahrgenommen worden.

Geh. Rath Formey.

geht, aber jedesmal wird er so vermindert, dass er die Unförmlichkeit noch Beschwerden getragen wird.

Mehrentheils verschwindet er aber vollkommen in einem Zeitraume von 6 bis 10 Jahren bei der fortgesetzten Anwendung dieses Heilmittels.

Auf alle Weise scheint dasselbe daher der Aufmerksamkeit der Aerzte werth zu seyn, und zwar um so mehr, als der Nutzen dieses Medicaments sich auf die erwähnte Krankheit nicht beschränkt, sondern von einer grossen Wirksamkeit auf den gesammten Organismus und namentlich auf die Genitalien beider Geschlechter ist. — — — —

Paullo post illustris *Formeyus* novam paravit operis sui lectu dignissimi editionem (Berlin am 5ten Febr. 1822), in qua supplementi loco plures easque admodum ingeniosas de usu jodinae in variis morbis observationes uberius exponere necessarium duxit; attentius legantur haec:

„Nie, versichert er, sah er in seiner eigenen Praxis von der nach der Vorschrift des Dr. *Coindet* bereiteten *Jodine-Tinctur* eine nachtheilige Wirkung, vielmehr bestätigte sich in mehreren Fällen der von ihm gerühmte Erfolg. Da in der berglosen sandigen Mark Brandenburg Kröpfe eine Seltenheit sind, hatte *Formey* nur 7 mal Gelegenheit, dieses Uebel mit der *Jodine-Tinctur* zu behandeln; 5 mal wurde innerhalb 3 Wochen damit vollständig geheilt, 2 mal bedeutend verändert, 1 mal aber der Kropf nur weiter gemacht und mehr aufgetrieben, und 2 mal blieb unverändert. Als *Emmenagogum* blieb die *Jodine-Tinctur* in allen 4 Fällen, in welchen sie vom Hrn. Geh. Rath *Formey* versucht wurde, ohne die beabsichtigte, ja ohne irgend eine Wirkung; in 2 vermutheten Krankheiten eines des Eiersöcke, war sie in der einen von zweifelhaftem, in der andern von gar keinem

Nutzen; dagegen zeigte sie sich wirksam in 2 Krankheitszuständen männlicher Genitalien mit aufgehobenem Geschlechtstriebe.

In Genf sagte man, zufolge Briefe, die Hr. *Formey* erhielt, der *Jodine* viel Böses nach, in Bezug auf ihre Nachwirkungen; es sollten sich bei Einigen nach mehreren Wochen grosse Hinfälligkeit, gesteigerte Sensibilität, Schlaflosigkeit, Schwäche der Sehkraft und selbst wassersüchtige Zufälle eingestellt haben; ganz besonders aber machte man dort der *Jodine* den Vorwurf, dass sie auf eine auffallende Weise den Umfang der weiblichen Brüste vermindere, und der Schönheit des Busens nachtheilig sey. Aus einer andern Quelle erfahre ich indess, fügt Hr. *Formey* hinzu, dass diese ungünstigen Wirkungen nur dann statt gefunden haben, wenn man die Vorschrift des Dr. *Coindet* überschritten und das Mittel in grösserer und steigender Gabe, oder statt der *Tinctur* die Substanz selbst gereicht hat, indem die schlechte *Medicinal-Polizey* es dort jedem Unbefugten gestattet, Heilmittel zu verordnen. Diese nachtheiligen Folgen haben jedoch die Gegner des Dr. *Coindet* viel zu hoch angeschlagen.

Die geistige *Jodine-Tinctur* hat einen scharfen, vielen Ekel erregenden Geschmack, Zuckerwasser bestimmt ihr diesen nicht, wird sie aber mit einer halben Tasse Mandelmilch genommen, so erregt sie keine Neigung zum Erbrechen, und scheint besser zu bekommen. — *Tantum de Formeyi placitis, huc facientibus.*

Postremo adhuc loco, quantum quidem per me licet; adnotandum est, in quonam diario *Coindetius* ipse de jodinae viribus et de cautione, quae in ejusdem usu contra strumam est adhibenda, fusius disputaverit: hoc est: „Bibliothèque universelle, tome 14. page 190. et suivantes 1820 et Février 1821, où je viens de lire

écrit intitulé, *Découverte d'un nouveau remède contre le goître*, communiqué à la société helvétique des sciences naturelles, réunie à Genève, dans sa séance du 25 Juillet 1820, par M. le docteur *Coindet*, médecin de cette ville. “ Hic talis vir fine hujus tractatus verba sequentia, quae in germanicum sermonem versa in: „Blätter für Geist und Herz, St. 127. S. 592. 1821. et in *Annalen der Physis und der physicalischen Chemie*, von *L. W. Gilbert*, Jahrg. 1821, St. 7. p. 258. 59.“ leguntur, adjecit:

„Ich warne jedermann, sich der Jodine nicht ohne Arzt zu bedienen, und ermahne die Aerzte, sie bei solchen Kranken, die sie alle Tage sehen können, zu verschreiben, sie nicht in zu starken Gaben brauchen und sie jedesmal aussetzen zu lassen, sobald sich der nachtheilige Zustand äussert, den ich mit der Benennung *Sättigung* bezeichnet habe, besonders aber weder bei Brustkranken und Schwängern, noch bei Personen anzuwenden, die Anlage zur Auszehrung haben, oder sonst von schwächlicher Gesundheit sind.“
 r. etiam „Allgemeine medizinische Annalen auf das Jahr 1821. Herausgegeben vom Dr. *Pierer* und Dr. *Violant*, 9tes Heft, im Septbr. p. 1154—65. et p. 1171—84.

Praeterea adeat, qui de usu medicaminis istius cultura legere cupiat, *Hufelandum* (im Journal der prakt. Heilkunde, Jahrg. 1821.) *Graesium* (im Jahresbericht über das klinische chir. ophthalm. Institut zu Berlin; 1821. p. 10.) et *Perretium* (in Feuille du Canton de Vaud No. 97. Lausanne 1821. cfr. quoque Allgem. med. Annalen auf das Jahr 1821, 9tes Heft, p. 1165 s. 70; videas etiam, quae de eadem materia egregie exposuere Viri celeberrimi, Dr. *Clarus* Lipsiae, Dr. *Atthey* Genevae, Dr. *Irminger* Tiguri, et Dr. *de Serro* Viennae, perbene contra aliorum laudes novi

inveni illimitatas admonentes: (cfr. primum „Schreiben an den Professor *Gilbert* über den Gebrauch der Jodine als Heilmittel von dem Hofrath Dr. *Clarus*, Leipzig den 28sten Juli 1821; in *Gilberts Annalen der Physik* etc. Jahrgang 1821. St. 7. p. 309 — 11.“ — deinde eodem diario p. 311 — 13. „Einige therapeutische Bemerkungen über den Gebrauch der Jodine von dem Dr. *Matthey* in Genf, d. 7. April 1821.“ — postea eodem diario p. 227. „Brief des Dr. *Irminger* zu Zürich, vom 2. Febr. 1821 an den Genfer Apotheker, Hrn. *Colladon*.“ — denique eod. diar. p. 313 — 15. „Aus einem Briefe des Dr. *de Carro* zu Wien den 2. April 1821.“ — Merentur haecce scripta insignioris momenti fructuosiusque ad usum jodinae illustrandum facientia, quae in ipso opere, quod in plerorumque medicorum manibus esse, merito expectandum est, attentius repetantur. —

Quod hic supplementi loco adjiciam, praeter auctores hosce modo memoratos *Verdeil jun.* adhuc nominandus est, qui in cane struma et cretinismo vehementer laboranti tincturae istius auxilio feliciter instituit curationem; communicavit observationem istam vir doctus cum *societate physico-medica*, quae Lausoduni floret. — Unum denique restat, unum inquam, ut illustris *Foderé* in medium producat, qui ita de *jodina* disputat: „*M. Coindet* a trouvé, dit il, que *l'iode* pure est le principe, qui agit dans l'éponge calcinée, et le vrai spécifique du goître; *l'iode* (dont le goût est affreux) donnerait en outre du ton à l'estomac, exciterait l'appétit, etc., ce qui est réellement admirable, et ce qui le sera encore plus, si le succès répond aux espérances, que l'auteur voudrait nous faire partager. *Pour moi, je continuerai à me servir des vieilles tablettes pour le goître: préparées avec soin, elles me réussissent chaque jour, et n'ont jamais fait*

e mal à personne Mais on ne saurait se flatter, que le goût ne revienne pas, à moins d'aller habiter un pays sec. *Nè dans un pays goîtreux, j'ai eu cette maladie dans ma jeunesse: elle m'avait passé en quittant le berceau de mes pères, et elle m'est revenue depuis que je suis à Strasbourg, quoique je commence à vieillir. C'est donc l'air qu'on respire, qui fait le plus à son développement.* (id. voyage aux Alpes maritimes par Fr. Em. Foderé, tome II. p. 235. Paris 1821. Sed jam desino, et nem facio de *jodina* dicendi.

Reliqua, quae passim prostant et ab auctoribus hodie commendantur, partim sufficienti carent experientia, partim minus sunt efficacia, unde communiter hodie negligantur. Talia sunt lapides spongiae in revisia, electuarium ex pulvere ossium gallinarum, pulvis serpentis combusti cum foenu graeci semine, quae florum genistae et conserva eorum, radix rusci pulverisata, radix aristolochiae rotundae, bryoniae, aspidulae, squillae, herb. apiastr., rutae, satureja, pimpinella, pilosella, bulbus gladioli, qui interne commendatur; item decoctum talpae in vino et cineres talpae, decoctum sassafras, liquiritiae cum passulis, malva, sempervivo, semine foeniculi, anisi, coriandri, calce viva a *Richardo Lowero* laudatum, caro viperarum, pulvis lacertarum sive cum sive sine aceto maceratarum, spongia cynosbati et pulvis ex ea *Handornii* in cynosbatologia p. 176. item decoctum radicis vincetoxici albi, quae subus strumosis mederi dicitur et in hydrope laudatur, atque ideo etiam in urinis ab *Elsnero* commendatur, item decoctum radicis ebuli in vino albo cum pulvere piperis haustum, quod juxta *Pedemontanum* pag. 94. intra quinquaginta dies strumas absumere dicitur, item decoctum radicis scrophulariae et aqua ejus, infusum parony-

chiae foliis rutaceis, quod *Boyle* de specificis, pag. 121 laudat, et *Joh. Colbath* in tentamine physico-medico propria affirmat experientia. —

Praeter interna vero remedia non negligenda sunt externa, quibus illorum vis augeatur atque ita curatio facilius perficiatur; praecipua nominabo.

Galenici topica quoque remedia ad subsidiarias vocant copias, initio quidem emollientia, vel resolventia, et discutientia, at quando haec nihil praestitura conspiciuntur, ipsa substituunt suppurantia. Ad priora referunt emplastrum de meliloto, oleo chamaemelino malaxatum, emplastrum de mucilag. oleo Irino malaxatum, ceratum de oesypo Phylagii, Cataplasma ex farina lupinor. amaror. in oxymelite, aut ex fimo bubulo in aceto coctis, vel malagma monomachium sequens ab Actuario commendatum:

℞. Spum. argent. ℥β.
 farin. rad. altheae ʒix.
 sem. malv. sylvest.
 foenugr. sing. ʒiij.
 lini ʒj.
 sertulae campanul.
 anethi. sing. ʒβ.
 chamaemel. ʒiij.
 veratr. candid. ʒiij.
 sampsuch. ʒj.
 Adip. suill. vetust. ʒiij.
 — — anserinae ʒβ.
 — — gallinaceae ʒj.
 medull. cerv. ʒiij.
 cerae ℥β.
 galban.
 colophon, sing. ʒij.
 ol. vetust. ʒxv.

Liquentur, quae liquari debent, et arida adjiciantur.

Suppurationem promovent, quando de discussione res cuncta redditur irrita, cataplasmatibus ex farin. rad. thymaeae, lil. alb., sem. foenugr., vitell. ovor., butyro capris parum assatis, nec prius abscessum aperiunt, sed de contenta materia omnimodo in pus conversa, ne sint certi, ne immatura facta apertione et spirituum dissipatione calor nativus ad suppurationem necessarius minuatur, proinde longo temporis tractu suppurationem apponunt, ut fomes strumosus suppuratione ista mitis exstirpetur. Si nec hoc obtinere queunt, et materia omni emollitioni et suppurationi repugnat, strumam minus profundis pendentibus radicibus, cutis intacta incisione, a partibus, quibus attexitur, divellunt, sed tamen animadvertendo, ne aut venas jugulares aut arterias carotidas, aut nervos recurrentes instrumento laedant. Haemorrhagiae instantis periculum evitant, ipsam strumam post divulsionem acu filum circumferente ad basin trajiciendo et filum utrinque arctius circumferendo, ut sic constrictae sensim decidant, et tumulus communis ratione denuo occludunt. *Oribasius*⁵³⁴⁾ collocho stercore ex aceto usus est strumas oblinens, commendat etiam bdellium tanquam remedium valenter collientis et efficacis facultatis, quod saliva jejuna ad emplastrum consistentiam subigendam suadet: *Aëtius* minutissima⁵³⁵⁾ remedia praedicat corticem radicis mangorae cerato irino exceptum, asinorum ungulas oleo maceratas et stercus bubulum, quod cataplasmatibus modo proponebat. *Scribonius Largus*⁵³⁶⁾ emplastrum incertioris, si id quis perseveranter imponat, commendat. *Marcellus*⁵³⁷⁾ mirum remedium vocat, quod ex spumae

⁵³⁴⁾ De morbo curat. lib. III. cap. X. LIV. ed. cit. vol. I. p. 634. ⁵³⁵⁾ De virtute simplicium medicamentorum lib. II. ad *Eunapium* cap. I. p. 595. ⁵³⁶⁾ Tetr. I. Sect. 2. p. 91. cap. CLVII. Vol. II. ed. cit. vid. etiam cap. CXV. p. 83. ⁵³⁷⁾ De compos. medicam. lib. p. 230. cap. 84. ⁵³⁸⁾ Cap. XV.

argent. p. j. Sal. ammoniaci, galbani et ol. veter. p. ij. conficitur. — *Helmontius* externe sequens adhibere jubet unguentum :

R \acute{x} . ol. laurin. per pingued. suill.

non adulterat. ℥viiij.

oliban.

Mastic.

Gummi Arabic.

Resin. abietin. sing. ℥iij.

M. et per retortam destilletur oleum cum cineribus clavellatis denuo rectificandum.

Willisius ad strumam amovendam fortiter discutientia externe commendat, fotum potissimum ex decocto radicis ononid. Irid. urticar. herb. agrimon. pulg. herniar. sem. foeniculi, nuc. cupress. sulphur. et alum. in vino vel lixivio coctis, vel flores salis ammoniaci dissolvit in spiritu frumenti, in quo pannos intingit, et calide eos imponit, aut emplastrum de bacis lauri cum stercoribus, vel ad rupturas. In majori vero malo remedia haec aliaque parum praestitura cum aliis fatetur, unde si tumor nihilominus adimendus sit, ad operationem chirurgicam circumspecte instituendam transitum admittit.

Sylvius ad discutiendas strumas non parum subsidii allaturum sperat emplastrum suum carminans ex gummis, opio aliisque paratum, post quod emplastro ad Hernias aliisque subadstringentibus, non contemnendas adscribit vires.

Cartesiani emplastrum de ranis magnis extollunt laudibus, etiamsi in totum ob terrestritatem materiae dissolvi nequeant, ad dolorem tamen mitigandum, et ne tumores increcant, emplastrum hoc profuturum credunt, gummosa vero et calidiora omittenda volunt. ne glandulae nimis irritatae in caucrum transeant, aut partibus subtilioribus violentius discussis reliquiae crassiores scirrhum producant. In principio, ne tumor

incrementum capiat, ferulas aut laminam plumbeam imponunt super emplastrum, et fortius aliquando colligant, observato tamen, ne gula nimium constringatur. Ad sectionem non nimium properant, nisi moribus hic non aliis cedat remediis et exstirpatio tamen ab aegris serio postuletur, tum caute eandem absque nervorum aliorumque vasorum laesione experto Chirurgo permittunt administrandam.

Medicus Dantiscanus sequenti modo feliciter instituit curam: interne dedit luna decrescente pulv. spong. marin. combust. et lap. spongiae calcinat. et sequenti liquore illini curavit strumas:

℞. vitrioli ad albed. calcinat. ℥ij.

Impast. cum spirit. vin. ℥ij.

C. C. ust. ℥β.

M. et ex Retort. destill. l. a. rostro add. Camphorae ʒβ. dein illini jussit sequenti linimento:

℞. ol. destill. ex lardo porcin.

— laurin. sing. ʒj.

M.

Dolaeo auctore inter Topica in principio discutientia sunt adhibenda, et dein ad emollientia accedendum; si vero haec nihil efficiant in strumis, exedentia seu corrodentia usurpanda. Discussientia parantur ex volatilibus, hinc *Barbette* commendat unguentum ex ale volat. quodam cum butyro majali, ut et emplastrum sequens, quae optima sunt:

℞. Gumm. Galban.

— Ammoniac.

— bdell. sing. ʒβ.

bacc. laur.

staphyd. agr.

pyrethr.

cumin. sing. ʒvj.

Stercor. columbin. ʒj.

— caprin.

Axung. porci ʒjβ.
 ol. chainom. ʒj.
 cerae et picis sing. q. s.
 M. F. Emplastrum.

Vel:

R̄. succ. Raphan.
 salis volatil. ʒj.
 Sapon. Venet. ʒij.
 Coq. in Unguentum.

Spirituosa vero *Dolaeo* magis placent: ex. gr.

R̄. spirit. topic. ʒij.
 — ammoniaci ʒj.

M.

Vel sequens, quod experientia viri illius comprobatum est:

R̄. spirit. frument. ℥ij.
 bacc. Juniper.
 — lauri sing. ʒβ.
 fol. beton.
 — serpyll.
 flor. lavendulae sing. Pij.
 sal. ammon. ʒβ.
 tartari ʒj.
 lign. guajac.
 rad. sarsapar. sing. ʒvj.

Coque in aperto vase, detur pro Epithemate.

Ad fermentationem in succis stagnantibus excitandam, et ad motum materiae latentis incitandum conducet *Dolaeo* etiam duce prae aliis cataplasma sequens vel simile:

R̄. lb. scord. absynth. rutae,
 cicutae sing. Mj.
 stercor. columbin. ʒvj.
 sal. tartar. colocynth. sing. ʒvj.
 lb. salviae Mj.
 sem. bordan. ʒv.

foenicul. $\bar{3}j\beta$.
 sal. ammon. $\bar{5}ij$,
 extr. rad. bryoniae
 sem. cumin. sing. $\bar{3}\beta$.

Add. faecib. vini vel urina f. cataplasma, et quidem bis de die applicandum.

Post applicatum cataplasma struma sequenti illinenda est linimento, quod commendat *Overcamp.*:

\mathcal{R} . ungu. Dialth. $\bar{3}j$.
 ol. succin.
 ol. Juniper. sing. $\bar{3}j\beta$.
 ol. Laurin.
 ol. Philosoph.

Spiritus salis ammon. sing. $\bar{5}ij\beta$. M. D.

Post inunctionem applicari potest seq. Emplastrum:

\mathcal{R} . Empl. melilot.
 — diachyl.
 gumm. galban. sing. $\bar{3}\beta$.
 — labdan. $\bar{3}j\beta$.
 pulv. myrrhae
 — aloës sing. $\bar{3}\beta$.
 macis caryoph. sing. $\bar{3}ij$.
 sem. cumin. \mathcal{R} . salv. sing. $\bar{3}j$.
 Tinct. labdan. $\bar{3}\beta$.
 styrac. liquid $\bar{3}ij$.
 sal. volat. C. C. $\bar{3}vj$.
 ol. macis still. $\bar{5}ijj$.

M. F. Ceratum.

Scultetus laudat oleum lacertarum, *Dolaeus* verinum, quo multum praestitit. Sic et pinguedo verina in strumis incipientibus egregia medicina est; earumque incrementum praecavel. Inter res solventia et numerari potest tanquam egregium remedium sal volat. lap. spongiae in liquorem arte chemica redactum et externe illitum. Item sequens illinatur saepius:

℞. spirit. vin. camphor. ʒij.
tinct. antimon. ʒj. M.

Optime resolventia *Dolaeo* auctore cum maturantibus et emollientibus adhibentur, in quem finem conducunt gumm. Ammon. Galban. opopon. etc. Sic et oleum irinum, liq. terr. fol. et ol. tartari per deliquium, item *Helmontii* efficacissima sunt in resolvendis strumis. Spiritus convulsivus n. d. etiam conducit saepe strumis illitus. Conveniunt quoque pro resolvendis his tumoribus strumosis omnivaria mercurialia, et emplastrum illud in tumoribus discutiendis adeo famosum *Vigonis* de ranis cum mercurio, nec non amalgama mercuriale, ex quo et cum quo emplastra parata sunt proficua; item sequens *Dolaei* experientia optimum est:

℞. succ. rut.
— sabin. sing. ʒvj.
— squill. ʒβ.
aqu. vit. ʒij.
ol. lilior. alb.
— rutae sing. ʒj.
— castor. ʒij.
salis ammon. ʒiij.
sulph. viv.
lapid. pumic.
Nuc. cupress.
aristol. rot. sing. ʒβ.
euphorb. ʒβ.
cer. citr. q. s. F. linimentum.

Coque ad succ. consumptionem add. bdell. in acet. dissolut. ʒij.

Sequens *Eltmülleri* mercuriale non contemnendi erit usus:

℞. empl. diachyl. cum mucilag. ʒj.
mercurii vivi saliva extincti ʒj. M.

Exterius *Heinsio* ⁵³⁸⁾ auctore specialiter conveniunt discutientia et resolventia materiam pituitosam v. g. ol. laurin. sabin. cerae, sapon. Venet. scorpion. ⁵³⁹⁾ Lactis petroleum, emplastrum saturninum *Myns.* de ranis *Vigon.* c. mercurio, de bacc. laur. magnet. *A. Salae* ob resolvendi et evocandi virtutem, vid. *Wedel.* pharm. in art. form. redact. p. 101. Ubi quoque dolor simul adest, jubet *Barbett.* part. 2. lib. 1. c. X. Chirurg. addere emplastro opium ad 5j. ob vim resolvendi et dolorem sedandi. Si vero his dissipari renuit struma, ad suppurationem est deducenda, quod fit galbano, emplastro diach. cum gummatibus et aliis ex quibus loculis huc referendis.

Sic a *Langio* ⁵⁴⁰⁾ praescribuntur emplastra ex gum. ammoniaco, bdellio, galbano, sagapeno, opoponace, caranna, elemi etc. parata, ut diachylon cum gummatibus, de cicuta, galbano, de ammoniaco, oxymyroceum, cera catholica *Burrhi*, et quod instar omnium est, Emplastrum de ranis *Vigonis* cum mercurio, quod in omnibus fere tumoribus duris convenit, et eos maxime resolvit, imprimis si cum quadruplo mercurii misceatur, ob quam causam quidam forte sibi persuadent, strumas ut luem veneream esse tractandas; potest etiam aliud parari ex emplastro de meliloto cum gum. Galbano, Ladan., ammoniac. spermat. cet.,

538) *Jo. Michael Heinsii* diss. inaug. med. de strumis. Jenae 1687. 539) Vid. etiam *Joann. Mittermayeri* diss. de strumis ac scrophulis Bünsingensium. Jenae 1723. p. 20. — *Joh. Zacharias Platner* gründliche Einleitung in die Chirurgie. Leipzig 1770. p. 223. *Platner* sah, dass ein Chirurgus das oleum scorpionum äusserlich bei Kröpfen mit gutem Erfolg gebraucht hat. Es sind ihm ferner zwei Exempel bekannt, da nach dessen Gebrauch die Leute sind elend geworden, und haben mit Mühe durch Milch und andere Curen können wieder hergestellt werden. 540) *Christ. Gottl. Lange* diss. de strumis et scrophulis. Vitembergae 1707. p. 25 — 28.

ale volatili, cornu cervi, cineribus fagi, mercurio vivo, oleo Philosoph., rorismar., etc. Reliqua emplastra ex radice bryoniae, cyclaminis, cucumer. agr., alth., lili. alb. in vino coctis, et g. ammoniaco, ladan., bdellio, styrace, opoponace in oleo sesami solutis, cum stercore columbarum et caprino et pice navali, item ex cineribus *Deckeri* minus sunt efficacia, et experientia sufficienti destituntur.

Quia vero Cataplasmata medico hocce auctore emplastra saepe superant in vi emolliente, ideo haec quoque non sunt negligenda. Parantur ea ex radice bryoniae, allio, scrophularia, cucumer. asin., caepris, pasculis, ficibus cum farin. sem. lin., melle, etc. quibus nonnulli stercora inprimis columbarum addunt, licet impura talia non omnibus arrideant, quo nomine etiam *Solingerii* cataplasma, quod p. 165. im Handgriff der Wundarznei recenset, et in se ipso cum fructu adhibuit. *Sennerti* vero et *Hollerii* cataplasma ex foliis cupressi ⁵⁴¹⁾ pulverisatis, in vino rubro coctis, et *Joelii* op. med. T. 2. lib. 2. § 8. ex radice filicis, asplenii, ebuli in vino coctis cum sulphure, cineribus cochlearum et paucis melle ac aceto nondum probavit *Langius*.

Interdum etiam unguenta *Langio* duce cum successu illinuntur, inprimis cum calida non commode sola, sed potius cum emollientibus interpolata sint imponenda, ne tenuioribus partibus discussis crassiores magis indurescant. Tale vero est *Zacut. Lusitani* ex radice bryoniae in oleo olivarum cocta cum terebinthina et cera, quod auctor mire commendat, et nunquam se fefellisse putat. Alii parant unguentum ex radice scrophulariae in autumno effossa cum butyro recenti contusa. Tale etiam est unguentum *Helmontii* contra strumas, quod habet tractatu: Tartarus non in

541) Vid. etiam *Hufelands* pract. Journal 9ter Bd. 4tes Stück.

potu §. 17. et jam supra laudatum est. Simile habet *Langius* in epist. p. 987., qui tamen oleum philosophorum, terebinthinam et sal cerri addit. Alii unguenta haec conficiunt ex oleo succini, juniperi, myrtino, lauri, spiritu salis ammoniaci, sapone nigro, pinguedine viperarum, oleo tartari et similibus. Optima vero unguenta et linimenta sunt *Langio* auctore mercurialia ex unguento enulato cum mercurio, dialth., basilico etc., cum oleo succini, mercurio et similibus parata. Mercurialia tamen parcius sunt illinenda, ne salivatio exinde oriatur, quae non aequae semper est necessaria et aegris quoque non semper aridet.

Sunt etiam, qui *Langio* auctore fots laudant ex radicibus, herbis et aliis supra laudatis, imprimis ex porro cum foliis et radice oxylapathi, pyrethro et viridi aeris in vino coctis.⁵⁴²⁾ Inter optimos vero fots referenda est spongia spiritu salis ammoniaci et essentia camphorae impraegnata et imposita, quae potenter discutiunt atque resolvunt. Monent vero communiter Practici circa externa remedia, quod ante applicationem tumor, si non malignus fuerit, ad rubedinem sit fricandus, quod *Langius* non improbat, cum pori hoc modo aperiantur, et topica promptius penetrent, et lympham stagnantem discutiant.

Emplastrum praestantissimum ad strumas emolliendas *Mittermayero* auctore diss. cit. p. 20—21. habet *Joh. Vigierius* armament. chir. Lib. 2. cap. 15. R. succ. nicotian. maj. & β. succ. absinth. pontici maj. ʒiij. ol. Hyperici, irin. sing. ʒjβ. absinth. pont. maj. prunell. scrophular. sing. Mj. vin. alb. ʒjβ. M. Bulliant

542) *Anton. Marc. Venustus* cons. med. p. 80. de strumis saepe expertus est hoc mirabile remedium: R. Porri cum foliis lapathi acuti sing. ʒij. pulv. pyrethri ʒij. virid. aeris ʒj. M. contunde et bis quotidie fove locum.

ad vini et succi ferme consumption. in vase aeneo semper agitando; hinc exprimantur. Tunc Rec. Cerae flavae $\bar{3}$ iv. adip. hirci, terebinth. sing. $\bar{3}$ ij. thuris pulv. Myrrhae sing. $\bar{3}$ j. F. emplastrum, strumas et omnes tumores frigidos potenter resolvit. *Theod. Mayerne* suadet Emplastrum sequens plurimum valens: \bar{R} . Mass. Empl. diachyl. ireati et de mucilag. sing. $\bar{3}$ ij. Empl. de ranis c. quadruplicato mercurio $\bar{3}$ ij. cinnab. subtiliss. pulverisat. mercur. dulc. sing. $\bar{3}\beta$. pulv. subtiliss. rad. bryoniae et sigill. B. Mariae sing. $\bar{3}$ ij. camphor. $\bar{3}$ j. M. et cum s. q. balsam. peruv. f. emplastrum, cujus portio extendatur in aluta molli et strumis applicetur. *Purmannus* ⁵⁴³⁾ praedicat sequentia emplastra:

\bar{R} . empl. de gumm. Sylvii

— diaphor. Myns.

— diasulphuris Rulandi sing. $\bar{3}$ vj.

— oxycrocei

— ad Ruptur. Wurtzii sing. $\bar{3}$ ij.

sal. gemmae

— tartari sing. $\bar{3}$ j.

Flor. salis ammon. $\bar{3}$ ij β .

C. sq. Ol. tartari ad F.

\bar{R} . Empl. Diachyl. magn. $\bar{3}$ vj.

— Simpl. $\bar{3}$ iv.

— de ranis cum Mercurio $\bar{3}$ ij.

Cerae $\bar{3}$ viiiij.

Resinae $\bar{3}$ ij.

Terebinth. $\bar{3}$ ij.

Gumm. Galban.

— Ammon.

— Opopon.

— Bdellii sing. $\bar{3}$ j.

Pulv. ciner. spongiae

543) *Math. Godofr. Purmanni* grosser und ganz neu gewundener Lorbeerkrantz. Frankfurt und Leipzig 1722. p. 262. Vol. I.

Pulv. gallar. quercin.

— oss. sepiae sing. ʒiij.

— salis gemmae

— Pompat.

— Tartari sing. ʒij.

— sem. Nasturtii

— — cumin.

— — staphydis. agriac sing. ʒjβ.

ol. Mirtin. ʒβ.

— laurin. ʒij.

M. F. S. Kropf-verzehrendes Pflaster.

Linimentum ex oleo Bufonum quam plurimi extiti sunt optime proficuum, cui adderet *Mittermaye* diss. cit. pag. 20. ol. scorpionum simpl. atque com. *Matthioli* in hujusmodi tumoribus alias praestantissimum. *Ortolph. Maroldus* pr. med. tit. Strum. hoc describit: ℞. succi raphan. sabin. acet. et Smegm. ʒj. q. s. M. inungatur struma mane et vesperi, et resanescet. Inter unguenta commendat *Purmannus* l. op. 263.

℞. ungu. rosat. mes. ʒvj.

Gumm. Ammon.

— Bdellii sing. ʒj.

Sperm. cet. ʒiij.

Sal. Lap. Pompat.

— Ammon. sing. ʒβ.

ʒ. q. ol. Bufonum ad U. f.

Haec sunt, quae ex veterum medicorum ac chirurgorum experientia non incongrua visa sunt; cum usus istorum remediorum nunc sit obsoletus, res tempus nos monet, ut vela pandamus atque ea indicemus, unde bonus effectus merito expectari possit.

Inunctionem olei camphorati profuisse affirmant

*Coppland*⁵⁴⁴), *Unterwood*⁵⁴⁵), *Foderé*⁵⁴⁶) Uti vero licet linimento volatili cum tanta camphorae copia, quae resolvi in ea possit. Camphora oleo soluta inprimis methodo *Duncan*. (Medic. Commentar. Dec. II. Vol. V. 1791.) laudata sequenti: ℞. camphor. ʒj. spirit. sal. ammon. compos. olei olivarum sing. ʒiij. diu terendo probe misc. ter de die diligenti frictione applicetur. Simile fere est a *Grunero* commendatum medicamentum ex camphor. ʒj. olei amygdalarum dulc. ʒj. spirit. sal. ammoniaci ʒβ. et ol. petrae alb. ʒij. constans, quod flannelae illitum tumori imponitur. *Osiander* l. c. linimentum volatile cum et sine camphora adhibuit et quidem maximo cum fructu; praescripsit etiam solutionem gumm. galbani in oleo nucum jugland. Nec inunctio olei chainomillae cocti saepe instituta usu caruit suo⁵⁴⁷) Sic etiam oleum tartari per deliquium.

Fomentum ex aquae ʒiij. tinctur. cantharid. ʒβ. e mercurii sublimati gr. X. externe, inprimis noctu, cum felici effectu applicavit *Marx*. (Obs. med. Hannov. 1774 Tom. I.) Fomentationes cum spiritu salis ammoniac volatili⁵⁴⁸), aut spiritu *Mindereri*⁵⁴⁹) saepe strumam sanarunt. Sic etiam spiritus mastychinus cum alumine et oxymel. squillitico a *Kämpfio* l. c. praedicatur. —

Emplastrorum resolventium ingens copia contra strumam laudatur, e. g. Empl. diachyl. comp. Diabotan. de bacc. lauri cet.⁵⁵⁰) *Willich* Empl. de melilot

544) *Coppland*. tres strumas hoc medicamento curasse affirmat vid. Med. Comment. Dec. II. Vol. V. p. 380. s. auch Sammlung ausersles. Abhandl. zum Gebrauche für pr. A. 14ter Bd. p. 418 — 420. Leipzig 1791. 545) Treatise on the diseases of children, London 1784. p. 145. 546) l. c. p. 66. 547) *Jamies* med. Dict. Tom. I. 548) *Mangel* Bibl. med. Tom. I. p. 259. — *Roncalli* l. c. p. 354. 549) *Michaëlis* Nachrichten aus London in *Richter's* Chir. Bibl. 5ter Bd. 1stes Stück p. 127 550) *Verduc*. l. c. p. 310. — *Dionis* l. c. p. 640. — *Decidi* l. c.

gumm. ammon. et extr. cicutae commendat⁵⁵¹).
Lettson emplastrum saponis Par. IV. cum camphora
 ar. I. tanquam emplastrum praestantissimum ad stru-
 ctas discutiendas exhibet.⁵⁵²) A *Kaempfer* et *Vog-*
*ro*⁵⁵³) laudatur emplastrum diasulphur. *Rulandi*
 ungum per tempus adhibendum. *Osiander*⁵⁵⁴) ad stru-
 ctarum sanationem nihil adeo commendat quam em-
 plastrum sequens:

℞. empl. de galbano croc.

— de ammoniaco

— diachyl. composit. sing. ʒβ.

— camphorae ʒj. Malax. optime.

*Wylye*⁵⁵⁵) sequens mirifice juvare credit:

℞. Empl. lithargy. ʒβ.

mercur. dulc. ʒj.

tartari stibiati ʒβ.

Fiat lege artis emplastrum.

Sal ammoniacum cum emplastro resolventi *van*
Lesscher l. c. I. Decl. 1. St. §. 654. proponit. Com-
 mendant denique alii emplastrum ex fermento panis
 cum spiritu camphorato; vid. *Wolstein* über die Wund-
 znei der Thiere, Bd. I. Wien 1784.

Inter linimenta alii suadent linimenta ex gumm.
 ammon. opopon. bdellii cet. in acet. vini solut.⁵⁵⁶), alii
 opoponem nigrum.⁵⁵⁷) Linimentum ex fellis tauri rec.
 ʒβ. ol. nucum ʒvij. salis culinar. ʒX. bono cum effe-

551) *Reichardt's* med. Wochenblatt, 1781. 12tes St. Efficax esse
 emplastrum cicutae testatus est *Gisler* in Königl. Schwedische Aca-
 demie der Wissensch. Abhandl. aus der Naturlehre etc. l. c.

552) *Memoirs of the Medical Society of London* instituted in the
 year 1783. Vol. III. XXVII. Medic. chir. Zeitung von *Harten-*
keil und *Mezler* 4ter Bd. 1793. Salzburg p. 318. *Richter's* chir.
 Bibliothek. 13ter Bd. 1stes Stück pag. 54—55. Zwei Kröpfe
 heilte *Lettson* durch Auslegung dieses Pflasters. 553) l. c.

554) l. c. 555) l. c. 556) *M. P.* ** *M.* précis etc. p. 570. —
Bertrandi l. c. p. 393. 557) *Verduc.* l. c. p. 310.

ctu applicatum est ⁵⁵⁸); *Wylie* ⁵⁵⁹) sequentem concinnavit formulam:

℞. fellis tauri rec. ʒj.
 salis commun. ʒβ.
 solve in aquae tepid. ʒj.
 adde
 olei olivar. q. s. ut fiat linimentum.

Lettsom l. c. cum commodo applicavit linimentum saponato – camphoratum.

Osiander ⁵⁶⁰) sequente liquore illini curavit strumas:

℞. extr. hyosciami ʒβ.
 solve
 in tinct. cantharid. ʒij.
 adde
 spir. salis ammon. caust. ʒβ.
 spir. vini camphor. ʒijβ.

D. S. bis terve in die illini jussit.

Fischerus saepe felicem expertus est effectum ex sequenti compositione:

℞. camphorae rasae ʒij.
 spirit. c. cervi ust. ʒiij.
 ol. hyosciami ʒijβ.

M. D. S. ut supra.

Unguentum digitalis purpureae ex foliorum succo recens expresso cum butyro ad succi consumptionem cocto magnum saepe attulit emolumentum. ⁵⁶¹). Deficiente succo recenti extractum digitalis purpureae cum emplastro de cicuta adhiberi potest. ⁵⁶²)

558) Abh. d. K. K. Joseph. Acad. zu Wien. Ir Bd. p. 337. Samml. a. A. für pr. Aerzte. XII. Bd: p. 264. 559) l. c. 560) l. c. 561) *J. Raji* catalog. plantar. Angliae. London 1677. p. 90. — *Thilesius* med. chir. Bemerk. Frankfurt a. Main 1789. Vid. *Richter's* chir. Bibl. gter Bd. p. 571. 562) *Quarin* l. c. pag. 120.

Rustius ⁵⁶³) experientia comprobatum habet sensus unguentum:

R. ungu. nervin.

— mercurialis sing. $\bar{3}\beta$.

spir. salis ammon. caust. $\bar{3}ij$.

tinct. thebaicae simpl. $\bar{3}j\beta$.

M. f. ungu. D. S. Ter quotidie infricandum.

Parentis nostri experientia strumae sequenti sunt ostendae unguento:

R. sapon. Venet.

fell. tauri rec. parat. sing. $\bar{3}\beta$.

ungu. de althaea $\bar{3}ij$.

ol. menth. piper. gtt. XII.

M. f. unguentum, sumatur nucis avellanae major quantitas mane, meridie et vespera.

Utilitatem etiam habet sal volatile cornu cervi cum unguento althaeae mixtum.

Aqua vegeto mineralis *Goulardi*, vel unguentum ex extracto saturn. Goul. $\bar{3}ij$. ol. terebinth. $\bar{3}j$. ung. leporis $\bar{3}j\beta$. et olei petrae $\bar{3}\beta$. saepius inunctum strumas dissipavit ⁵⁶⁴). Inunctionem olei.

⁵⁶³) l. c. *Rust.* pflegt auch, wenn nur eine einzelne Kropfgeschwulst zugegen ist, eine starke Solution des *tart. emetici* etwa $\bar{3}\beta$. in $\bar{3}ij$ — $iiij$. aq. dest. (ein Mittel, welches er zur Zertheilung einer Kropfgeschwulst nicht genug empfehlen kann) so lange anzuwenden, bis ein blatterartiger Ausschlag den fortgesetzten Gebrauch dieses Reizmittels auf einige Zeit verbietet.

⁵⁶⁴) Richtiger Gebrauch des Bleiextracts in äusserl. Zufällen etc. Halle 1783. 8. *Richter's chir. Bibl.* VII. Bd. 1stes Stück p. 40. De puella XII. annos nata sero lactis acido cum elixirio *Hoffmanni* atque extracto cicutae et terra foliata tartari brevi tempore sanata legimus in hocce opusculo. Externe applicabantur remedia modo laudata. De foemina quoque narratur, quae caeterum perfecta sanitate gaudens, quum lapidem ponderis enormis elevasset, illico dolores colli percepit, paullo post tumescentiam incipientem subito crescere vidit. Venae sectione

philosophorum vel petrae alb. etiam *Heisterus* suadet. ⁵⁶⁵⁾

Spongia, urina tepida imbuta et tumori imposita, spei medicorum saepe satisfecit. ⁵⁶⁶⁾ Spongiae ustae part. I. alumin. part. II. rad. dauci far. tritici, milii, piper. et conch. cum vitello ovor. in cataplasma redact. commendat *La Fosse*.

Inter mercurialia praecipuam ante omnia laudem meretur mercurius sublimatus corrosivus, ita quidem, ut mercurii gr. ij—ijß. in aquae destillatae 3j. soluta sint; solutio haec leni frictione bis de die applicatur et quam primum cutis ruborem a medicamento contraxit, quod in quibusdam citius, in aliis tardius fieri solet, a frictione abstinendum, locusque aqua frigida aut *Goulardi* fovendus est, donec in naturalem statum in eo loco redierit cutis; plures hoc medicato solo strumas resolutas esse novimus. —

Diuturnus porro electricitatis usus strumas interdum sanavit. ⁵⁶⁷⁾ —

Denique *Coindetius* illustris *jodinam* externe etiam adhibendam commendat. vid. Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, gesammelt und mitgetheilt von Dr. L. F. v. Froriep, Nr. IV. August. 1821. sic quoque Dr. *Matthey* usum laudat medicaminis istius externum: vid. *Gilbert's Annalen der Physik* etc. Jahrgang 1821. St. 7. p. 315.

Omnibus hisce remediis tam internis quam externis frustra tentatis, *Chirurgiae* auxilium quaerendum est.

facta et repetitis saepe laxativis sub usu horum remediorum externorum sanata fuit. ⁵⁶⁵⁾ l. c. p. 726. ⁵⁶⁶⁾ *Th. Lobb* Anleitung zur ausübenden Arzneik. a. d. Engl. Leipzig 1772. p. 557. ⁵⁶⁷⁾ *Assalini* l. c. p. 56. — *J. R. Deimann* von den guten Wirkungen der Electricität in verschiedenen Krankheiten a. dem Holl. v. *Kühn*, Ir Th. Kopenhagen 1793. p. 292.

CAPUT IV.

de strumae cura chirurgica.

In ipsa desperatione extrema remedia tentanda.

(SENECA, Ep. 29.)

§. 55.

non possum mihi temperare, quin sectionibus praecessis tertiam eamque ultimam tandem adjungam, non equidem consilio, ut opusculum meum quodammodo luminosum reddam, idque paginis quasi impleam, potius, ut occasione peropportuna pro viribus illis omnino satisfaciam.

Verum enim vero totus ille medicamentorum tam externorum quam internorum apparatus, quantus quisque sit, quum aliquoties quidem, sed certo non semper tumorem glandulae thyreoideae induratum et inveteratum resolvere possit, in casu tamen pertinacissimo, quando pessimum se habet aegrotus ob respiracionem et deglutitionem impeditam, mortem suffocantem imminuentem, ubi omnia primum auxilia frustra tentata fuerint, quae nobis ars medica suppeditat, unum refugium, Chirurgi manus est imploranda, ut tumor auferatur.

Jam vero curatio strumae chirurgica multiplici in-

stitui potest modo. Primo *remediis mechanicis vel derivantibus, strumam minuendo. Secundo inflammatione indeque subsecuta suppuratione, strumam consumendo. Tercio illam omnino funditus exstirpando.*

Maximis vero incommodis, imo periculo remedium chirurgicorum applicatio conjuncta esse solet. Inflammatio enim nova saepius tam vehemens est, ut ad laryngem perducatur, aegerque semper in periculo mortis suffocatoriae et apoplecticae versetur. Caeterum profluvium sanguinis ex vasis strumae discissis ortum propter copiam tam arteriarum quam venarum perquam frequentem et propter spatium paullo angustius, intra quod sanguinis fluxus evenit, difficili tantummodo arte sisti eoque aegri vita in discrimen summum committi potest, nisi vel deligatio vel compressio vasorum tuta ac cauta manu statim tentatur. Quare necessarium erit, ut aegrotum ante operationem de gravi periculo instruamus. Auxilium vero chirurgicum facillimum tutissimumque esse videtur, donec struma sit recens, mobilis et parva, nec aegrotus aetate admodum proventus, struma enim inveterata, immobilis et permagna raro sanatur, talique casu, si strumae pondere et magnitudine aegri vita non periclitatur, manum remove re consultius est, quam medelam, artem chirurgicam in ejus detrimentum adhibere. Homines enim ea affecti saepius maximam aetatem sine ullo attingunt incommodo.

Curatio vero chirurgica, de qua supra mentionem feci, variis instituitur modis, quos secundum ordinem, et primo quidem minus periculosos, dein graviores et periculosiores exponere conabor.

§. 56.

1) Hunc in finem ex Chirurgia multa quidem commendantur remedia, quae tamen non omnia semper

satis luta et quandoque etiam non aequae sunt necessaria. Sic *venae sectionem* plurimi omittunt, quia ab ejus usu sibi parum pollicentur, et *Barbette* cam plane dissuadet, forte quia vires aegrorum mediante eadem citra rationem imminuuntur. Ubi tamen sanguis abundat, vasa tument, et aetas ac vires consentiunt, atque inprimis evacuationes sanguinis consuetae per haemorrhoides vel menses in sexu sequiori sunt obstructae vel imminutae et causarum numerum augent, ibi omnino quandoque, postquam primae viae a saburra liberatae sunt, venae sectionem concedendam esse arbitramur. Circulum enim sanguinis promovet interdum, inprimis si sanguinis copia vasa gravat, atque humorum reliquorum motum emendat, modo non in nimis larga quantitate extrahatur, et non promiscue in omnibus celebretur. Sic etiam, quoties periculum minatur, sanguinis detractionem per incisionem venae super struma salubriter instituendam esse censeo. Innuitur haecce agendi ratio, quasi tecte et obscure, in lib. 7. *Columellae* de morbo suum cap. 10. p. 272. qui ita scriptum reliquit: „suibus strumosis sub lingua sanguis mittendus est.“

§. 57.

2) *Frictiones tumoris* cum pannis lana confectis egregiae sunt, inprimis si panni vaporibus rerum aromaticarum imbuti vel camphora sunt illiniti. Nonnulla observatu digna de hacce medendi ratione habent *Baptista Porta*⁵⁶⁸), *G. van Swie-*

568) *Magia naturalis*, Antwerpiae 1654.: er erzählt, dass man kleinere Kröpfe durch besondere Thiere, die allerhartnäckigsten aber (quod Chirurgum fatigavit multum, pharmaco curari non valuit nec ulla profuit medicina) blos durch lang fortgesetzte Einreibungen heilen könne; siehe auch *Kluge's* Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilmittel, Berlin 1811. *Museland's* und *Himly's* Bibliothek der pr. Heil-

ten ⁵⁶⁹), *Girard* ⁵⁷⁰), *Prosser* ⁵⁷¹), *Bell* ⁵⁷²), *Lett-
som* ⁵⁷³), *Newnham* ⁵⁷⁴), quos consulere non pigeat.

Compressione tumoris ab initio leviori, sensim insensimque fortiori *Salmon* ⁵⁷⁵) et *Heister* ⁵⁷⁶) strumam recentem minuerunt, quinimo sustulerunt. Caveat autem aegrotus omnes nisus vehementes colli asperaeque arteriae. Ad hanc impressionem in strumam faciendam fasciis vinculi peculiaris subsidio firmatis vel collari metallico utimur, quem ad finem autem antiquiores chirurgi collare quoddam plumbeum vel laminam plumbeam mercurio vivo linitam laudarunt, quae vero omnia ad impediendum incrementum amplitudineinque, raro autem ad curam radicalem valent; caeterum eorum usu respiratio et circulatio sanguinis impeditur, deglutitioque fit difficilior. Quapropter ad omne vitae periculum removendum nuperrime *Foderé* ⁵⁷⁷) laminam elasticam ex chalybe factam et *Heintze* ⁵⁷⁸) compressorium bracherio simile excogi-

kunde, 10tes Stück. Octobr. p. 174. Berlin 1811. 569) Comm. in *Boerhavi* aphorismos Tom. I. pag. 199. Tom. IV. p. 146. 570) *Loupiologie* p. 421. 571) l. c. p. 47. 572) *A system of Surgery*. Edinburgh 1787. Siehe *Richter's* chir. Bibl. 10ter Bd. 1stes St. p. 132. „Der Kropf weicht zuweilen, vorzüglich, wenn er noch klein ist, dem öftern Reiben.“ 573) l. c. 574) *The London medical Repository* etc. by *G. M. Burrows* and *A. T. Thomson* Vol. V. 1816. March., April. S. Medic.-chir. Zeitung fortgesetzt v. *Ehrhardt*. 2ter Bd. 1817. Salzburg. No. 28. 7ter April 1817. *W. Newnham* heilte 2 Kröpfe durch das drei Mal täglich wiederholte und jedesmal eine halbe Stunde fortgesetzte Reiben mit der Hand. 575) l. c. p. 639. 576) *Instit. chir.* Amstelod. 1739. P. II. p. 726. 577) l. c. p. 66. 578) *Archiv der pr. Heilkunde für Schlesien und Südpreussen* von *Zadig* und *Friese* IIIten Bds. 4tes Stück. p. 370—373. cum delineatione. Noch zu vergleichen *Girard* l. c. und *James Holbrock* in *The London Medical Repository* etc. edited by *G. M. Burrows* etc. Vol. VIII. Nro. 46. Siehe *Medic. chir. Zeitung*, Salzburg 1819. 2ter Bd. No. 37. 10ter May. Dem Verfasser gelang es zu mehreren Malen, dieses Uebel durch Druck zu ver-

tabant, quod carotidi in struma nimis pulsanti ita prospere applicabat, ut larynx et oesophagus nullo modo comprimerentur.

§. 58.

5) Revellendi et derivandi causa in strumis viro quodam morbo exortis, e. g. suppresso exanthemate, tam *vesicatoria*, quam *ulcera artificialia* imprimisque *fonticuli* tentari licent; quod vero auxilium, donec struma sit recens et parva, mature ferendum. *Prosser*⁵⁷⁹⁾ et *Bell*⁵⁸⁰⁾ ex repetito vesicantium usu et *Jeitteles*⁵⁸¹⁾ aliique⁵⁸²⁾ ex fonticuli applicatione praestantissimum habuerunt effectum, sanatis vero ulceribus interdum tumor redux volumine eo magis augebatur. Quin ipsa rubefacientia, quae poros dilatant, huc spectare videntur. Sic novit *Wedellius* amoenit. m. m. p. 93. Empiricum quendam, qui strumam et similes tumores praevia masticatione quasi sive morsicatione curat, inungendo butyrum cum acetosa fixum, quod nihil aliud quam rubefaciens. Vid. *Ephem. Germ.* ao. I. Dec. II. observ. 11. Eundem Empiricum vidit *Crausius*⁵⁸³⁾ curare strumam in studioso quodam, suo inquilino, sola morsicatione aliquantulum continuata; strumae nempe lacinia prius imponebatur, factaque per hanc morsicationem seu dentibus comminutione unguentum inungebatur; struma haec post morsicationem plane mollis facta, et quotidie digitis fortiter jussu Empirici compressa seu quasi contrita intra 8. dies plane disparebat.

mindern und auch zuweilen zu heilen. 579) l. c. p. 40. 580) l. c. p. 144. Confirmat etiam usum vesicantium, tanquam efficacissimum, *Denly* in diss. inaug. med. de vesicantium usu in variis morbis tractandis. Lugd. Batav. 1784. 581) In observat. quibusd. medicis. Prag. 1783. 8. 582) *Girard* l. c. 583) Vid. Diss. cit. *Meinsii* pag. 21.

§. 59.

4) Ad strumae inflammationem et suppurationem adsequendam *caustica* tam *firmioris* quam *fluidioris naturae* adhibita reperiuntur; hic vero cavendum, ne partes vicinae a corrosivis laedantur vel inflammantur, unde muniendae sunt unguento aliquo, imo toti corpori est prospiciendum, et aeger eo tempore ut febricitans tractandus. ⁵⁸⁴⁾ Attamen maximo periculo illorum applicatio conjuncta esse solet, quamquam negari non potest, ea praestantissimum saepe effectum ostendisse. *Celsus* ⁵⁸⁵⁾ quidem fere primus medicamenta jam adurentia ad strumam amovendam proponit, nec non *Forestus* ⁵⁸⁶⁾, *Heister* ⁵⁸⁷⁾, *Sellie* ⁵⁸⁸⁾, *Mesny* ⁵⁸⁹⁾, ill. *Langenbeckius* ⁵⁹⁰⁾ et clariss. *Erdmann* ⁵⁹¹⁾ optimo adhibuerunt successu; sic ipse *Ti-*

584) *Sennertus* in prax. med. lib. 2. p. 1. cap. XXV. 585) lib. VIII. cap. 13. 586) observ. chir. lib. 3. observ. 10. 587) Diss. inaug. med. et chir. de tumoribus cysticis singularibus Praeside *L. Heistero*, Rp. *B. A. Friese*. Helmstadii 1744. 4. c. tab. aen. (recus. in de *Halleri* coll. disp. chir. select. Tom. V. Nro. 151. Tumor caustico lapide eroditur ita incidebatur, ut ex eo liquor ex atro fuscus sanguine corrupto aut coffeae crassiori fere similis trium circiter librarum copia efflueret.) 588) *Rich-ter's* chir. Bibl. 5ter Bd. p. 243. Auszug aus den vermischten chir. Schriften von *Joh. Leber*. *Schmucker*. 2ter Bd. Berlin 1779. 589) In Journal de Médecine Tom. XXIV. p. 75. 590) Bibl. für Chir. Bd. IV. St. 1. p. 146. „Wenn man nach *Langenbeck* Entzündung und Eiterung erregen will, was man durch ein Aezmittel am besten bewirkt, so muss dies nur nicht mehr geschehen, wenn schon eine sehr beschwerliche Respiration vorhanden ist, weil man dann immer eine starke Entzündung befürchten muss, die Gefahr bringt. Auch widerräth *Langenbeck* die allgemeinen Bedeckungen zu trennen und auf die entblösste Stelle das Aezmittel zu legen, sondern er empfiehlt dagegen durch den Lapis causticus ein Geschwür zu machen, und dasselbe so lange zu vergrössern und zu unterhalten, bis dass sich die Geschwulst verkleinert hat, was ihm einige Male bei grossen Kröpfen gelungen ist.“ 591) In der Zeitschrift für

maeus a Gülden-Klee ⁵⁹²⁾ hanc operationem in propria filiola strumam in collo gestante instituit, applicando tantillum lapidis corrosivi, malo deinde instar ulceris tractato. Et tali modo liberavit filiam feliciter a tumore hocce molestissimo absque notabili dolore intra paucos dies. *Mayerus* in diss. jam cit. pag. 21. scribit haec. „Testibus incolis Buckovinae ulcera artificialia, ut sunt fonticuli, setacea, caustica, proxime ad strumam mirum quantum prosunt; obsistunt enim, ne struma majora in dies capiat incrementa.“ Spectant ea ad inflammationem movendam: inflammatio vero saepè tam vehemens est, ut ad laryngem, tracheam, quinimo pulmones perducatur, sicque graviolem periculosioremque efficiat morbum suffocatorium ⁵⁹³⁾, aegerve ex suppuratione inde pessima succumbat ⁵⁹⁴⁾. Sic *J. Barth. de Siebold* in homine satis robusto sanoque strumae, quantum fieri potuit, integumentis communibus nudatae vasisque undique subligatis causticum applicabat; at eventus minime respondebat expectationi: inflammatio enim subsecuta postquam tracheam, bronchos pulmonesque arripuerat, respiratio sese ostendit valde anxiosa difficilisque et ex tumore glandulae thyreoideae aperto pessimum manabat pus, aeger-

Natur- und Heilkunde, herausgegeben von den Professoren der chir. med. Academie in Dresden im 1sten Bande, 5tes Heft. Dresden 1820. befindet sich vom Dr. *Frdmann* p. 404. ein Aufsatz über Ausrottung der Balggeschwülste und anderer Deformitäten durch Aezmittel, wo er pag. 417. sagt: „Zweimal habe ich das Aezmittel bei vergrösserter glandula thyreoidea mit langsamem aber doch glücklichem Erfolge gewagt. Diese Kröpfe hatten ungefähr den Umfang eines mässigen Borsdorfer Apfels, und sassen auf dem Kehlkopfe.“ 592) *Casus medicinales etc.* Lipsiae 1662. Lib. VI. Cas. 22. 593) *Assalini* l. c. pag. 55. Cfr. Samml. auserl. Abh. zum Gebrauch pr. Aerzte, Bd. XV. p. 144. 594) *C. Solingen* Handgriffe der Wundarzneik. Wittenb. 1712. p. 162. *Girard* l. c. p. 454.

que die vigesimo quinto post operationem sub deliriis animam efflavit. Sectione dein facta inflammationem tracheam, ubi struma cum cartilagine cricoidea arcte conjuncta erat, pleuram pulmonesque, quorum dexter cum pleura concretus erat, occupasse patuit, et cavum thoracis materia purulenta, pericardiumque aqua erant repleta. —

§. 60.

5) Ad destruendos glandularum colli tumores imprimisque strumam chirurgorum complures, praecipue veterum⁵⁹⁵⁾ *ustionis methodum* elegerunt. Quae vero strumam dissolvendi methodus indirecte vel directe inflammatione inde exorta perficitur. Quod quidem remedium licet a veteribus probatum non omni tamen periculo destitutum esse censeo, ejusque applicatio in illo solum casu, si ex male suppurante struma excrementiae fungosae et haemorrhagiae lethales, quae ligaturam non admittunt, subsequantur, tentari oportet. Ad quem finem subsequendum ferro in apice subrotundo utimur.

§. 61.

6) *Incisionibus* saepe vel *scarificationibus* strumas sanari posse, non desunt exempla.⁵⁹⁶⁾ Sic *Muralto* strumam curavit incisione facta in parte molli et declivi profundius instituta, foramen vulneris

595) *N. II. Severini* de efficaci medicina Lib. III. 596) *Assalini* l. c. pag. 144. strumam coquae in certamine veru vulneratam inflammatione suppurationeque subsecuta sanata esse, memorat. — *Schmidt Müllerus* l. c. pag. 37 — 40. hoc narrat exemplum: „Tyroliniensis furore captus cultellum in strumam immisit, quo ictu haemorrhagia larga cum succo albescente sequebatur, profluvio vero sedato tota disparuit struma.“ Caeterum vid. §. 27. nostr. opusc.

spongia praeparata implevit et diapalma deligavit, et sic aegram perfecte ab hac struma liberavit, prout videre est⁵⁹⁷⁾ in *Decur. Ephem. Germ. Ann. 3. Obs. 134.* Liceat adhuc observationem aliquam in instituto clinico Jenensi ab Ill. *Lodero* institutam huicce capiti adjungere: „*Dorothea Maria Dretschel* ex pago Loebstaedt, LV annos nata, strumosa, caeterum sana, quum anno 1789 febre catarrhali in hoc pago tunc temporis epidemice grassante laborasset, medicosque negligens, morbum viribus naturae committeret, materia febris subito ad strumam se praecipitare visa est. Tumor enim antea mobilis in duas partes totum collum occupantes partitus, nunc durus factus est, inflammatus, ad partem colli sinistram magis extensus et ita inflatus, ut nec deglutire nec libere respirare posset aegrotata. In consilium vocatus *Köhler, Cel. Loderi* t.t. amanuensis, cataplasmata emol-

597) Conferri etiam meretur *Guil. Paradin* in *Chronique de Savoie*, Lyon 1561. p. 21, qui commemorat, barbae tonsorem incisione in strumam uxoris suae facta ingentem tumorem sine ullo detrimento extraxisse, et nuperrime *P. E. J. Lemaire*, Chirurgus *Cameraci* peritissimus, cujus observatio in germanicum sermonem versa legitur in „Allgemeine medicinische Annalen des Jahres 1821, 9tes Heft Septbr. p. 1258.“ „Beobachtung eines fibrig-serösen, durch den Einschnitt geheilten Kropfes von *Lemaire*, Chirurgen zu *Cambray*.“ Eine Frau war mit einem Kropfe behaftet, der bei zunehmender Grösse sie zu ersticken drohete: mehrere Symptome deuteten darauf hin, dass die Geschwulst nicht in einfacher Vergrösserung der Schilddrüse bestand; durch die unternommene Operation wurde eine Sackgeschwulst geöffnet, deren Wände 1 Zoll dick waren, und in ihrer fächerigen Höhlung eine azurfarbene schwärzliche Feuchtigkeit enthielten; durch die unterhaltene Eyterung wurde der ganze Sack in der Folge entfernt, und eine völlige Heilung erzweckt. cfr. *Nouveau journal de médecine, chirurgie, pharmacie etc. Rédigé par M. M. Beclard, Chomel etc. Tom. X. Janv. — Avril. 1821. à Paris.*

lientia applicavit. Quum vero tumorem in dies fere crescere mortemque suffocatoriam imminere videret, incisionem fecit, quamvis non distincte percipere posset fluctuationem. Incisione usque ad duos fere pollices cum dimidio penetrante peracta, sat larga puris quantitas cum levamine effluxit. Noluit aegrota concedere, ut integra struma per suppurationem promotam destrueretur: quare suadente Ill. *Lodero* setaceum adhibitum est, cuius usu tandem struma deleta, et foemina ad sanitatem perducta est.“ — *Foderé*⁵⁹⁸⁾ subligatis arteriis incisioneque facta materiam strumae fluidam evacuare telamque adhuc remanentem remediis resolventibus vel irritantibus delere et *Heisterus* l. c. in uno tantummodo tumoris loco, priusquam incisio foret, causticum applicare suadent. Nihilo tamen secius gravissima quin imo lethalis⁵⁹⁹⁾ haemorrhagia, praesertim in struma aneurismatica, erit timenda.

§. 62.

7) Melius videtur tumoris consumptionem *setacei ope* periclitari.⁶⁰⁰⁾ Chirurgorum sunt complures tam *veterum*⁶⁰¹⁾ quam *recentiorum*⁶⁰²⁾, qui hocce

598) l. c. par. 75. 599) Collezione d'Osservazioni e Riflessioni di Chirurgia di *G. Flajani* Tomo III. 1802. 8. Observ. 67. et 68.

600) Strumam omnino exulcerari posse docent *Sellie* in *Schmucker's* vermischten chir. Schr. Bd. II. Observ. 23. — *Henning* in *Hufelands* Journal der practischen Arzneik. Bd.

VIII. 4tes St. p. 52. et *B. de Siebold* in *Loder's* Journal für Chirurgie. Bd. III. p. 390. Caveat autem Chirurgus, ne pus

viam in laryngem et tracheam sibi paret, aegerque morte succumbat suffocatoria, sicuti *Baillie* in additamentis ad praeclarum opus suum: morbid anatomy, cf. Sammlung auserlesener

Abhandl. für prakt. Aerzte, Bd. XX. p. 362, observavit.

601) *Heister* in diss. med. chir. de tumoribus cist. singul. l. c. Astruc. l. c. p. 197. — Précis de Chirurgie pratique par *M. P.* ** *M.* à Paris 1768 p. 571. — *Girard* l. c. strumas a plu-

ribus academiae chirurgicae Parisiensis sociis setacei ope feliciter sanatas esse affirmat. 602) Britannum setacei ope strumam

medium commendent, saepeque optimo adhibuerunt
 cessu. Sic *B. de Siebold* in nosocomio Juliaeo com-
 munes setaceo ad strumas diminuendas maximo cum
 effectu usus est. Maxime autem in hujusce remedii
 applicatione situs vasorum, ne carotides et arteriae
 thyreoideae laedantur, respiciendus, quare *Foderé*
 longitudinem strumae superne deorsum, et *Klein*
 partem tumoris magis inferiorem setaceum appli-
 cate suadent, pro ambitus vero ratione vel unum vel
 per medium tumorem vel decussatim (*Astruccio*
Attore) traducuntur.

Heisterus excogitavit laminam, eamque argen-
 tum sive plumbeam sulcis variis instructam, ne scalpel-

feliciter sanasse narrat *Assalini* l. c. p. 144. — *Foderé* l. c.
 par. 75—77. — *Flajani* l. c. osservazione 67—68. — *Chr.*
Klein in *B. v. Siebold's* Sammlung seltener und auserl. chirurgi-
 scher Abhandl. III. Bd. pag. 11 et sq. Von 7 Versuchen gelan-
 gen 6 ganz; der 7te traf ein äusserst scöfulöses Mädchen, bei
 welcher, als man in der fünften Woche noch gar keine Abnah-
 me fand, das Haarseil viel zu früh ausgezogen wurde: siehe auch
medic. chir. Zeitung von *Hartenkeil* 4ten Bd. 1802. Salzburg.
 p. 131. — *Nuovi Commentari di Medicina e di Chirurgia* pubbli-
 cati dai Signori *Valeriano Luigi Brera*, *Cesare Ruggieri*,
Floriano Caldani, A. 1818. Semestre seconde: s. med. chir. Z. von
Ehrhardt, 4ter Bd. No. 98. 9ter Decbr. 1819. Salzburg. *J. B.*
Quadri in Neapel schlägt (S. 109) zur Heilung des Kropfes
 folgendes Verfahren vor: „er zieht einen Faden durch densel-
 ben, wodurch er theils Entzündung und Eiterung, theils ver-
 mehrte Thätigkeit der Lymphgefässe zu erregen sucht; er un-
 tersützt seinen Vorschlag durch 7 glückliche Versuche“; cfr. *Jour-*
nal der Chirurgie und Augenheilkunde von *C. F. Gräfe* und *Ph.*
Walther, Berlin 1821. 2ter Bd. 2tes Heft. pag. 381—384.
Neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie von
C. J. M. Langenbeck, 3ter Bd. 2tes Stück. Hannover 1821. p.
 176—83. *Joh. Nepom. Rust*. Magazin für die gesammte Heil-
 kunde. 7ten Bandes 2tes Heft. Berlin 1820. „Verunglückter
 Versuch, eine Kropfgeschwulst durch Unterbindung der art. thy-
 roidea sup. sin. zu heilen, mitgetheilt vom Dr. *Hoering*.“

lum a via aberret, quod quidem superfluum mihi esse videtur, cum tutius manu liberiori ac tutiori utamur. Ad hunc finem fasciam tenuem, vel fila complura olei vel decocto emollienti vel unguentis suppurantibus illimita, quorum vis irritans ad libitum vel augeri vel diminui potest, adhibuit. Oritur nonnunquam haemorrhagia ex vena jugulari externa (*Klein*), quae vero brevi tempore sisti potest, saepiusque fieri solet, ut cum sanguine succus glandulae inhaerens effluat. Inflammationis symptomata post operationem oriunda vel emplastra vel fomentationes emollientes adhibendo diminuere studendum, donec suppuratio subsequatur, ad quod pus evacuandum nonnunquam incisiones requiruntur; quo facto saepe struma exulcerata sese diminueretumorque sensim sensimque evanescere incipit. Setaceum tunc extrahere ulcusque consanare oportet. Operatione instrumento satis acuto peracta, fasciisque convenienter semper applicatis cicatrices vix animadvertuntur remanentes.

§. 63.

8) *Paracentesis* strumae locum habet, ubi materia tumorem efficiens liquida est, vel aquosa, vel lymphatica, vel purulenta, vel fluctuatio perspicua sentitur. Natura saepe ipsa hanc materiae solutionem perficit, ita ut nil amplius ad sanationem opus sit, quam integumentorum percussio. Ubi vero materia nimis spissa est, ut evacuari nequeat, remediis emollientibus imprimis cataplasmatibus frictionibusque resolventibus etc. resolutio periclitanda est. Notandum autem aperturam non prius faciendam esse, quam durities omnis sit sublata atque fluctuatio perspicua; quod quidem plerumque diuturnum ac serium illorum remediorum emollientium usum postulat. Quo facto percussio tumoris facienda paracenterio (*Troicar*), et evacuanda materia puriformis. Operatione peracta durities adhuc

ans continuato emollientium usu sensim solvenda
usque propullulans strumae tumor repetita paracen-
vel incisione dilatata evacuandus, tandemque ul-
fasciis leniter tantummodo comprimentibus, ne
s puris impediatur, vel fistulae formentur, sa-
lum.⁶⁰³)

§. 64.

(Quodsi periculosa symptomata, quae tumor mina-
remediis palliatis, venae sectionibus localibus ac
remediis derivantibus non possunt removeri, si suffo-
imminet, *Bronchotomiam* instituendam, nun-
autem ligaturam vel extirpationem suscipiendam
Sharpus est primus inventor atque auctor⁶⁰⁴).

§. 65.

no) *Ph. Fr. Nobilis a Waltherus*⁶⁰⁵), vir ingenii
li et sine dubio inter primos hujus aetatis chirurgos
tendus, recentissime novam proposuit methodum
rumam sanandam, nempe ut *per ligaturam*
periarum glandulae thyreoideae supe-
rum peragatur curatio: haecce vero medendi
nonnisi ad sanationem strumae aneurismaticae,
glandula thyreoidea magna vasorum copia abundat,
e sanguine largius irrumpente nimis gravatur, exin-
alde tumet ac pulsationis speciem prae se fert, per-
ee videtur. Aeger tunc semper in metu versatur,

) Diction. rais. des sc. etc. Tom. VII. p. 730. — *M. Medalon*
rix de l'acad. de Chir. Tom. I. p. 27. — *Chopart et Desault*
c. p. 249. — *Petit*. l. c. Tom. I. p. 208. — *M. P.* ** *M.*
récis etc. pag. 571. — *Ephem. Nat. Cur.* Dec. II. Ann. III.
270. et Cent. I. 1712. Observ. 17. — 604) *S. Sharp*,
eatise on the operations of surgery; Lond. 1751. pag. 188.
605) *Ph. Fr. v. Walther* Neue Heilart des Kropfes durch die
nterbindung der obern Schilddrüsen-Schlagadern etc. Sulz-
ich 1817. pag. 19 — 39.

ne arteria rumpatur, et ipse ex haemorrhagia succumbat; tali in casu manus chirurgica commode applicari valet, dum deligatio arteriae tentari potest. Nam impedito sanguinis affluxu per ligaturam superiorum arteriarum augmentum quidem strumae cohiberi ultra concedi potest; merito vero dubitandum, an etiam struma sensim imminuendo plane sit cessatura. Itaque operatio haec non videtur meliora spondere, quam quae supra in medium adductis remediis chirurgicis minore adhuc periculo effici possunt; insuper haec ligatura semper mature institui debet, antequam struma ipsa sua mole nimis periculosa evadat et spatium inveniendi thyreoidea superiori ad ligaturam applicandam paulo sit angustius. Nec etiam silentio praetercundae sunt omnes illae sequelae sinistrae, quas tale exstirpatione glandulae thyreoideae facta pertimescere oportet: glandulam enim istam a natura legis parsimoniae semper observantissima non abs re tot tantisque arteriis ditatam fuisse, haud sine gravi ratione praesumimus. Porro secretiones in hac glandula per strumam non aboleri, videtur mihi ea de causa certum atque exploratum, quia in examinatis glandulis struma affectis post mortem nunquam vasa lymphatica obstructa aut corrupta, sed tantum magis dilatata plerumqueprehenduntur; haec etiam causa esse videtur cur homines struma affecti, dummodo ista in mole non excedat, ad seram et provectam usque aetatem saltem bene valere possint. Quia vero per substantiae corruptionem in glandula thyreoidea tumente struma aneurysmatica exoriri potest, a *Walthero* monitus indicat, carptim libet, qua ratione per ligaturam arteriarum thyreoidearum superiorum miseris alias certo certius interituris adhuc opem ferre possimus. Caeterum *Ch. Gottl. Lange* primus est, qui de hacce agendi ratione cogitaverit; dicit enim in diss. jam citata pag. 16 — „magis vero efficax esset sectio vel ligatura arteria

ad strumosos tumores sanguinem defert, modo illud prompte inveniri possit. *Veterinarii* qui in hoc modo procedere dicuntur, et arteriam, quae tumores strumosos equorum defertur, abscindendo trahere, ut strumae evanescant; in homine tamen haec ratio non sine periculo instituitur.“ Quem virum laudatus est *Jones*⁶⁰⁶⁾ Britannus, qui sententiam suam addidit his verbis: „Kann dieses Verfahren, die Circulation des Blutes durch die *Arterien* zu hemmen, auch mit Vorthail in Fällen der *Bronchocele* anzuwenden werden?“ Der deutsche Uebersetzer, Hr. *Spangenberg*, fügt die Bemerkung bei: „diese Operation, welche besonders bei dem *aneurysmatischen* Kropfe passend seyn würde, verdiente, wenn es möglich sey, sie ins Werk zu richten, die Aufmerksamkeit der Wundärzte, und der Verfasser für diesen Fingerzeig den grössten Dank.“ Jam vero quod ad numerum Operationum sive felici sive infelici exitu tam in Germania quam in Anglia susceptarum spectat, praevalent luctus, proh dolor! fata sinistra; nam illustris de *Waltherus*⁶⁰⁷⁾, *Henry Coates Esq.*⁶⁰⁸⁾ et *Wedemeyer*

606) Abhandlung über den Prozess, den die Natur einschlägt, Blutungen aus zerschnittenen und angestochenen Arterien zu stillen. — Aus dem Englischen übersetzt von *G. Spangenberg*, Hannover 1813. 607) Herr v. *Walther* unterband bei einem Kropfe beide *Arterias thy. sup.*, jedoch zu zwei verschiedenen Zeiten; der Kropf schrumpfte zusammen, und der Kranke wurde geheilt entlassen. 608) *Med. chir. Zeitung*, herausgegeben von *Ehrhardt*, 1820. Salzburg. 4ter Bd. p. 249. ubi adnotata sunt sequentiae „Geschichte einer *Bronchocele*, bei welcher die *arteria thyreoides superior sinistra* mit Erfolg unterbunden wurde von *Henry Coates Esq.* Mitgetheilt von *Astley Cooper*: Die Kranke war ein gesundes starkes 17jähriges Mädchen, deren *glandula thyreoides* so angeschwollen war, dass sie die *Trachea* stark drückte, und das Athemholen und Schlucken sehr erschwerte; die obern Schilddrüsen - Arterien klopf-

rus ⁶⁰⁹⁾ ligaturam arteriae thyr. sup. felici successu applicaverunt: *William Blizard* ⁶¹⁰⁾ vero, *Grae-*

ten auf das heftigste, die linke derselben wurde bloßgelegt, mit einer gekrümmten Sonde von den sie begleitenden Nerven getrennt, und durch eine mässig angezogene dünne runde Ligatur unterbunden. Am folgenden Tage hatte die Operirte Fieber und Kopfschmerz, der Nacken war etwas geschwollen, und das Schlucken mehr erschwert. Ein Aderlass hob dieses. Am 9ten Tage trennte sich die Ligatur, und am 10ten war die Wunde ganz geheilt. Die Geschwulst war um die Hälfte kleiner geworden, und das Athemholen viel leichter. Sie wurde entlassen, und da sie sich nicht wieder sehen liess, so ist diese Besserung auch wahrscheinlich von Dauer gewesen.“ — Cfr. etiam „Neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie C. J. M. Langenbeck, Hannover 1821. 3ten Bds. 2tes St. pag. 184 — 85.

609) Hr. Dr. *Wedemeyer* zu Hannover unterband bei einem ungeheuer grossen und alten Kropf, dessen Gewicht er etwa auf 10 Pfund taxirt, die rechte *art. thyr. sup.*; die Abnahme an Umfang war wirklich sehr beträchtlich: vid. Neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie von C. M. Langenbeck, 3ten Bd. 2tes St. Hannover 1821. p. 185 — 95. Zugleich macht der Hr. Verf. dieses so lehrreichen Aufsatzes die richtige Bemerkung, dass es ihm sehr auffallend gewesen sey, bei den vorigen Kröpfen, welche er zu untersuchen Gelegenheit hatte, die *Arterias thyr. superiores* verhältnissmässig mehr als die *inferiores* erweitert zu finden. Sollte dies Verhältniss allgemeiner anzunehmen seyn? Sollte der Grund hiervon darin liegen, dass die unteren Schilddrüsen-Arterien nicht aus der *Carotis*, sondern aus der *Subclavia* entspringen, hinter der *Carotis* und hinter der Schilddrüse verlaufen, und vielleicht in ihrem Verlaufe, zumal bei der Vergrösserung der letztern, einen gewissen Grad von Compression erleiden? —

610) Med. chir. Zeitung, fortgesetzt vom Dr. *Ehrhardt*, Salzburg 1817. 4ter Bd. pag. 202. No. 91. „In dem jüngst erschienenen Werke von *Hodgson* über die Krankheiten der Arterien und Venen, übersetzt vom Dr. *Koberwein* liest man S. 59, dass *William Blizard* bei einem Kropfe ein Band um die *Art. thyr. sup.* anlegte. *Hodgson's* Vorrede ist vom Decbr. 1814 datirt, und v. *Walther* operirte im Juni desselben, Jah-

⁶¹¹), *Zangius et Fritze*⁶¹²), viri consilio etiam ac

res. Es geschah also auch hier, was schon öfterer geschehen ist, dass zwei geniale Männer zu gleicher Zeit einen und denselben Gedanken hatten. Vide etiam *Samuel Cooper's* neuestes Handbuch der Chirurgie in alphabetischer Ordnung. Nach der dritten englischen Originalausgabe übersetzt, durchgesehen, und mit einer Vorrede versehen vom Dr. *L. F. v. Froberg*, 1ste Lieferung, Bogen A—Aa. Weimar 1819. pag. 501. Legitur ibi: „Diese Operation ist in der That von *Sir William Blizard* gemacht worden, der beide Arterien einer angeschwollenen *glandula thyreoidea* auf einmal unterband, wodurch die Geschwulst nach einer Woche zu einem Drittheil ihres Umfanges vermindert wurde. Nach dem Abfallen der Ligaturen erfolgte eine wiederholte Blutung der Arterien, und durch die Verbreitung des Hospitalbrandes wurde die Carotis selbst entblösst. Der Patient starb; dennoch behauptet Hr. *A. Burns*, dass dies von einer Wiederholung dieses Versuches nicht abhalten dürfe, indem derselbe Umstand bei der blossen Oeffnung einer Vene hätte vorkommen können, und in der Hospitalluft wirklich vorgekommen sey: vide *Surgical Anatomy of the Head and Neck* p. 202. Eadem quoque *Cooperi* est sententia; cfr. praeterea „*Neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie*, von *J. C. M. Langenbeck*, Hannover 1821. 3ten Bds. 2tes St. p. 186.

1) Contigit mihi, ut operationi ipse adessem, qua *Graefius*, Patronus ac praeceptor meus aeternum devenerandus, ligaturam arteriae thyreoideae super. *dextrae* in puella satis robusta manaque applicavit; sed eventus minime respondebat expectationi, et struma ista aneurismatica paullo post scalpello radicalitus est extirpata: nihilominus reconvalebat aegrotata et ex integro sanata est; vide plura inferius.

2) *Joh. Nepom. Rust*. Magazin für die gesammte Heilkunde, 7ten Bds, zweites Heft, Berlin 1820: „Verunglückter Versuch vom Rath und Professor *Zang*, eine Kropfgeschwulst durch Unterbindung einer *art. thy. sup.* zu heilen, mitgetheilt vom Dr. *Hoering*: Diebus proximis post operationem inflammatio est subsecuta vehementissima, quae partes vicinas, tracheam, bronchos pulmonesque arripuit. Respiratio oboriebatur valde impedita, anxia difficilisque, et aegrotus die decimo sub deliriis animam efflavit. Sectione deinde facta, a

ratione agentes magnam commendationem, quam methodus ista habeat ab utilitate, non possunt confirmare. Quamvis igitur omnia rite fiant, tamen

Non est in medico, semper relevetur ut aeger,

Interdum docta plus valet arte malum.

Restat adhuc, ut viam ac rationem, quam illustris de *Waltherus* ad ligaturam art. thy. sup. secure perficiendam proposuit, uberius et accuratius exponam; faciamus eum ipsum loquentem: „Da bei keinem Schriftsteller eine Anweisung zur Unterbindung der obern Schilddrüsen-Arterien zu finden ist, so will ich das hierzu bestimmte *operative* Verfahren kurz beschreiben.

Die Geräthschaften sind ein mit einer Stellfeder versehenes Bisturi von einiger Länge, und von geradliniger, nicht bauchiger Schneide. Solche Bisturies ziehe ich für Hautschnitte und andere Incisionen denen mit gewölbter Schneide vor. Mehrere Pincetten. Eine Nadel zur Unterbindung; wohl auch die Unterbindungsnadel von *Dechamps*; mehrere Unterbindungsfäden und ein plattes Fadenbändchen von 5 bis 4 durch Wachs vereinte Seitenfäden; rohe *Charpie* in gehöriger Menge, *Compressen* und eine *Zirkelbinde*.

Der Kranke sitzt auf einem etwas hohen Stuhle,

gangraena glandulam submaxillarem et ab inflammatione tracheam, pleuram atque pulmones esse occupatos patuit: vide caetera in l. c. — Sic etiam Cl. *Fritze*, Prof. Pragensis, hanc Operationem in struma aneurismatica Dr. *Pechio* auctore, qui Dresdae praxi extensiore est celebris, executus est; at, quod sane dolendum, fatali exitu; nam non diu post operationem factam die scil. quarto ligatura arteriae thy. sup. sponte est delapsa, atque ita ex sanguinis fluxu enormi non sistendo aegroti animam efflavit. — Praeterea etiam haud pigeat perlustrare *Rustii* diarium (Tom. II. 1. S. 140), in quo observatio arteriae thyre. super. laesae et feliciter ligatae legi meretur. —

dem einfallenden Tageslicht gegenüber, der Kopf desselben ist auf die entgegengesetzte Seite von jener, an welcher operirt wird, gedreht, und an die Brust eines hinten stehenden Gehülfen angelehnt. Man macht, um zur *Arterie* zu gelangen, einen Hautschnitt, welcher etwas unter dem Winkel der unteren Kinnlade und ein wenig mehr nach aussen anfängt, und am innern Rande des Kopfnickers, 5 Zoll lang, schief nach unten und innen herabsteigt. Durch einen zweiten Schnitt wird der Haut-Hals-Muskel in einer etwas geringern Länge und in gleicher Richtung getrennt.

Den Hautschnitt mache man bei gleichmässig angespannter Haut, ohne aufgehobene Hautfalte. Bei Incisionen der Haut, bei welchen vieles darauf ankommt, dass der Schnitt in einer genau bestimmten Richtung geführt werde, mache ich diesen nie auf einer Hautfalte, da man, wenn man auf dieser einschneidet, niemals die Stelle, wo der Schnitt gemacht wird, genau bestimmen kann.

Ist die Haut und der Hautmuskel getrennt, so liegt die *Arterie* im gesunden, nicht vergrösserten Zustande. Die der Schilddrüse, noch sehr tief, selbst gegen $1\frac{1}{2}$ Zoll tief. Wer die *Operation* zum ersten mal an der Leiche versucht, wird diese tiefe Lage der *Arterie* sehr bedenklich finden; allein bei dem Kropf wird die obere Schilddrüsen - *Arterie* durch die Drüsengeschwulst selbst in die Höhe gehoben, und aus der Tiefe, in welcher sie liegt, verdrängt, so dass sie sich leichter und zugänglicher darbietet. Nämlich da die *Arterie* nicht am obern Rande der Schilddrüse in diese eintritt, sondern gewöhnlich einen guten Zoll lang auf ihr herabsteigt, und sich ungefähr da, wo sich das obere Drittheil der *glandula thyreoides* mit dem mittlern Drittheile verbindet, nach geschehener Theilung in die Substanz derselben senkt, so wird sie durch die vergrösserte Drüse hervorgedrängt, und sie liegt weit weniger tief als im Normal-Zustande. —

Die Lage der *Arterie* ist folgende: Einen halben Zoll unter ihrem Ursprunge aus der äussern *Carotis*, oder aus dem gemeinschaftlichen Stamme der *Carotiden*, läuft der Zungenbein - Schulterblatt - Muskel über sie hinweg. Dieser Muskel ist bei grossem Kropfe immer in die Höhe geschoben, aus seiner Lage verdrängt und widernatürlich angespannt. Die Spannung dieses Muskels mag wohl auch vieles zu dem gehinderten Schlucken bei den an *Struma* leidenden beitragen. Es ist leichter, die *Arterie* während ihres Verlaufes zwischen diesem Muskel und ihrem Eintritt in die Substanz der Drüse, als zwischen dem Muskel und ihrem Ursprunge zu unterbinden. Würde der *Omohyoideus* ein besonderes Hindernis der Unterbindung in den Weg legen, so könnte man ihn auch ohne Bedenken durchschneiden, und man würde sich auf solche Weise einen sichern Weg zur *Arterie* bahnen. Von den grössern Nervenstämmen am Halse wird durch diese *Operation* keiner gefährdet. Der *sympathische* oder *herumschweifende* und der *zurücklaufende Nerve* liegen zu tief, und hinreichend weit entfernt von der Stelle, wo operirt wird. Nur jener Ast des *Zungenschlundnerven* kömmt hier in Betracht, welcher am äussern Rande der Schilddrüse herabsteigt, sich an ihrem obern Winkel gewöhnlich in zwei Aeste theilt, unter jenem Zweig, welchen die obere Schilddrüsen - Arterie zur untern Fläche des Kopfnickers sendet, hindurchgeht, nach unten mit Zweigen des *plexus cardiacus* anastomosirt, und bis ans Herz läuft. Dieser Nerve liegt der obere Schilddrüsen - Arterie ganz nahe, tangirt die Bogen, welche diese *Arterie* bei ihrem geschlängelten Verlaufe bildet, und kann bei der *Operation* leicht verletzt werden. Man soll ihn daher nach aussen ziehen, und von der *Arterie* entfernen. Vielleicht wird seine Verletzung nicht immer verhütet werden können; ich glaube aber, dass diese, wenn sie

auch statt fände, keine so gefährlichen Folgen nach sich ziehen würde. Das untere Dritttheil des Verlaufes der *Arterie* bedeckt der Brustbein-Zungenbein-Muskel, und der Brustbein-Schildknorpel-Muskel. Diese Muskeln werden, da sie mehr nach innen liegen, und nur den untern Theil der *Arterie* bedecken, nicht beschädiget. Wohl aber kann bei den Schnitten, um zu der *Arterie* zu gelangen, die *Verletzung mehrerer beträchtlichen Venen* kaum verhütet werden. Ungefähr 4 Linien weit von dem Ursprunge der *Arterie* läuft über dieselbe, sich beinahe in einem rechten Winkel mit ihr kreuzend, ein Ast der Schilddrüsen-Venen, wodurch diese mit der vordern Antlitz-Vene communiciren. Dieser wird leicht abgeschnitten werden. Es wird leichter seyn, ihn zu vermeiden, wenn man die *Arterie* zwischen jenem Venenaste und ihrer Theilung, als wenn man sie zwischen ihrem Ursprunge und jenem Venen-Aste unterbindet. —

Die Lage der obern Schilddrüsenerven ist sehr veränderlich. Sie liegen manchmal unmittelbar neben und unter der *Arterie*, in welchem Falle sie bei der *Operation* leicht verletzt werden können; nicht selten laufen sie viel tiefer, gegen 1 Zoll von der *Arterie* entfernt. In jedem Fall ist der Ursprung der obern Schilddrüsen-Arterie aus der *Carotis* höher als jener der entsprechenden *Venen* aus dem gemeinschaftlichen Antlitz-Venenstamme. Diese *Venen* soll man, so viel als immer geschehen kann, schonen, da von ihrer Offenhaltung der ungestörte Rückfluss des *Venenblutes* aus der Drüse abhängt. Wird dieser beschränkt, so darf man keine so bedeutende Abschwellung der Schilddrüse nach der *Operation* erwarten. Noch verdient der Kehlkopfs-Ast der obern Schilddrüsen-Arterie Berücksichtigung. Es ist in jeder Beziehung gut, wenn man diesen offen erhalten, und dem gemäß die Ligatur um die *Arterie* erst an jener Stelle, wo sie

diesen Ast schon abgegeben hat, anlegen kann. Die übrigen, ziemlich unbeständigen Aeste, welche die Schilddrüsen-Arterie an benachbarte Theile abgiebt, können bei der Operation nicht berücksichtigt werden. Sind sie verletzt worden, so müssen sie sogleich unterbunden werden. —

Ueberhaupt ist es gut, wenn man bei dieser und bei ähnlichen Operationen alle blutenden Gefässe, auch die kleinern, sogleich nach geschiederer Durchschneidung unterbindet; nicht sowohl zur Verminderung der Grösse des Blutverlustes, als um die Wunde immer rein vom Blut zu halten, und die in ihr blos liegenden Theile gehörig unterscheiden zu können. Eben darum ist es auch räthlich, nach der Durchschneidung des Hauthalsmuskels die *Operation* etwas zu unterbrechen, bis die Blutung aus den Gefässen dieses Muskels stille steht, oder durch kaltes Wasser gestillt ist. Denn verletzte Muskeln geben gewöhnlich viel Blut, und dieses längere Zeit fort, was bei ihrer gefässreichen Bildung ganz begreiflich ist. — Wer die grosse Anzahl wichtiger *Organe* betrachtet, welche bei dieser *Operation* geschont werden sollen, und zwischen denen hindurch man sich einen Weg zu der obern Schilddrüsen-Arterie bahnen muss, der wird die Nothwendigkeit, die Wunde immer möglichst rein vom Blut zu halten, leicht einsehen. —

Eben darum ist es auch räthlich, nachdem die ersten äussern Schnitte gemacht worden sind, zur unmittelbaren Entblössung der Arterien sich weniger der Schneide des Bistouries, als vielmehr eines stumpfen Werkzeuges und der Finger zu bedienen, um die Theile auseinander zu ziehen, und das Zellgewebe zwischen ihnen zu zerreißen. —

Die Umschlingung der Arterie, wenn sie einmal gehörig bloss gelegt ist, kann bei einiger Vorsicht ohne Gefahr geschehen. Man ziehe sie etwas hervor, und

führe eine gewöhnliche, mässig gekrümmte Unterbindungsnadel um sie herum; bequem ist die auf einem langen Stiele sitzende Nadel von *Dechamp's*, welche das Ohr vorne unter der lanzenförmigen Spitze hat. Es ist nicht nöthig, sie ganz durchzuführen. Sobald die Spitze und das Ohr hervorgedrungen ist, fasst man das darin hängende Fadenbändchen, zieht es an, und geht mit der Nadel zurück. Man muss die Arterie auf der Nadel klopfen sehen und fühlen. Das Fadenbändchen wird mässig fest zugezogen, und ein einfacher Knoten geschürzt, welcher durch einen zweiten Knoten befestiget werden kann. Das übrige Verfahren unter und nach der Operation richtet sich nach den allgemeinen Grundsätzen der Chirurgie, und bedarf hier keiner nähern Auseinandersetzung. — Cfr. etiam illust. *Langenbeck* in praeclaro diario suo: „Neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie, 3. Bandes 2tes Stück, Hannover 1821. pag. 300 — 1. Tab. I. Fig. 2. etc. sic quoque *Carl Bell* System der operativen Chirurgie, übersetzt vom Dr. *Kosmely*, Berlin 1815: 2 Th. pag. 306. —

§. 66.

11) *Ligatura* tantum in struma prominenti, mobili, pendula et partibus vicinis adjacentibus non adhaerente unoque tantum stylo insidente institui potest.⁶¹³⁾ Tumor deinde incisione longitudinali vel cruciata integumentorum denudatur, et ad basin usque omnia vasa, quae obviam veniant, quo facilius tumoris spha-

613) *Paul. Aegineta* de re med. lib. VI. cap. XXXV. p. 564. — *Aëtio*, Tetr. IV. Sermo III. cap. V. pag. 741 usque ad 742. edit. cit. auctoribus, *Cartesianis* etiam, porro *Dolaeo* in encyclop. chir. rat. Francof. ad M. 1689. p. 626. et *Langio* in diss. cit. p. 20. multisque aliis adhuc ducibus inter Neotericos.

celus subsequatur, per totam circumferentiam subligantur. Ad hoc eo citius expediendum causticum etiam vel ferrum candens solet applicari. Distrahuntur hinc invicem labia vulneris, comprehenditur struma vel filo cannahino vel serico vel pilo equino totusque tumor sensim sensimque est constringendus et radix singulis diebus magis contrahenda, donec gangraena subsequatur, et struma tandem marcidâ sponte decidat. Eadem applicandi methodus habenda est, quam *Richter*⁶¹⁴⁾ in tumoribus cysticis commendavit illustrisque *Brunninghausen*⁶¹⁵⁾ in colli tumoribus optimo perfecit successu. Jam ex aliquot annis praeterlapsis *Perill. Stark* strumam periculum minantem per ligaturam sanare constituit; operatio haec, monumentum quidem singularis dexteritatis, feliciter inter tot difficultates peracta monet nos, ne eam facile, confidenter passim et quoties tantum periculum non urget, instituere audeamus; narratio enim de hac ipsa egregia, magistrumque testante exstirpatione strumae per ligaturam, quam *Jaeschke*⁶¹⁶⁾ in acceptis referimus, luculenter tum difficultatem tum periculum operationis nobis ob oculos sistit et docet, quam longum per tempus inde ab ea peracta inter spem metumque vitae periclitaretur.

§. 67.

Sua cuilibet rei est temporis opportunitas, extra quam si suscipiatur, commendationem amittit.

HEDENUS.

12) Extremum denique auxilium in *exstirpatione glandulae thyreoideae* quaerendum est.

614) Anfangsgründe der Wundarzneikunst. Bd. I. §. 501.

615) Ueber die Exstirpation der Geschwülste am Halse.

1805. 8. cum tab. aen. 616) *Friedr. Bened. Jaeschke* diss.

inaug. de strumae exstirpatione per ligaturam. Jenae 1810.

Periculosa est illa operatio chirurgica, et a rationali medico non promiscue in usum vocatur, licet quandoque ferrum sanet, quae medicamenta non sanant, et chirurgum interdum gratiose crudelem esse oporteat.

Jam vero novae exsurgunt quaestiones chirurgicae eaeque maximi quidem ponderis, ad quas tantummodo ex hujus glandulae consideratione anatomica, qualem supra exhibui, satis potest responderi. Quaeritur primum, *quaenam partes sub glandulae thyreoideae exstirpatione laedi debeant ac laedi possint?* deinde, *an glandula thyreoidea absque periculo funditus exstirpari possit?* postea, *quaenam commoda hinc in usum exstirpationis ipsius redundatura sint?* et denique, *quaenam tumoris signa hancce indicare possint operationem?* Singula suo quoque ordine absolvantur opus est.

A) *Partes, quae sub glandulae thyreoideae exstirpatione laeduntur.*

Si quis glandulae illius situm et nexum solito accuratius respexerit, facile intelliget, hanc glandulam ita positam esse, ut sub ejusdem exstirpatione tam partes durae quam molles cujuscunque notae, sive in conspectum veniant, sive in profundo delitescant, laedi vel debeant vel fortuito percelli possint, nec minus patet, ab illarum partium laesione plus minus periculi et discriminis pendere. Chirurgus curatoris cognitionis de glandulae thyreoideae situ et nexu ignarus mancam tantummodo rationem de tam gravi et ardua operatione instituenda dabit, ideoque hanc religionis causa vel evitare debet vel huic si audacia tam improba valeat, ut hoc difficile opus nihilominus temere ac nefarie aggrediatur, sub ipso hoc temerario facinore hoc quidem agit, ut aegrum propter ignorantiam inevitabili fato tradidisse perhibeatur. Sin aeger

nihilò secius vitam deportaverit, uterque tam chirurgus quam aeger de exitu fausto sibi gratulari possunt, sed immerito. Eadem ratione ductus minimae parti observationum chirurgicarum, quae de glandulae thyreoideae exstirpatione hucusque exstant, fidem omnem dare atque attribuere possum. Nam plurimi observatores accuratorem descriptionem et adumbrationem illarum partium, quas sub operatione laedebant, imprudenter negligunt, levique calamo et obiter pertracant, ita quidem ut lector attentus ex manca operationis ipsius historia vix glandulam thyreoideam excisam, tumores vero potius folliculosos exstirpatos esse augeretur. ⁶¹⁷⁾ Plurimi observatorum vel ignorantiae tum in anatomicis quam in chirurgicis vel vaniloquentiae accusari debent, eaque de causa minus digni sunt, quibus assentias. Finis itaque laboris nunc a me suscipiendi eo redit, ut ad anatomicum quendam ordinem illas partes breviter describam, quas chirurgus, dum manum glandulae thyreoideae affectae admovet, cultello descindere vel debet, vel quas facile propter imprudentiam ac dexteritatis defectum violare potest. Ut vero Lectori cuncta ad oculos monstrentur, eum ad tabulas anatomico-chirurgicas *Loderi* ac *Rosenmuel-*

617) Ad probandam hanc sententiam ex *Langii* dissertatione jam saepius citata p. 18. sequentia in medium adduci possunt: „Secuit ante biennium *Circumforaneus* strumam, ovum anserinum superantem, in nobilissima foemina *de Pindau*, quae, licet gravida esset, *Circumforaneum* tamen sollicitabat, ut operationem susciperet. Fortiter etiam omnia perpessa a malo est liberata, licet Operator strumam sola manu post cutis sectionem liberaret, nullaque vasorum sectione aut ligatura uteretur, sed violenter eam abrumperet. Magna itaque inde secuta est haemorrhagia et aegra syncope cum stertore fuit correpta, sed applicatione aquae apoplecticae liberata, et haemorrhagia solo aceto iterum fuit sedata.“

ri atque ad eas, quarum editionem Illust. Seilerus et
el. Langenbeckius sunt paraturi, delego. Nostra
amina quasi examini inserviant, quo observationes
glandulae thyreoideae exstirpatione exhibitae ad ve-
tatis sigillum perducere possint.

1) *Partes, quae sub glandulae thyreoideae ex-*
stirpatione laedi debent.

Multum certe interest, ad qualem formam glan-
dula thyreoidea strumosa accedat; si enim ambitus
tumae magis est circumscriptus, exstirpatio hujus
glandulae minori cum difficultate suscipitur, quam si
tumor circuitu latior est. Ibi longe paucior est nume-
us partium, quae cultello chirurgico subjiuntur;
c vero frequentior est, ubi forsitan particulae quaedam
glandularum vicinarum excindi debent.

Partes sub glandula thyreoidea strumosa necessa-
rio tentandae continent *musculos, vasa omnis*
generis et nervos, quae ut suo quidem loco et or-
dine considerentur, opus est.

a) Integumentis communibus una cum vasis et
amentis nerveis cutaneis discissis, strato musculari
platysmamyoidei, qui glandulae thyreoideae
cumbit, inciditur, ejusdemque fibrae musculares de-
um undique a margine incisionis solvuntur. Quo
facto *musculi sternohyoidei* et *sternothy-*
reoidei glandulam thyreoideam circumdantes appa-
rent et leviter tantummodo a tela cellulosa sunt sepa-
andi atque ad alterutrum tumoris latus removendi.
Quae vero integumenta saepius per incrementum glan-
dulae ita sunt praeternaturaliter extensa et superflua
cta, ut sine ullo respirationis et loquelae detrimento
Raefio ⁶¹⁸⁾ et *Parente* ⁶¹⁹⁾ nostro auctoribus excindi
possint.

⁶¹⁸⁾ Ter resecavit musculos illos vir illustris in hujus glan-
dulae exstirpatione. ⁶¹⁹⁾ Quater felici exitu m. platysma-

b) *Vasorum* ratio in hac operatione maximi momenti est. Ideoque ne mireris a multis anatomicis et chirurgis praesertim si nimium theoriis, minus arti adhaereant, glandulam thyreoideam strumosam tumoribus hucusque adnumerari, qui illud formidabile noli me tangere prae se ferant.

α) *Arteriarum* numerus, quo glandula thyreoidea partim instruitur, partim circumdatur, frequentissimus est, ideoque cautio a chirurgo operante quam maxime adhibenda est, ne plures arterias praeter necessitatem perscindat, atque aegri vitam justo majori sanguinis profluvio in discrimen ducat, quin imprudenter arteriarum trunco discisso interimat. Arteriae ad glandulam thyreoideam vel ex trunco *carotidis externae* sive *facialis* vel ex *subclavia* advectae sub glandulae excissione cunctae discinduntur. Cursum *carotidis* si attenderis, *arteria thyreoidea superior*, quae prope originem trunci exit et flexuose descendit ad superiorem marginem glandulae thyreoideae, persecatur, nec ullo modo propagines ejus sunt evitandae; emittuntur enim ex hac:

a) *R. us superficialis adscendens*, supra vel infra os hyoides incedens et cum ramo ab opposito latere ibidem arcum faciens. — Ex ramo rursus diviso prius educuntur:

α) *R. i.* ad m. hyothyreoideum, sternohyoideum, omohyoideum, cutaneum colli et cutem.

β) *R. i.* ad ligamentum cartilaginem thyreoideam cum osse hyoide connectens.

b) *R. us superficialis descendens*, deor-

myoideum, sternohyoideos et sternothyreoideos cultro destruxit. Vid. Journal der Chirurgie und Augenheilkunde v. C. F. Graefe und Ph. v. Walther, Berlin 1821. 2ter Bd. 2tes Heft pag. 244.

in tendens et in plures sese dividens ramulos inter varia ratione saepe communicantes. Hi sunt:

γ) *R. i* ad sternomastoideum, musc. cutaneum, cartilagineum thyreoideam, hyo - et crico - thyreoideum pharyngis constrictores medios infimosque. Horum nonnulli interdum e priore ramo progerminant.

δ) *R. us* cum eadem arteria ab altero latere sub cricothyreoideum junctus et annulum ibidem faciens.

ε) *R. us laryngeus*, insignior ramus, saepe ex superficiali adscendente proveniens cum nervo socio per cartilagineum cricoideam et thyreoideam sese connexus, vel interstitium membranaceum inter cartilagineum thyreoideam et os hyoides penetrans, vel etiam proprium foramen ipsi in cartilagine thyreoidea adaptatum ad interiora laryngis properans demumque effluens:

ε) *R. um adscendentem*, ad superiorem epiglottidis ejusque membranas tendentem.

ζ) *R. um transversum* ad musc. arytaenoides et cricoarytaen. posteriores.

η) *R. um descendente* ad thyreoarytaenoides, cricoarytaenoides laterales et posteriores, lig. laterale, rel. excurrentem. Trunculus demum iterum mittit, et in cricothyreoideo sese perdit.

θ) *R. us thyreoideus proprius* in substantia glandulae cum ramo thyreoideae inferioris thyreoideae cumque ramo ab altero latere variis surculis inosculatus.

Jam vero ad *subclaviam* progrediamur, ex qua anterior facies *art. thyreoidea inferior* prope mammariam et vertebralem oritur, et a musculo sternomastoideo atque ad superiora aliquantum exteriora flexa mox in quatuor abit ramos notatissimos, qui sunt:

α) *Transversalis scapularis*,

f) *Transversalis colli*,

g) *Thyreoidea adscendens*,

h) *Ramus thyreoideae thyreoides*, in quo totus truncus consumitur. Flectitur scilicet sub *carotide* ad laryngis latera et repetitis contortionibus inferius glandulae thyreoideae extremum attingit. Immergitur illi et in multos ramos arboris instar divisus partim totam glandulam percurrit, partim variis locis thyreoideae superiori inosculatur. Edit:

θ) *R. os minores* ad ossis hyoidis et laryngis exteriores musculos, asperae arteriae superiores annulos et ganglion thyreoides inferius divisos. Horum illi, qui laryngem petunt, laryngeam inferiorem constituunt:

ι) *R. os pharyngeos*, ad constrictores inferiores, oesophagum et posteriores laryngis musculos.

κ) *trachealem superiorem s. thoracicam*. Saepe duplex et triplex, quarum una cum aspera arteria in pectoris cavum ducitur, ibique supra asperam arteriam retē pulcherrimum formans cum bronchialibus inferioribus et intercostali suprema communicationem alit.

Truncus *carotidis* a chirurgo cauto facile indagatus mittitur. Attamen operator valde perturbari debet, si glandulae thyreoideae pars lateralis et profunda ita est locata, ut a *carotide* quasi perforetur, qui vero lusus morbosus ad rariores pertinet et rarissime quidem in scirrhus glandulae thyreoideae tantummodo obvia contingit. Tunc in tam ancipiti casu *carotis* aut in aegri mortem eo facilius insecatur, vel magna manus dexteritas animique summa constantia requiruntur, ut glandula a carotide, qua cingitur, undique et rite solvatur.

β) Inter *venas* plurimae, eaeque quidem non spernendae cultelli applicatione offenduntur. Frequenter sunt *binae*, quae ex *subclavia sinistra*

ibi vicinae perpetuae ascendunt, et in universum locum tenent inferioris arteriae thyreoideae ejusque ramos minores comitantur. Alias altera ex ipsa *venae thyreoideae* divisione et demum ex *jugulari dextra* et a jugulari ejus lateris venit, aut tres omnino sunt, quarum duae e *jugularibus*, tertia a *subclavia sinistra* prodit. Rarius unica est pariter ex *sinistra subclavia* nata. Medio ex thymo ad suam glandulam adscendunt et in arcum egregium coalescunt, cumque superioribus et mediis thyreoideis etiam coeunt. *Mediae venae thyreoideae* fere duae utrinque ad venam jugularem internam pertinent, introrsum ejus venae originem et superiorem sui nominis natae. Cuti, spatiis cutaneis et laryngi etiam prosperiunt. Cum utroque superiori et inferiori trunco magnis anastomosibus solent convenire.

Vena thyreoidea superior unica, aut ex duabus radicibus in unam conjuncta, sodalis et vicina suae arteriae ad supremam sedem cartilaginis thyreoideae et ipsa nascitur editoque non raro ramo cutaneo, aliquando etiam faciali ad cornu cartilaginis distans, superius se applicat ante muscolum sternothyreoideum adque mediam fere sedem glandulae thyreoideae tendit introrsum, truncisque suis per cornu sui lateris descendit, et inter id cornu atque appendicem egregiam coronam cum sodali perficit atque maximis per faciem anteriorem hujus glandulae ramis distribuntur. Praeterea *venulae* adhuc complures, *anastomoticae* cum jugulari externa cultro chirurgico ex necessitate subjiciuntur, profluvium igitur sanguinis est impetuosum et valde copiosum.

γ) *Commercium quoque vasorum absorbentium*, quae a facie et capite in glandulam emergunt, ut partim ad superficiem perrepunt, partim percurrunt, cum iis, quae ad venas jugulares abeunt, easque concomitantur, cultello applicato prorsus tollitur,

nec minus glandulae lymphaticae, quibus externa glandulae thyreoideae superficies tegitur, auferuntur.

δ) *Nervorum* frequentia, quae sub hac operatione persciinditur, fere eadem est, quae vasorum. Ex secundo enim pare cervicali *ramus anterior*, et ex tertio pare cervicali *ramus subcutaneus colli* resecantur; pari modo perit *ramulus superior* cum nervo duro *anastomoticus rami descendens*, quem subcutaneus colli magnus profundus emittit. *Ramus descendens nervi hypoglossi* semper persciinditur, una cum reliquis ramis, qui collum versus tendunt, item haud pauci ex iis ramis, quibus muscoli tum glandulae thyreoideae incumbentes, tum eam circumdantes instruuntur. Discindi etiam solet *ramus laryngeus externus nervi vagi*. Nervi denique molles, quibus vasa nobiliora cinguntur, hinc illinc cultelli acie afficiuntur.

Strumae exstirpatione feliciter peracta partibusque tantummodo, de quibus hucusque mentio erat, laesis et discissis, vulnus adspectu horribile in conspectum venit, ita tamen, ut tam visu quam tactu partes relictæ perspicue percipi possint. Si quis de hujus operationis gravitate persuasus esse cupiat, hunc ad tabulas in usum hujus thematis chirurgici ab Anatomicis pictura delineatas respiciat pervelim. Simul vero attendat partes ad oculos satis demonstratas, ut sibi conditiones scitu necessarias animo efformare ac finire possit, sub quibus felicem glandulae thyreoideae exstirpationem exspectare liceat. En cavum illud! En copiam vasorum, quorum innumera ostia profluvium periculosissimum effundunt! en nervorum copiam et frequentiam, quorum laesio inter phaenomena mira aegrum graviter excruciat! Avertas, quaeso, intuitum a facie adhuc toleranda ad spectaculum novum adspectu longe horribilius, quod, dum partes et vasa quidem praeter necessitatem vel casu fortuito, qui

chirurgus dexterrimo et minus experto accidere potest, vel in poenam audaciae et imprudentiae Lectoribus instituitur.

2) *Partes, quae sub glandulae thyreoideae exstirpatione praeter necessitatem laedi possunt.*

Quanta ergo admiratione, quantaque laude chirurgi animus manuumque firmitas digna sunt, qui glandulam thyreoideam strumosam funditus exstirpare audeat! Quanta aversatione et poena dignus est, qui sine recta glandulae thyreoideae situs et nexus cognitione hujus glandulae exstirpationem aggredi temerario facinore audeat! Consideratio partium, quae necessario sub hac operatione chirurgica laedi debeant, simul nos docet, quam facile vel casu fortuito vel imprudentia et inhabilitate partes, etiamsi evitandae, propter vicinitatem vel inopinum casum ad aegrotantis perniciem et interitum quam facillime violari possint.

a) Praeter fibras platysmamyoides musculares ac m. sternohyoideum et sternothyreoideum *musculus sternocleidomastoideus, omohyoideus, myothyreoideus, digastrici maxillae inferioris tendo et venter anterior* lacerari et pertundi haud aegre possunt, inprimis si operator culcellum telae cellulosa tantummodo strenue applicare conatus sit.

b) *Vasa multa* sunt, quae, nisi caute processeris, laesioni supervacaneae, quin adeo periculosae et metiferae exponuntur.

a) Inter arterias praecipue *trunco carotidis externae* periculum imminet. Idem et arteriae *linguali s. sublinguali*, quae serpentinis flexionibus supra os hyoides ad linguam antrorsum, sursum et introrsum properat, contingere potest, idem etiam *labiali s. maxillari externae s. angulari s. faciali*, quae stylohyoideo et biventris tendine recta per glandularum submaxillarium sulcum flexuose

antorsum ascendit et supra maxillam torta oram masseteris anteriorem sequitur. Omnibus hisce ramis sanguiferis dissectis majori vel minori difficultate ligatura applicari vel haemorrhagia apto remedio sisti potest, et praesertim quidem, si rami *trunco carotidis* propiores laesi fuerint. Multo vero majus periculum imminet, si *trunco carotidis externae* incisio infligitur, isque fortuito perscinditur. Tali vulnere facto operatio sic finitur, ut sine dubio aegrotans ad plures abire cogatur. Sanguis fonticuli instar magnoque impetu prosilit, corpus profusione sanguinis non statim sistenda collabitur et languescit, vires deficiunt et aeger ultimum halitum efflat. Sunt fortasse, qui credant vel opinentur, me nimis longe in letalitate vulneris *carotidi* inflictii definienda procedere, persuasi haemorrhagiam ex *carotide secta* orlam compressione, dum de valore ligaturae remediorumque stypticorum desperandum est, facile sisti posse, quo demum arteria contraheretur ostiumque apertum clauderetur. Quin adeo exemplum de vulnere *carotidis* sanato a quodam *Caestryk* in Journal de Médecine T. XXIII. p. 452. referri audio et a *Michael. Alberti* (systema jurisprudentiae medicae Tom. I. Cas. 28. et Tom. III. Cas. 27.) hoc vulnus ad vulnera per accidens lethalia atque a *Th. A. Roosio* Grundriss med. gerichtl. Vorlesungen. Frankf. a. M. 1802. S. 183. ad laesiones etiam per se lethales referri lego. Hoc quidem facile largior, aliquamdiu haemorrhagiam tentata compressione propter aperturam *carotidis* arte clausam sisti posse; attamen valde dubito, fore ut haec strictura in perpetuum cojuvet, quin adeo eam omnino incertam esse censeo, id quod observatio in commercio literarum Norimberg. ann. 1755. Hebd. VIII. p. 61. bene docere videtur. Quod ad ligaturam attinet, recentissimum de jurisprudentia medica auctorem in medium adducam, ejusque sententiam ea de

re narrabo. *Remerus* est, qui ita disserit: „Der kühne *Astley Cooper*, nachdem er sich von der Möglichkeit der Unterbindung der *carotis interna*, welcher schon *Roose* a. a. O. *Valsalva* in seinen operibus cur. *Morgagni* ep. XIII. pag. 507. und *van Swieten* in Comm. in Hr. *Boerhavii* Aphorismos Vol. I. §. 17. Vol. III p. 266. das Wort reden, überzeugt hatte, hat wirklich und mit glücklichem Erfolge diese Operation gemacht. *SS. medical and chirurg. transact. publ. by the med. et chirurg. society of London* Vol. 2. Nr. 22. Allein dennoch behält bei der nicht vorauszusetzenden überall vorhandenen Möglichkeit der Hülfe eine Verletzung der *Carotis* den Character einer individuell - absoluten Tödllichkeit. Was die äussere *Carotis* betrifft, so ist diese auch, wie die Erfahrung lehrt, mit Glück unterbunden worden. Aus diesem Grunde hat die medic. Facultät zu Halle, *Alberti* l. c., eine Halsverletzung für zufällig tödtlich erklärt; auch eben diesen Ausspruch im Falle einer Verletzung der äussern *Carotis* und *jugularis* gethan.“ Tom. III. Cas. 27. vid. etiam *Illustr. Ph. Waltheri* neue Heilart des Kropfes etc. nebst der Geschichte eines durch die Operation geheilten Aneurysma's der *Carotis*. Sulzbach 1817. p. 41. et sq. System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft, entworfen von *Joh. Dan. Metzger*, verbessert und mit Zusätzen versehen von *Chr. Gottfr. Gruner*, erweitert und be- reichert von *Wilhelm Herrm. Georg Remer*. 5te Auf- lage. Königsberg und Leipzig 1820. p. 156—158.

Quaenam de his assertis nostra mens sit, ex antea- cedentibus partim jam elucescit, partim e subsequen- tibus fiet, quantum scilicet vel arctiores opusculi li- mites vel animus a contradicendi nedum cribrandi stu- dio alienissimus permittent. — Ponamus igitur, in ae- roto exstirpationem strumae esse faciendam, quae plane sit immobilis, profundius lateat et sub *vasis majoribus* quasi abscondatur atque inprimis ad in-

teriora colli vergat, ubi majora vasa sunt evitanda. Is, qui se totum dedit ad hancce operationem perficiendam, inter chirurgos artis peritissimos est referendus. Aggreditur animo intrepido operationem, et integumentis discissis, labiisque vulneris separatis usque ad telam cellulosa penetrat eamque lamellatim perscindit, arteriis et venis glandulam thyreoideam adeuntibus substrictis. Strumam a vicinis partibus plane separat, particula tantummodo, quae tanquam a *carotide* perforatur, relictæ: jam vero aegrotus symptomatibus atrocissimis adeo urgetur, ut morti proximus esse videatur. Operator particulam modo memoratam adhuc rescindere vult, ne quid restet, quod novum sistat incrementum. Et profecto secatur paucillum illud, at proh dolor! paries *carotidis* posterior percellitur. Nonne vero censendum est, aegrotum inevitabili fato jam prius traditum novo isto insultu morte certissima eaque subitanea correptum iri? et etiamsi id non subito sequatur atque ligatura commode adhuc applicari possit, hæc tamen hæmorrhagia enormis atque impedimentum illud circulationis in exstirpatione tali per se jam nimis periculosa mortem paullatinam adducet aegrotique animam vel sub deliriis vel etiam sub suffocatione et apoplexia efflabit. Hinc Jo. Bohnio (de renunciatione vulnerum Lipsiae, 1755. 3. p. 236.) perlubenter assentio, arteriarum *carotidum* diæreses impetuosas ac lethales excipere hæmorrhagias, nullo auxilio plerumque coercibiles, ideo praeprimis quod ligaturam comprimendis suis aperturis ac compressendo sanguini necessariam propter imminens hinc suffocationis et apoplexiæ periculum sustinere nequeunt.

β) Quod ad venas attinet, ipsa *jugularis externa ejusque ramus anterior*, dum musculus sternocleidomastoideus adtrectatur, facile lacessitur.

Praeterea *venae jugulari internae* periculum est, si culter nimis alte immittatur.

γ) *Vasa absorbentia* cum glandulis juxta carotidem exsurgentem posita haud difficulter et violenter a cultello petuntur.

c) Complures etiam nervi facile possunt violari. Sic culter *ramum recurrentem nervi vagi, ramum externum nervi accessorii Willisii, nervum hypoglossum ac plexum oesophageum anteriorem* infeliciter vi sua perturbat.

d) Fieri etiam potest, ut *trachea ipsa* atque *oesophagus* a cultello corripiantur.

B) *Glandulae thyreoidea funditus exstirpanda est, nec ne?*

Non deerunt, qui glandulam thyreoideam funditus exstirpari posse prorsus negaverint, atque exempla, etiamsi maximae fidei, quae de struma feliciter exstirpata prostant, in dubium vocaverint, quin auctores ipsos, qui talia miracula scripserint, valde vituperaverint. Nihil quidem me iudice facilius est, quam argumentis paullo levioribus vel speciosis ullam rem in dubium vocare, adversariumque probris absurdis malis animo offendere, attamen in hac quaestione solvenda auctoritas virorum etsi aliter sentientium mihi affirmanti obstat, quam omnino spernere non licet, at vero opinionem contrariam argumentis pro viribus atque e re ipsa sumtis in veritatis adjumentum diluere atque confutare officium est. Ita Diagnosticorum nostri aevi celeberrimus ⁶²⁰⁾ publice fatetur, glandulam thyreoideam exstirpare idem esse ac carotidem temere decare aut aliquem decollare. Hac data occasione ipse libiter confiteor, me opinioni hujus viri per longum

620) Jo. Ernst Wichmann Ideen zur Diagnostik. Wien 1807.
2te Ausgabe p. 73. sic etiam A. Villanov. l. c. p. 1192.

tempus accessisse et pro ea plurimis litteris ad *Parentem optimum* (qui strenuus exstirpandae glandulae thyreoideae defensor est) missis acribus argumentis dimicasse eamque defendisse, nec minus nego a parente argumentis idoneis in angustias me adductum esse. Nichilosecius tanta contumacia in sententia jam concepta perseveravi, ut mecum animo constituerem, sententiam meam relicta omni ratione, quae inter parentem et filium obedientem fere intercedit, publice defendere atque profiteri, idque eo magis, cum parens veritati perquam studiosus meique amanatissimus litteris ad me datis veniam daret, quod demumcunque isto de argumento cogitarem et in promptu haberem, vel ipsis ejus placitis adversum, in veritatis sigillum pro lubito et absque partis alterius studio defendendi. Magna sane et mira fuit sui neglectio, quam *pater optimus* filio hac in re praestabat eaque semper sensu pio recolenda. Interea in viam me dare jussus sum et Gottingam adire, nec longum per tempus ibi comoratus proelium cruentum inter Studiosos Gottingenses et Velites Hannoveranos in Gottingae afflictae et fere pessumdatae perniciem in urbe ipsa committitur, et nuntio a *parente* accepto non amplius cunctor, Gottingam relinquere ac Berolinum cito adire studeo, occasioneque tam eximia uti pro lubito et amore, quo chirurgiam hucusque colui. Praeterlapso et quod excurrit anno *Friderica Ackermann*, puella annorum 22., *Frankofurti ad Viadrum* tegens, ad Ill. *Graesium*, quo praeside *clanicum chirurgico - ophthalmiatricum* Berolini floret, accedebat, vehementer rogans, ut eam a deformitate strumae quocunque modo liberaret. *Graefius* itaque ante omnia in causas, ortum et progressum morbi inquisivit, et ex relationibus perspexit, sequentia huic morbo ansam suppeditasse. Prima causa in praedispositione erat, mater enim et avia ejus hoc morbo laboraverant. Laxior structura totius cor-

poris accedebat. Occasionem haud dubie victus crudus dedit, qui potissimum in pane maxima ex parte ex hordeo parato, leguminosis et farinosis constabat. Morbus ortum suum duxerat ab anno aetatis ejus decimo quarto, ex quo tempore puella tumorem, qui celeriter increverat, persaepe compressit et loco suo detrusit; credidit enim, strumam sic vel plane discuti vel saltem minui posse; hoc igitur remedio, quamvis tumor potius augetur quam decresceret, tamen per anni spatium usa est, donec parentes, cum contrarium effectum animadvertissent, illud interdicerent. Ipsi autem nunc suasu chirurgi cujusdam et nonnullorum amicorum varia remedia externa tam domestica quam pharmaceutica applicaverunt, quae licet malum minus augerent, tamen volo eorum minus consentanea fuerunt. Illis remediis diu incassum adhibitis puella et parentes usum medicaminum omiserunt. Et sane tumor nunc minus creverat quam illo tempore, quo auxilium in illis quaesiverat. Sed licet hoc aegrae quodammodo solatio esset, tamen successu temporis auspicabatur, et quidem recte, nullum remedium adversus hanc deformitatem superesse praeter extirpationem.

Postquam in causas ortum et progressum morbi inquisiveramus, contrectando tumorem, qui magis ad latus dextrum vergebat ac totam fere colli regionem dextram, et manubrium sterni ac maxillae inferioris angulam versus late protensus⁶²¹⁾ foede occupabat et profecto magnitudine capitis infantilis aequiparari poterat, magnis instructus vasis, undique pulsabat atque ita strumae aneurismaticae⁶²²⁾ signum habitu prae se ferebat, perscrutati sumus, animadvertimus, tumorem non esse immobilem neclatiorem; nam non magna vi intra muscu-

621) Vide in tabula prima nostr. opusc. litt. A. B. B. C. D. E. 622) Ead. tabul. lit. FF.

lum sternomastoidenum dextri lateris protrudi poterat, ubi, si caput non movebatur, aliquamdiu paucillum aliquid tumoris dicto musculo tegebatur, sed levi contorsione capitis vel dextrorsum vel sinistrorsum locum suum antea occupatum rursus petebat. Tumor digitis pressus viam eam hac de causa tam facile sequebatur, quoniam puella pressione et protrusione glandulae saepius iterata non solum fibras et vasa, quae tumori nexum praebebant cum partibus vicinis, sed etiam telam cellulosa, quae sub musculo sternomastoideo reperitur et debiliores ideoque et longiores fecerat, sic ut facile tumori et prementibus digitis cederet. Omnibus his perpensis operatio *Graefio* et omnibus praesentibus unicum atque optimum remedium esse videbatur. Puellae itaque significavimus, morbum quidem indicare scalpellum, nosque suscipere velle operationem, sed non esse in chirurgo, ut aeger semper relevetur; antequam vero excisionem institueremus, haud esse alienum, si *Walthero* auctore ligatura arteriae thyreoideae superioris et quidem dextrae in struma ista aneurysmatica applicaretur. Puella, deformitatis suae pertaesa, forti animo etiam atque etiam rogabat, ut haccce operatio institueretur. Praeparavimus itaque eam alvi ductione et victu idoneo et *Graefius* operationem secundum viam ac rationem a *Ph. de Walthero* propositam exsecutus est. Ligata arteria thyreoidea superiori dextra aegrotata symptomatibus atrocissimis, quae minus sanguinis profluvio pro vasis laesis parcissimo, maxime vero propter furorem atque impetum sanguinis versus ligaturam sequebantur, urgebatur. Vehementissima oborta est cephalalgia, praesertim in latere affecto, ingentes colli dolores iique valde pungentes, pulsationes in vulnere inflicto et tumore saepius in die iteratae, sanguinis susurrus in struma apertus, sensibilitas in struma, vulnere et partibus vicinis adjacentibus e. g. in maxillis, inferiori auris dextrae regione,

imo in brachio dextro fere sublata ac plane nulla, frigus
 hisdem in organis intolerabile et pulsus in utroque
 carpo saepe diversus. Quae omnia cum tantummodo
 per tres hebdomades perdurarent, nec ulla alia signa
 accederent insalubria, reconvalescebat aegrotata et paullo
 post ex integro quod ad vulnus⁶²³) sanata est. Auxilium,
 quod ligatura arteriae thyreoideae superioris tulerat,
 magnam ab utilitate non habuit commendationem;
 exiguum enim erat, imo plane nullum: magnitudo
 tumoris et nimia cutis tensio paullulum erant diminutae
 et insultus, qui ex pondere strumae ejusque impres-
 sione in tracheam, oesophagum et vasa nobiliora pro-
 ficiscebantur, non ita vehementes ut in pristino tem-
 pore. Aegrotata ab excisione strumae in ipso hocce tem-
 poris articulo facienda experimento isto infelici non
 deterrebat, sed vehementer *Graefium* rogabat, ut
 eam a deformitate tumoris strumosi exstirpatione radi-
 citus instituenda liberaret. *Graefius* itaque, fluctuan-
 tibus artis peritis, animo, ut esse solet, intrepido ope-
 rationem die XIX. Januar. MDCCCXX. magna civium
 academicorum corona adstante aggrediebatur. Appa-
 ratus ad hanc operationem in scalpello incisorio, for-
 fice, acubus curvatis filo instructis, hamulis ac ligaturis
 adhuc aliis in medium adductis, duobus uncis alcohole
 vini sine alcali parato et agarico, spongiis compluri-
 bus ex aqua frigida expressis, pulvillis nonnullis, em-
 plastris conglutinantibus, linteis duplicatis tandemque
 fascia simplici constabat. Puella tam corpore quam
 animo nunc praeparata sellam in loco splendido collo-
 catam petebat⁶²⁴), qua operatio fieri debebat; caput a

623) Tab. III. nostr. opusc. litt. F. 1. et Tabul. V. litt. C.

624) Aegrum Actio I. c., *Fabicio ab Aquapendente* (Penta-
 tenchos chirurgicum, Francof. ad Moen. 1592. lib. I. de
 Tum. P. N. p. 193.) et *Parente nostro* auctoribus prostratum
 decumbere oportet, ne sedens in leipothymiam incidat.

ministro delinebatur, et crura inter se erant composita. Deinde tumoris integumenta incidit *Graefius*, lincis duabus curvis in se coëuntibus, sic ut particulam quandam cutis ovalem finiret. Plaga cutis et musculi platysmamyoidis longissime incidenda est, quae ab ea auris parte orsa, quae angulo maxillae inferioris respondet, usque eo producat, ut finis unum pollicem inferior eo loco sit, a quo manubrium sterni initium facit. Sedata arteriarum muscularium cutaneorumque per ligaturas haemorrhagia hanc partem intermediam cutis nunc separabat, ut et tumor ipse melius exscindi et postquam resectus esset, integumenta per incrementum glandulae praeternaturaliter extensa et superflua facta aptius adduci possent, neque cicatrix mala evaderet. Sanguis jam multus ex arteriis et venis erumpens impediēbat, quo minus operationem statim tuto et commode prosequeretur. Hoc profluvium sanguinis, quod jam praevidebat, *Graefium* non terrebat, licet vasa discissa per extensionem debiliora et hac de causa majora reddita. Id enim in plerisque tumoribus chronicis praesertim serophulosis, ubi et saepe vasa varicosa reperiuntur, fieri solet. Depletionem vasorum discissorum promovebat, imbibebat et abstergebat, usus ad utrumque spongiis ex aqua frigida expressis, ut, quid et ubi secaret, bene intelligeret. Haec deterisio eo magis necessaria erat, quo magis tunica glandulam obvolvens tenuata esset, et quo facilius a tumore separari et relinqui posset, in novum postea tumorem succretura. Remota itaque parte intermedia cutis et remittente sanguinis fluxu minister unco duplicato labium vulnerris sinistri lateris arripiebat, et trahendo a tumore removebat, interea uncum alterum tumori infixum versus latus dextrum dirigebat *Graefius* ad telam cellulosam et vasa, quae tunicam tumoris cum partibus adjacentibus nectebant, aliqua ex parte extendenda, ut cultro facilius et securius praescindi possent, locusque

plaretur tumorem, quoad ejus fieri posset, digitis de-
 lubendi, aut in locis, ubi id fieri non poterat, cul-
 tro resecare. In locis, ubi major resistantia erat, quam
 solis digitis agere potuisset, operator cultro uteba-
 tur. Quemque vere ramum arteriosum ligabat per-
 cissum, ne haemorrhagia inde orta operationem re-
 tardet et impediat. Tandem truncos arteriae thyreo-
 idae superioris et inferioris denudabat, ligaturam fa-
 ciebat eosque percindebat et parcissimis tunc incisioni-
 bus tumorem toto ambitu a partibus vicinis sejunge-
 bat. Strumam cum larynge, trachea et oesophago ⁶²⁵),
 cum arteria carotide et vena jugulari ⁶²⁶) ac cum ner-
 vis nobilioribus tam antrorsum quam retrorsum arctis-
 sime coalitam ab iis partibus quam mollissime potuit,
 decernebat, eamque eximebat. Hac tali ratione om-
 nis tumor e suo loco, quem antea occupaverat, remo-
 tus est. Reliqua ora vasorum minoris ponderis rese-
 ctorum sanguinem plorantia contorsione cum apice di-
 giti facta, penicillo vini alcohole imbuto, agarico spon-
 tisque ex aqua frigidissima expressis *Graefius* ob-
 turavit, sanguinis fluxu modis jam dictis sedato et cute
 sanguine adhaerente purgata, illo tamen, qui super-
 ficem internam vulneris contegebat, relicto (scil. ne
 torsitan ora vasorum a sanguine hoc coagulato occlusa,
 lenuo hac purgatione aperirentur) cavum, quod tu-
 mor occupaverat, linteo carpto et spongia bene prae-
 parata immissis replebat operator, deinde labia vulne-
 ris emplastris adeo adduxit, ut sese non contingerent,
 sed aliquantum hiarent, quo humores affluentes libe-
 rius emanare possent. Magna patientia, maxima ma-
 num dexteritas et dimidia horae pars requirebantur,
 ut extirpatio tantae congeriei strumosae et quidem valde
 reconditae partim cultelli incisionibus, partim ope digi-

625) Tab. II. litt. F. 1. F. 2. F. 3. et Tab. IV. litt. E. E.

626) Tab. II. litt. G. G. et Tab. IV. litt. FF.

torum quasi enucleando penitus et fausto exitu absol-
veretur. Manui *Graefii* proximus cunctis operationis
momentis omnem animum et sensus adverti sedulo,
eoque salva religione a me conditiones omnes adnota-
tas esse, sub quibus solum et tantummodo glandula
thyreoidea penitus excindi possit, publice hic fateor.
Inprimis hoc adnoto, musc. sternohyoideum et sterno-
thyreoideum atque arteriam thyreoideam superiorem
et inferiorem lobulos undique perforantem cum ramis
suis hamuli ope ante discissionem elevata esse, ut eo
magis spectatores persuaderentur, glandulam thyrei-
deam ipsam sese habere adfectam. Praeterea post
strumam exstirpatam cavum illud adspectu horrendum
cum partibus designatis admodum conspicuis aderat,
quibus illud impletur. Ad longitudinem musculi ster-
nocleidomastoidei digitum indicem immittebam, eoque
ad vasa colli majora applicato hasce arterias fortiter
pulsantes tam tactu sentiebam, quam visu conspiciebam,
ramus recurrens nervi vagi, plexus oesophageus ante-
rior, nervus hypoglossus, trachea et oesophagus atque
musculi profundius latentes plane erant usque ad ma-
nubrium sterni denudata. Hoc et plures adstantes com-
periebant. Exciso lobulo glandulae thyreoideae dextro,
qui multo magis erat conspicuus, quam lobulus sinister,
atque ab eo plane divisus reperiiebatur, cultellus, ut
res et tempus *Graefium* monuit, parti etiam sini-
strae⁶²⁷⁾ erat applicandus. At, quod sane erat dolen-
dum, aegrota symptomatibus atrocissimis, quae minus
sanguinis profluvio pro vasis laesis parcissimo, maxi-
me vero propter nervorum discissorum ac compresso-
rum copiam sequebantur, adeo urgebatur, ut morti
proxima esse videretur. Ex hactenus dictis ergo patuit,
a continuanda exstirpatione prorsus esse abstinendum.

627) Tab. III. nostr. opusc. lit. A. B. C. D. E. E.

Operationem factam magna difficultas deglutiendi, respirandi, et vehementissima febris inflammatoria sequebantur, quae vero utraque subsequente suppuratione evanuerunt. Ad inflammationem et febrem hanc concomitantem mitigandam interne temperantia ex nitro et cremore tartari cum ptisana avenae tenui acidulata, quibus et victus reliquus respondebat, porrigebantur; extrinsecus toti anteriori colli parti imponebantur fomentationes frigidae, aqua glaciali paratae, quas fascia simplex retinebat. Suppurationem, quae post aliquot dies succedebat, unguento digestivo chirurgorum pulvillis illito et epithematis juvabat *Graefius*, ut purgaretur vulnus et carne nova impleretur. Paulo post infestissima oboriebatur tussis ex nimia nervorum et systematis sanguiferi irritatione proficiscens, ad quam mitigandam et prorsus tollendam a *Graefio* extractum hyosciami atque aqua lauro-cerisi commendata sunt, et quidem felicissimo eventu. Cum haec omnia ex voto succederent, quotidie labia vulneris emplastris conglutinantibus adducebantur, donec cavum carne repletum esset, cujus nimium incrementum aqua vegeto-mineralis Goulardi, qua madebant penicilli, cohibebat. Ad scopum hunc melius impetrandum et simul omnes reliquas partes operatione debilitatas corroborandas aliud epithema ex decocto aquoso corticis peruviani et chamom. superimponebatur. Et sic parva et aequalis cicatrix⁶²⁸⁾ nata est. Puella igitur sanitate restituta nobiscum omnibus gaudio exultabat, et Deo O. M. gratias agebat; jam vero in patriam urbem animi relaxandi causa profecta est, ex qua die I. Jun. anni ejusdem satis robusta rediit. Statim in Clinicum *Graefii* est recepta eodemque die a residua adhuc strumae parte feliciter scalpello liberata. Symptomata operationem sequentia et curatio ad ea fuganda a *Graefio* su-

628) Tab. III. nostr. opusc. litt. F. 2. et. Tab. V. litt. B. B.

scepta prioribus palam respondebant; non igitur est, quod moneam. Nihilominus reconvalescebat aegrotata et paullo post ex integro sanata⁶²⁹⁾ est. Quod ad *num-
merum vasorum* attinet, quae *discissa et ligata* sunt, tantum adnotavi, quantum *quinquaginta et tres arterias* aequat. *Pondus*⁶³⁰⁾ strumae excisae inventum est $2\frac{1}{2}$ ℔.

Nunc in tumoribus, quae tactu et visu invenimus, exponam. Extrinsecus tunica⁶³¹⁾ tumoris duarum linearum crassitiem aequans vasisque⁶³²⁾ majoribus instructa, oculis se objiciebat, deinde in ea parte, ubi glandula cartilaginibus cricoideae, thyreoideae et superioribus tracheae imposita erat, pauca substantia, sana adhuc visa, simulque sulcus⁶³³⁾, qui etiam in sana glandula interdum reperitur, et eam quasi in duos lobulos dividit, in conspectum veniebat. In utroque lobulo tetigi ora arteriarum thyreoidearum superiorum et inferiorum resecta. Haec et alia signa nos nunc certiores faciebant, tumorem resectum vere fuisse glandulam thyreoideam. Cum tumorem manui impositum digitis disquirerem, fere tota dimidia ejus pars, quae latus sinistrum spectabat, durissima, reliqua vero, eademque multo major digitis tangentibus facile cedere visa est, mollis erat, elastica et in basi latissima⁶³⁴⁾. Ut, quid in illa intus esset, scirem, scalpellum parti durae erat admovendum, quod vero *Graefius* importune aversatus est. Sine dubio cartilaginosa haec erat pars et meo quidem judicio a particulis crassioribus humoris alicujus resorptione partium ejus fluidarum relictis et successiva appositione in speciem massae cartilaginosaе degeneratis ortum suum duxisse videtur. — Tan-

629) Tab. V. nostr. opusc. litt. A. A. B. B. G. 630) Tab. II. nostr. opusc. litt. A. et Tab. IV. litt. A. 631) Tab. II. et IV. lit. C. G. C. G. et B. B. B. B. 632) Tab. II. litt. E. E. et Tab. IV. litt. G. C. 633) Tab. II. litt. D. et Tab. IV. litt. D. 634) Tab. II. litt. B.

um de exstirpatione glandulae thyreoideae strumosae; res enim et tempus postulare videtur, ut vela contraham et in portum navim conjiciam; quae enim in tali re sunt demonstranda, pro viribus sum exsecutus: an haec recta sint, nescio, certe non a re aliena aut inutilia esse confido. Nam in adumbranda ista historia et ab erroribus vindicanda, quantum operae studique proposuerim, mihi ipse sum conscius, quantum autem profecerim, Vos judicabitis, quos maxime in hoc libello conscribendo tanquam arbitros spectavi.

Jam vero longe hic absit a lectore suspicio, qua reculpari possim, me ea ex causa tantummodo hoc novum exemplum glandulae thyreoideae penitus et feliciter exstirpatae a me vulgatum esse, ut quasi scriptoribus corrupti instar *Graefii* dexteritati et intrepido animo, quo in arte chirurgica valet, monumentum proposuerim, eoque sententiam de glandulae thyreoideae exstirpatione habitam defenderim. Neutiquam. Modestiam sane hoc ex fine violassem, si famae *Graefii* jam satis celebratae et confirmatae calculum novum meumque supervacaneum addere voluissem. Ratio vero potius eo tendit, ut cogitata nostra circa sententiam a variis varie tentatam experientiae purae fide uberius confirmem. Huic recentissimae glandulae thyreoideae excisae historiae, in qua tantummodo momentorum praecipuorum rationem habui, argumenta debita addo, quibus quaestionem, an glandula thyreoidea funditus absque omni periculo exstirpari possit, affirmare in animo est. Ideoque singulis oppositionibus hucusque non factis quidem, sed qualescunque ullius momenti proponi possint, pro viribus respondebo.

1) Prae caeteris objicitur, glandulam thyreoideam exstirpare idem esse ac *carotidem secare* aut *aliquem decollare*. Quicumque haec publice confitetur, a vero nimis longe procedit. Etiam si trunci carotidis, tracheae et oesophagi connexio cum glandula

thyreoidea sane maximi momenti sit, minime tamen hinc sequitur, ut sub hac operatione organa illa semper insecentur. Haec ratio si in omni operatione chirurgica, sub qua vasa majora facile tangi, quin laedi possunt, v. c. in herniotomia valeret, de salutiferis chirurgiae fructibus actum esset. Tunc enim in tam anticipiti casu, qualis hic fere est, manum remove, aegrumque sorti tristi committere consultius esset, quam medelam artem chirurgicam in aegri salutem adhibere. Interea experientia edocti scimus, talia impedimenta a chirurgo si artem suam partium cognitione anatomica certiore fecerit, bene removeri posse. Eadem ratio in exstirpanda parotide habenda est, dum obstacula, quae facile operatori in aegrotantis vitae minas sistuntur, ab eo superentur, necesse est. Hoc vero omnium optime fit, si chirurgus satis callet arte cultellum gerendi, nec partes praeter necessitatem dissecandi. Encheiresis in hac operatione non ad morem lanionum, magis vero anatomici exercitati observanda est, de qua plura infra dicendi occasio est. Praeterea status pathologicus, in quo glandula thyreoidea strumosa versatur, eandem encheiresin valde promovet, dum illa durities fines eo melius determinat, in quibus tantummodo culter agere debeat. Haec vero omnia si imprudenter et inconsulto negligantur, facile fieri potest, ut carotide dissecta aeger subito interficiatur.

2) *Profluvium sanguinis* in vasis carotide integra discissis ortum difficili tantummodo arte sisti eoque aegri vita in discrimen vitae summum committi potest. Primo intuitu hujus argumenti omnis glandulae thyreoideae exstirpatio contraindicari videtur. Attamen multa ita argumentanti obijcienda in promptu sunt. Haemorrhagiam propter copiam vasorum tam arteriarum quam venarum perquam frequentem esse, ejusque inhibitionem propter spatium saepe angustius, intra quod sanguinis fluxus evenit, absque ulla dif-

difficultate suscipi nullo modo negatur. Sed refugium ad naturam haemorrhagiae ipsius atque artem chirurgicam nodum opinatum solvit. Dum enim glandula thyreoidea strumosa ex cavo, cui intruditur, vel manu vel filo trajecto vel hamulo applicato protrahitur, arteriae extenduntur et discissae demum eo facilius contrahuntur, quale phaenomenon in membris vi quatuor e trunco corporis ereptis videmus. Telae cellulosa vis sibi propria, id est, vis contractilis. hoc perquam adjuvare videtur. Quae tamen inter arterias dissectas non sua vi clauduntur, his manus chirurgica commode applicari debet, dum vel deligatio vel compressio tentari oportet. Hoc vero dictu expeditum, actu difficillimum hanc operationem valde praegravare solet. At non desperandum est, sed magis cogitandum, quanta dexteritate et patientia chirurgi artis peritissimi haemorrhagiam sub glandulae parotidis exstirpatione difficillima ortam sedaverint.

5) *Nervorum vix evitandorum numerum* eorumque nexum et anastomosin propter symptomata systematis nervosi affecti, quae semper superaccedunt, computare oportet. Sane nexus glandulae thyreoideae cum nervis docet, huic glandulae multos nervos et ob anastomosin valde aestimandos impertiri, vel glandulae thyreoideae proximos esse, attamen haec ratio nervorum sequelarumque illarum actionis laesae anxia et fere nimis anatomica est. Centies et fere quotidie in multiplicibus affectionibus et vulneribus externis, quae vel casu vel manu chirurgica corpori humano incidunt, experimur, systema nervorum longe vehementius, quam hic solet, affici, quin ex eo lethale quidpiam in aegri detrimentum redundet. Caeterum trunci nervorum, qui sub glandulae thyreoideae exstirpatione insecantur, pauci sunt, eoque symptomata non ideo vehementia timenda, et si quae accesserint, per se

vel remittunt, vel arte remédiisque aptis haud aegre sedantur.

4) *Observationes* complures, quae de glandula thyreoidea exstirpata exstant, admodum *incertae* sunt, eoque vix pro argumentis sumi haberique possunt. Jam supra plerasque observationes hac de operatione factas ipse in dubium vocavi. Sic saepius pro struma mox sarcomata⁶³⁵⁾, mox congeriem glandularum lymphaticarum scirrhosarum⁶³⁶⁾, mox tumores cysticos⁶³⁷⁾ exstirpatos esse, verosimillimum mihi videtur. Attamen non cuncta illa observata dubia sunt, nec prorsus ut rejiciantur, merentur. Jam *Galenus* lib. I. de locis affectis cap. 6. notat, secuisse aliquem puero strumam in profundo in collo incumbentem et inter secandum vas quoddam unguibus evellendo nervos recurrentes distraxisse, et hoc pacto puerum a struma quidem liberasse, sed mutum una reddidisse; magnam etiam cautionem in hacce operatione propter viciniam art. carotidum et venarum jugularium esse adhibendam, ne illis vulneratis haemorrhagia maxima praesto sit, quae difficulter possit cohiberi, idem est primus auctor atque inventor. Bene igitur *Galeno* duce circa has operationes monendum est, ne remedium sit gravius morbo et si prodesse non possimus, saltem ne noceamus. *Celsus* autem anatomiae haud satis peritus in libro VII. de medicina cap. 13. hanc operationem haud graviolem periculosioremque, quam exstirpationem tumoris cystici commendat. Jam vero *Paulus Aegineta* de re medica lib. VI. cap. XXXV.

635) *Hoin* in memoires de l'academie de Dijon T. 1. 1769.

636) *Joergens* diss. de scirrhis glandularum colli maximis feliciter exstirpatis. Helmst. 1777. — *Forestier* in Journal de Médecine, Chirurgie et Pharmacie 1791. Tom. LXXXVII.

637) *Mursinna's* neue medic. chirurgische Beobachtungen, p. 233. Berlin 1796.

Vol. I. p. 564. *Aëtius* Tetr. IV. serm. III. cap. VI
 Vol. II. p. 745. ex edit. *Henr. Stephani* et *Albucasis*
 Praef. P. I. et II. cap. 42. 44. de hacce operatione, quae
 summam prudentiam moderationemque desideret et
 maximum afferat periculum, paullo uberius et distin-
 ctius disseruerunt, quorum *Aëtius* atque *Albucasis*
 historias aegrorum tum inter operationem ex vocali-
 bus nervis rescisis voce privatorum, tum ex haemor-
 rhagia defunctorum enarrant. Pro optima et compen-
 diosissima strumarum sanabilium curandi methodo ha-
 betur maximeque commendatur a *Marco Aurelio Seve-
 rino* in lib. de efficaci medicina p. 119. qui in sexcentis
 se feliciter hac methodo usum esse scribit. *Paracel-
 sus* curationem strumarum proponit actualement per cau-
 teria actualia vel sectionem perficiendam; vid. *Joh.
 Dolaei* encyclop. chir. ration. Francof. ad M. 1689.
 p. 618. *Willisius* in majori malo remedia haec alia-
 que parum praestitura cum aliis fatetur, unde, si tu-
 mor nihilominus adimendus sit, ad operationem chir-
 urgicam circumspicte instituendam transitum admit-
 tit. (*Dolaeus* l. c. p. 620.) *Dolaeus* ipse in sectione
 strumarum eo respiciendum esse putat, ne magna vasa
 sanguifera aut nervi laedantur, l. c. p. 626. Non minus
 tam *recentiores* quam *recentissimi* chirur-
 gi de strumis exstirpatis observationes communica-
 runt, quae modo *prosperum* modo *lethalem*
 habuerunt *exitum*.

1) *Mortis ipsa causa fuit strumae ex-
 stirpatio secundum observationes Fabr.
 Hildani*, Observ. Tom. II. p. 399. — *Benjam. Goo-
 chii*, medical and surgical Observations as an Ap-
 pendix to a former Publication by B. G. Lond. p. 166.
Richter chir. Bibl. 2ter Bd. p. 128. Göttingen 1772.
Friedr. August Weiz neue Auszüge aus Dissertation-
 en für W. A. 1ster Bd. pag. 172. Frankf. et Leipzig
 1774. — *Thedenii* neue Bemerkungen II. Th. p. 3. —

Alix observ. chirurg. Fasc. I. p. 35. — *Bertrandi* l. c. p. 395. — *J. Palfini* anatomie chirurgicale par *A. Petit* Tom. II. Paris 1753. p. 515. a. d. Franz. ins Deutsche von *Joh. Wilh. Widmann*. 2ter Bd. pag. 281. Nürnberg 1764. — *Kaltschmidtii*, Prof. quondam Jennis, teste *Thedenio* in ejusd. Bemerkungen Th. 2. p. 109. — de *Sieboldi*, sicut ipse in operibus suis posteritati commendatum reliquit. — Illustris *Langenbeckii*, cel. *Iuengkenio* testante: Qui vir in radice glandulae thyreoideae strumosa a vicinis partibus penitus solutae ligaturam applicavit, ut sensim sensimque constringendo omnem sanguinis influxum impedire possit, quo facilius tumoris suppuratio vel sphacelus subsequatur, et struma tandem marcida sponte decidat. Die vero decimo tertio post operationem factam ingens ad aegrotantis perniciem et interitum superveniebat haemorrhagia, quae neque exstirpatione strumae radicitus peracta, nec ullo alio medicamento sisti poterat. — *Kleinii* Observ. über die Ausrottung verschiedner Geschwülste, besonders jener der Ohrspeicheldrüse und der Schilddrüse in *Graefii* et *Ph. de Waltheri* Journal für Chirurgie und Augenheilkunde. Berlin 1820. 1ster Bd. 1stes Heft p. 120 — 150. Consulere non pigeat *Hufelandi* Bibliothek der pr. Heilkunde. Berlin 1820. 6tes St. Jun. p. 323 — 324. ubi is, qui hancce strumae exstirpationem a *Kleinio* factam critice censuit, locutus est his verbis: „Referenten drängt sich hierbei die Frage auf: war eine solche doch immer zu den bedeutendsten und gefährlichsten zu rechnende Operation bei einem so schwächlichen für sein Alter ungewöhnlich kleinen (er war eilf Jahre alt und seine Länge betrug nicht die eines gewöhnlichen fünfjährigen Kindes) dabei zugleich taubstummen Knaben, bei einem Jungen, der zwar gehen konnte, aber immer geführt werden musste und dabei wankte, auch wirklich für angezeigt zu erachten? War nicht bei einer

genauen Berücksichtigung aller obwaltenden Umstände die augenscheinliche daraus hervorgehende Lebensgefahr vor auszusehen? Und that man unter solchen Umständen nicht besser, nichts zu unternehmen und abzuwarten, ob die Natur im Stande seyn wird, dem Kranken zu einem kräftigern Alter und Gesundheitszustande hinzuführen, da, wenn dies nicht der Fall seyn sollte, wohl sicher auch die Kräfte zu dem Ueberstehen einer so bedeutenden Operation ermangeln möchten? Nonne etiam in tali casu mecum exclamabis?

— — saepe acri potior prudentia dextra est!

2) *Nonnisi aegerrime aegroti vita servata est auctore Goochio l. c. pag. 134.*

3) *Feliciter peracta est exstirpatio glandulae thyreoideae Fabricio ab Aquapendente et Dionisio auctoribus, vid. Ernst Anton Nicolai Recepte und Curarten etc. 2ter Bd. p. 174. — J. de Muraltio observ. chir. Basil. 1691. 8. n. 18. — Verduino observ. chir. s. auct. II. ad Sculteti armamentarium, L. B. 1693. 8. in plur. locis. — Ephem. nat. cur. Dec. II. Ann. V. obs. 226. p. 453. — A. Friedr. Vogelio observ. quaed. chir. Kilon. 1771. 4. obs. I. — Joh. Henr. Freytagio epist. grat. de glandulae thyreoideae partim osseam, partim meliceridis speciem referentis exstirpatione. Lips. 1778. Cfr. Weiz neue Auszüge aus Dissert. für W. A. IX. Bd. p. 66—68. — Desault in Journal de Chirurgie Ann. II. Tom. III. p. 5. Paris 1792. Cfr. ejusdem auserles. chir. Wahrnehmungen. Frankf. a. M. Bd. V. p. 3. et ejusd. chir. Nachlass, herausgegeben v. Wardenburg. Göttingen. II. Bd. p. 5. 4. Th. — Kergel in Bernsteins Handbuch 11 Bd. 5te Ausg. S. 752. Leipzig 1818. Nuperrime Weissius, medicus quondam Dresdensis, Koberweinio teste, Cel. Ohlius, Prof. Chirurgiae in Academia Dresdensi medi-*

co-chirurgica, *Graefius* et *Parens noster* glandulam thyreoideam strumosam felici successu exstirparunt. *Graefius* hancce operationem *ter* exsecutus est dextero falo, et *Parens noster sexies*, in quarum altera a *Patre nostro arteriae sexaginta tres* disscissae atque ligatae sunt. ⁶³⁸⁾ Praeterea nullus est ejus rei insignis auctor. Hi ergo viri, si velint et possint, argumenta nostra sine ira et partium studio in utramque partem deliberent, quibus concludimus:

Ergo

Glandula thyreoidea strumosa funditus exstirpanda est.

C) *Commoda, quae glandulae thyreoideae strumosae exstirpationi inserviunt.*

Sane perquam mirum est, exstirpationis istius methodum a plurimis chirurgicis auctoribus plane neglectam esse, ita quidem, ut de hac re scriptores cum poëta rari nantes in gurgite vasto dicere possint. Nisi inter systematicos *Paulum Aeginetam*, *Aëtium*, *Severinum*, *Dionisium*, *Heisterum*, *Palfinum*, *Federium* et *Desaultium*, inter monographos *Vogelium*, *Freytagium* et *Kleinium*, et denique illas singulas observationes jam citatas exceperis, facile concludere poteris, vel strumam rarissimis morbis adnumerandam, vel si struma adfuerit, sedem morbi omnino ignoratam et hunc male cum tumoribus tunicatis commutatam esse. Ideoque vix dubito, exstirpationem glandulae thyreoideae saepius, quam credideris, a chirurgis felici aut infelici eventu peractam esse, quin aë operationis gravitate ipsi persuasi fuerint, id quod in

638) Journal der Chirurgie und Augenheilkunde, herausgegeben von C. Graefe und Ph. v. Walther. 2ter Bd. 2tes Heft pag. 240. Berolini 1821.

multis tumoribus in hacce regione positis et magnitudine insignibus, quales veteres medici sistunt, contigisse videtur. Jam vero *quasdam cautiones* sub exstirpatione glandulae thyreoideae observandas breviter et carptim jam praegressis adjungam. Plura adjumenta et encheireses certe adsunt, quas respicere et observare chirurgi glandulam thyreoideam exstirpaturi est, ne manu imprudenti et temeraria carotidem vel subclaviam cultello proximas attingat, adeoque vitam aegri periculo exponat. Situs nexusque glandulae thyreoideae cum carotide et subclavia, ex quibus vasa recipit, satis superque docet, quam facile hoc contingere possit. Itaque eo magis operator ad ea attendat, quae sibi vel evitanda vel notanda sunt. Hunc ad finem sequentibus opus esse puto.

1) Operator discissis integumentis (optime incisione ad myrti folii figuram a mento ad manubrium sterni versus observata, vel si unus tantummodo lobulus glandulae thyreoideae exstirpandus est, duabus lineis in regione anguli maxillae inferioris et manubrii sterni in se cocuntibus, sic ut particulam quandam cutis ovalem sistant ⁶³⁹⁾), labiisque vulneris hucusque superficialis separatis ad telam cellulosa strumae proximam respiciat eamque lamellatim perscindat necesse est, eam ob causam, ut vasa minora dissecta, quibus glandula thyreoidea nutritur, intra telam cellulosa retrahantur eoque sanguinis profusio ex iisdem progressa absque ulla difficultate sedetur.

2) Ut tumor magis in conspectum veniat ejusque ambitus et nexus cum vicinis partibus undique facile visu et tactu percipiatur, lento modo et continuo protrahi debet, id quod vel ope manus vel hamuli in stru-

639) Sectio enim transversa *Aëtio* jam auctore l. c. plane est incommoda collo, quum vasa et nervi recta porrigantur.

mam infixi vel filo cerato per tumoris partem mediam ducto haud aegre allevatur.

5) Praeter cultellum chirurgus manubrio scalpelli aut digitis utatur, eorumque ope absolvat, quae sine instrumentis tuto perfici possunt, suadendum est. Tumor tela ab omni latere circumdatus indice digito atque a tela caute et sensim solvi aut quasi enucleari debet.

4) Culter semper ita est applicandus ac dirigendus, ut chirurgus operans incisiones ad partem vasorum et nervorum nobiliorum oppositam instituat. Praeterea eadem encheiresis inprimis observari debet, quoniam in parte inferiori et interiori praeter carotidem atque subclaviam vicinam plura adhuc vasa in fundo serpunt, ex quibus glandula thyreoidea vel ramulos accipit, vel quibus ipsa proxima est. His enim percissis haemorrhagia orta operationem valde retardat, imo aegrum in haud leve vitae discrimen ducit.

5) Simulac vasa majora sunt detecta, leviter ad latera a ministro deprimenda sunt, et cavendum, ne venae jugulares et arteriae carotides aut subclaviae ac nervi recurrentes laedantur.

6) Quisque fere arteriae thyreoideae ramus percissus statim est ligandus.

7) Truncis arteriae thyreoideae superioris et inferioris denudatis ligatura a chirurgo est applicanda, et tunc demum sectio facienda.

8) Si quis vero ob timorem sive ob strumae conexum cum partibus vicinis subjacentibusque consultius habet, cultrum a fundo caveae, cui glandula thyreoidea intrusa est, removere, is optime aget, si dissectis integumentis et parte modo tumoris ad vitae periculum evitandum scalpello ablata remanentem partem causticis sensim destruit ⁶⁴⁰⁾, vel etiam, si sub tumida

640) *Theden's neue Bemerkungen* II. Th. p. 168. — *Callisen*

glandula thyreoidea, quantum poterit, a vicinis partibus soluta ligaturam cum filo cerato applicat, ut sensim sensimque arctius constringendo omnem sanguinis fluxum impedire possit, qui toto tumore cum cultello exstirpato evitari vix potest. ⁶⁴¹⁾ Ramis glandulam thyreoideam adeuntibus aliquando substrictis, tumor ad radicem usque exciditur, et haemorrhagia eo aut supprimitur, aut facile demum sistitur. Glandula igitur thyreoidea feliciter exstirpata sanguinisque profusione ex vasis omnino sedata vulnere aperto spongia cera praeparata frustillatim in caveam immittatur, quod partim fascia firmè vulnere applicata, partim manu admota per aliquod tempus comprimi oportet, quo certius sanguis omnis reprimatur.

D) Transeo nunc ad consignandos eos affectus morbosos, in quibus solis haec operatio *indicata* esse potest, in enumerandis hisce affectibus, plagularum angustia coactus, aphoristica brevitate usus.

Locum vero habebit, et pro re nata juvabit exstirpatio glandulae thyreoideae:

1) Si eximia strumae moles apparet, ac nimium ejusdem adest et continuum incrementum.

2) Si vitae periculum ex suffocatione aut apoplexia ob prementem magnae molis strumam imminet; consilium igitur *Astrucci* l. c. p. 205. aliorumque plane contemnendum arbitror, quod eam mature, tumore adhuc parvo, suscipere suadet.

5) Sic struma limitibus distincte conscripta, mobilis, magis prominens et partibus vicinis non arcte adhaerens sine vitae periculo excindi potest. Quae vero plane est immobilis, profundius latet, et sub vasis majoribus absconditur ab iisve quasi perforatur, ac latior est, majusque spatium occupat, et radices lato

l. c. p. 107. — J. L. Schmuckers verm. chirurg. Schriften, II. Bd. p. 175. ⁶⁴¹⁾ *Starkius et Langenbeckius* l. c.

Tabularum explicatio.

Tab. I.

- A. Pars dextra glandulae thyreoideae strumosa.
- B. B. Tumor totam fere colli regionem dextram occupat, et profecto magnitudine capitis infantilis potest equiparari.
- C. D. E. Mentum et manubrium sterni, ac maxillae inferioris angulum versus struma ista radices spargit iisdemque in locis profundius latet.
- F. F. In integumentis strumae communibus vasa sanguifera plena eademque livida tenduntur et quasi incurvantur, sic ut animantis cancri diductos pedes similitudine quadam representent.

Tab. II.

- A. Struma ipsa funditus extirpata.
- B. Basis ejus latissima.
- C. C. C. C. Tunica tumoris duarum linearum crassitiem aequans.

Sulcus, qui saepius quoque in glandula thyreoidea sana reperitur eamque quasi in duos lobulos dividit.

E. Vasa sanguifera, quibus tunica strumae aneurismatica est instructa.

II. F. 2. F. 5.

1) Cornu dextrum glandulae thyreoideae strumosaе, quod cum larynge tam antrorsum quam retrorsum arctissime erat coalitum.

2) 3) Caetera pars glandulae thyreoideae strumosaе cum trachea et oesophago toto ambitu connexa.

G. Paries dextra lobuli istius tanquam a carotide et venis jugularibus perforabatur.

Tab. III.

Lobulus strumae aneurismaticae sinister.

Tumor iste ad sinistram partem magis vergit, et quam maxime ad interiora colli protenditur.

D. Situs ejus versus mentum et manubrium sterni.

E. Integumenta communia vasis sanguiferis instructa.

F. 2.

1) Cicatrix ex vulnere, quod ad ligaturam arteriae thyreoideae superioris faciendam inflictum est, proficiscens.

2) Cicatrix parva et aequalis, quae post partis dextrae strumosaе exstirpationem remanebat.

Tab. IV.

Struma sinistra radicitus exstirpata.

B. B. B. Tunica tumoris.

C. Vasa majora in superficie strumae serpentina.

Sulcus, de quo jam locutus sum.

E. E. Ea pars strumae, quae cum trachea et oesophago erat coalita.

F. F. Particula strumae, quae profundius latebat et sub vasis majoribus abscondebatur.

Tab. V.

A. A. Superficies colli externa naturae prorsus congrua: vulneris partes, quae cicatrice obducendae erant, bene coaptatae.

B. B. Cicatrix post strumae extirpationem feliciter peractam adhuc residua.

C. Cicatrix, quae post ligaturam arteriae thyreoideae superioris relicta est.

SPHALMATA GRAVIORA.

Pag.	Lin.				
3.	26.	ab inf.	Soemmering	leg.	Soemmerring.
3.	17.	- -	Cuiver.	-	Cuvier.
7.	22.	- -	imperialis	-	imperialis.
14.	12.	- -	Hallerius	-	Hallerus.
55.	3.	- -	ad jacens	-	adjacens.
45.	30.	- -	suffocatoria	-	suffocatoriae.
47.	35.	- -	resorbitione	-	resorptione.
70.	32.	- -	Herme	-	Hernie.
70.	32.	- -	Gultron	-	Goultron.
71.	29.	- -	Scacohus	-	Scacchus.
80.	5.	- -	astro	-	astro :
83.	33.	- -	repēdendas	-	repetendas.
83.	2.	- -	παρώων	-	παρέων.
91.	2.	- -	Lupiologie	-	Loupiologie.
92.	17.	- -	distētitur	-	distenditur.
96.	12.	- -	Pausure	-	Saussure.
96.	5.	- -	der Chir. pract.	-	de Chir. prat.
102.	25.	- -	Brodleett	-	Brodbett.
113.	20.	- -	D. Haenii	-	De Haenii.
131.	13.	- -	wo	-	wie.
133.	19.	- -	atlandischen	-	atlantischen.
137.	10.	- -	in	-	an.
138.	31.	- -	einem	-	einen.
138.	20.	- -	Klingenfurt	-	Klagenfurt.
140.	22.	- -	Potschapel	-	Potschappel.
141.	1.	- -	Weisserritzwas :	-	Weisseritzwas :
167.	8.	- -	Hibernus	-	Hybernus.
177.	13.	- -	nicht gut und	-	nicht genug.
178.	13.	- -	thörigste	-	thörichste.
179.	24.	- -	kommen	-	kamen.
191.	35.	- -	Eleossacharum	-	Elaeosaccharum.
192.	17.	- -	cinamomo	-	cinnamomo.
208.	25.	- -	Huxham	-	Huxhami
210.	24.	- -	obsupescunt	-	obstupescunt.
217.	2.	- -	Eiersöcke	-	Eierstöcke.
219.	28.	- -	Phhysic	-	Physic.
219.	26.	- -	bis	-	usque ad.
276.	15.	- -	pernitium	-	perniciem.

NB. Denique in Lin. 12. ab inf. Pag. 20. addendum est:
 Id quoque peculiare est, quod in plerisque mammalibus uni-
 tantum arteria thyreoidea utrinque adcedat; in speciebus
 unen nonnullis Lalouette l. c. duos aut tres ramos arteriae ca-
 tidis ad lobum singulum tendere vidit. "

Sumptibus librariae Weidmanniae Lipsiae
prodierunt:

- A**ndree, John, Abhandlungen über den venerischen Tripper und die venerischen Krankheiten überhaupt. Aus dem Engl. übersetzt und mit Anmerkungen versehen. gr. 8. 1781. 12 gr.
- Andry u. Thouret** Beobachtungen und Untersuchungen über den Gebrauch des Magnets in der Arzneikunst. Aus d. Franz. mit Kupfern. gr. 8. 1785. 1 Thlr. 4 gr.
- Beer's, G. J.**, Pflege gesunder und geschwächter Augen; nebst einer Vorschrift, wie man sich in plötzlichen Zufällen an den Augen, welche nicht eine eigentliche medicinisch-chirurgische Kenntniss fordern, selbst helfen kann. Mit einer Kupfertafel. 8. 1800. 12 gr.
- Bell's, Johann**, Zergliederung des menschlichen Körpers. Nach dem Englischen durchaus umgearbeitet von Dr. J. C. A. Heinroth u. Dr. J. C. Rosenmüller. 1r u. 2r Theil; enthält den 1sten und 2ten Theil des Originals, oder die Knochen, Muskeln, Bänder und Gefässe. Mit 11 Kupfertafeln, sauber gestochen von J. F. Schröter. gr. 8. 1806. 1 Thlr. 16 gr.
- — — derselben 2r Theil.; enthält den dritten, vierten und fünften Theil des Originals, oder das Gehirn, die Nerven, die Sinneswerkzeuge, die Eingeweide des Unterleibes, die im Becken enthaltenen Theile und das lymphatische System. Zum Behuf des Selbststudiums und akad. Vorles. Mit 32 Kupfert., gestochen von J. F. Schröter. gr. 8. 1807. 2 Thlr. 20 gr.
- — — dasselbe Buch, 2 Theile. auf Schreibpapier. 5 Thlr. 4 gr.
- Bell's, Benjamin**, Abhandlung über den bösartigen Tripper und die venerische Krankheit. Aus dem Engl. übers. 2 Theile, mit 1 Kupfert. gr. 8. 1794. 2 Thaler.
- — — Abhandlung vom Wasserbruch, Fleischbruch u. andern Krankheiten der Hoden. Aus dem Engl., mit Zusätzen des Uebersetzers. Mit 1 Kupfert. gr. 8. 1795. 12 gr.
- — — Lehrbegriff der Wundarzneikunst. Aus d. Engl. nach der siebenten Auflage übersetzt; mit Zusätzen und Anmerkungen. 7 Theile. Dritte vermehrte Aufl., mit vielen Kupfern und einem Register. gr. 8. 1804 — 1810. 13 Thlr. 12 gr.
- — — dasselbe Buch, 7 Theile. auf Schrbpap. 16 Thlr.
- Bourgelat's, Herrn**, Lehrbegriff der medicinischen Materie, oder Beschreibung der einfachen Arzneyen nach ihren Wirkungen, nebst den medicinischen Formeln, aus dem Franz. 8. 1766. 14 gr.
- Bromfield's** chirurgische Wahrnehmungen. Aus dem Engl. und mit einigen Zusätzen vermehrt; mit Kupfern. gr. 8. 1774. 1 Thlr. 8 gr.
- Burdach's, Dr. u. Prof. Karl. Friedr.**, Physiologie. gr. 8. 1810. 2 Thlr. 18 gr.
- — — dasselbe Buch, auf Schreibpap. 3 Thlr. 6 Gr.
- Cavallo, Tib.**, Versuch über die Theorie und Anwendung d. medicinischen Elektrizität. A. d. Engl. Zweite vermehrte Aufl. Mit 1 Kupfert. gr. 8. 1799. 6 gr.

